

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังใน
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

Biodiversity of Marine Animals in Coral Reefs along the Eastern
Coast of Thailand (Chonburi Province)

มี.....CD-ROM.....ประกอบหนังสือ
รหัสวัสดุ.....CD B 0955.....
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายโสตฯ

โดย

สุเมตต์ ปุจฉาการ
สุชา มั่นคงสมบูรณ์
ธิดารัตน์ น้อยรักษา
พิชัย สनแจ้ง

- 9 ส.ค. 2552

เริ่มบริการ
- 5 ส.ย. 2552

25 15 4 0

หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2540
สิงหาคม 2547

ISBN 974-384-058-3

การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

Biodiversity of Marine Animals in Coral Reefs along the Eastern Coast of Thailand (Chonburi Province)

โดย สุเมตต์ ปุจฉาการ สุชา มั่นคงสมบูรณ์ ธิดารัตน์ น้อยรักษา และพิชัย สนแจ้ง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

บทคัดย่อ

จากการสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบริเวณแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆและชายฝั่งทะเล ในจังหวัดชลบุรี รวม 22 เกาะ จำนวน 40 จุดสำรวจ ระหว่างเดือนมกราคม 2540 – เดือนมีนาคม 2545 โดยการสำรวจใช้วิธีการดำน้ำแบบผิวน้ำและเครื่องช่วยหายใจได้น้ำในเวลากลางวันและสุมเก็บตัวอย่างใน บริเวณจุดสำรวจ จากการสำรวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 428 ชนิด จาก 15 phyla จำแนกออกได้ ดังนี้ ฟองน้ำ (Porifera) 54 ชนิด ไนดาเรีย (Cnidaria) 151 ชนิด หวีวุ้น (Ctenophora) 1 ชนิด หนอนตัวแบน (Platyhelminth) 8 ชนิด หนอนริบบิ้น (Nemertea) 2 ชนิด หนอนปล้อง (Annelida) 18 ชนิด หนอนถั่ว (Siphuncula) 1 ชนิด หนอนชอน (Echiura) 1 ชนิด หนอนถ้วย (Entoprocta) 1 ชนิด หนอนเกือกม้า (Phoronida) 1 ชนิด ไบรโอซัว (Ectoprocta) 3 ชนิด หอยและหมีก (Mollusca) 63 ชนิด อาร์โทรพอด (Arthropoda) 21 ชนิด เอคไคโนเดิร์ม (Echinodermata) 71 ชนิด และเพรียงหัวหอม (Chordata, Urochordata) 32 ชนิด

ABSTRACT

This report presents the species diversity of coral reefs dwelling invertebrates along Chonburi province, the Eastern coast of the Gulf of Thailand. The field surveys were conducted from 40 sites of 22 islands, over the period January 1997 to March 2002. Most of the investigations were carried out by skin and SCUBA diving during daytime. The specimens were collected by random sampling from reef flat toward on outer reef in the sampling sites. Out of specimens, 428 species were classified from 15 phyla as follow: Porifera 54 species, Cnidaria 151 species, Ctenophora 1 species, Platyhelminth 8 species, Nemertea 2 species, Annelida 21 species, Siphuncula 1 species, Echiura 1 species, Entoprocta 1 species, Phoronida 1 species, Mollusca 63 species, Arthropoda 21 species, Ectoprocta 3 species, Echinodermata 71 species, and Chordata, Urochordata 32 species.

คำสำคัญ: สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, แนวปะการัง, จังหวัดชลบุรี, อ่าวไทย

Keywords: Marine Invertebrates, Coral reef, Chonburi Province, Gulf of Thailand

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงมาได้เพราะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานหลายท่านซึ่งคณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้คือ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และกองเรือป้องกันฝั่งในการให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในบริเวณหมู่เกาะความรับผิดชอบของกองทัพเรือ

Dr. Rob van Soest, Head Curator Section Invertebrates, Zoologisch Museum, University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์และ Dr. Jane Fromont, Curator of Marine Invertebrates, Department of Aquatic Zoology, Western Australian Museum ประเทศออสเตรเลีย ในการให้คำปรึกษาการจำแนกชนิดฟองน้ำทะเล

Dr. Sabine Stohr, Curator of echinoderms, Head of the department, Swedish Museum of Natural History ประเทศสวีเดน และ Dr. Claude Massin, Section Malacologie, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, ประเทศเบลเยียมในการให้คำปรึกษาการจำแนกชนิดเอคไคโนเดิร์ม

อาจารย์ชนากม บัณฑิตวงศ์รัตน์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้คำปรึกษาการจำแนกชนิดปูเสฉวน

Dr. Susumu Ohtsuka, Fisheries Laboratory, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือค้นหาและจัดส่งเอกสารอ้างอิงการจำแนกชนิดสัตว์ทะเลต่างๆตามที่คณะผู้วิจัยร้องขอ

ขอขอบคุณ คุณรณวัน บุญประกอบและคุณอัญชลี จันทร์คง สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณนรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, คุณอารมณ มุจรินทร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และน้องๆนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ช่วยเหลือในการดำน้ำและเก็บตัวอย่าง คุณสุมิตร แก้วหมูน ที่ช่วยในการสแกนภาพใต้น้ำของสัตว์ทะเลต่างๆ และบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามในครั้งนีที่ให้ความช่วยเหลือคณะผู้วิจัยจนงานวิจัยสามารถสำเร็จสมบูรณ์

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2540 คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆจนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี

คณะผู้ดำเนินงานโครงการวิจัยฯ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สิงหาคม 2547

สารบัญ

	หน้า
หน้าปกใน	ก
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทนำ	1
- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี	2
- ระบบนิเวศแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี	4
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลในแนวปะการัง จังหวัดชลบุรี	9
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง (Marine Invertebrates)	11
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา	23
ผลการศึกษา	30
1. ฟองน้ำทะเล (Phylum Porifera)	30
2. ไนดาเรีย ((Phylum Cnidaria)	42
3. หวีวุ้น (Phylum Ctenophora)	45
4. สัตว์กลุ่มหนอนทะเล (Marine Worms)	72
5. สัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลต (Lophophorates)	79
6. หอยและหมีก (Phylum Mollusca)	82
7. อาร์โทรพอด (Phylum Arthropoda)	97
8. เอคไคโนเดิร์ม (Phylum Echinodermata)	103
9. เปรียงหัวหอม (Phylum Chordata, Subphylum Urochordata)	118
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา	124
ข้อเสนอแนะ	126
บรรณานุกรม	127

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของฟองน้ำทะเลในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	31
ตารางที่ 2 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของไนดาเรียและหิวู้นในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	45
ตารางที่ 3 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มหนอนทะเลในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	73
ตารางที่ 4 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลตในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	80
ตารางที่ 5 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของหอยและหมีกในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	83
ตารางที่ 6 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของอาร์โทรพอดในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	98
ตารางที่ 7 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	105
ตารางที่ 8 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเพรียงหัวหอมในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี	118
ตารางที่ 9 ความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบในแนวปะการังจำแนกตามหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี	125

สารบัญภาพและแผ่นภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดชลบุรี	3
ภาพที่ 2 แนวปะการังแทริมฝั่ง (Fringing reef) บริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี	6
ภาพที่ 3 ปะการังบนพื้นทราย (Patch reef) บริเวณหมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี	7
ภาพที่ 4 กลุ่มปะการังบนโขดหิน (Coral community on rocky coast) บริเวณหมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี	7
ภาพที่ 5 แผนภูมิต้นไม้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหลักในแนวปะการัง	22
ภาพที่ 6 แผนที่แสดงพื้นที่ทำการศึกษาตามหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี	29
แผ่นภาพที่ 1 ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	35
แผ่นภาพที่ 2 ในดาเรียและหริวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	53
แผ่นภาพที่ 3 สัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	75
แผ่นภาพที่ 4 สัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลตที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	81
แผ่นภาพที่ 5 หอยและหมึกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	88
แผ่นภาพที่ 6 อาร์โทรพอดที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	100
แผ่นภาพที่ 7 เอคไคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	109
แผ่นภาพที่ 8 เพรียงหัวหอมที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี	120

การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

บทนำ

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ สภาพทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นลักษณะของเปลือกโลกที่เก่าแก่ มั่นคง มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวคั่นระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นลักษณะคล้ายกับชุมชนเชื่อมต่อ (Ecotone) ของมหาสมุทรทั้งสองแห่ง ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรของโลก และมีลมมรสุมพัดผ่านในทิศทางที่ต่างกันตลอดปี ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงมีความเหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นสามารถดำรงชีวิตขึ้นवासสืบพันธุ์ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากมายทั้งระบบนิเวศบนบกและทางทะเล ซึ่งได้มีผู้ประมาณว่าจำนวนพืชและสัตว์ในประเทศไทยที่ทราบชื่อแล้วมีประมาณ 31,958 ชนิด และที่ยังไม่ทราบอีกประมาณ 92,045 ชนิด ดังนั้นจึงประมาณว่าในประเทศไทยเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 124,003 ชนิด หรือร้อยละ 8.9 ของสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกทั้งหมด (ทวิศักดิ์ ปิยะกาญจน์, 2537; สมศักดิ์ จุลละสร, 2537; วิสุทธิ ใบไม้, 2538)

แนวปะการังนับเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเลที่เอื้อประโยชน์ต่อระบบสมดุลธรรมชาติและทรงคุณค่าการใช้ประโยชน์ต่อมนุษยนานาประการ ในแนวปะการังนั้นจะมีปะการังนานาชนิดที่มีโครงสร้างของโคโลนีเป็นรูปทรงแตกต่างกัน เช่น เป็นกิ่งก้าน พุ่มไม้ แผ่น ก้อน และเป็นแบบเคลือบผิว เมื่อปะการังเหล่านี้เจริญขึ้นในบริเวณหนึ่ง ๆ ย่อมก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างปะการังทั้งเล็กและใหญ่กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่จะเข้ามาหาอาหาร หลบภัย รวมทั้งผสมพันธุ์ วางไข่ และอนุบาลวัยอ่อน ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย และเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ทางสังคมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางการประมง การท่องเที่ยวันทนาการ การป้องกันชายฝั่งทะเล เป็นต้น

สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำไทยถูกจัดไว้อยู่ในเขต Indo-west Pacific Region ภูมิภาคนี้จะรวมบริเวณน้ำตื้นของไหล่ทวีปในระยะละติจูด 30 องศาเหนือและใต้ของมหาสมุทรอินเดีย และทางซีกตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูล มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ด้านที่อยู่ทางมหาสมุทรอินเดีย ถูกจัดเป็นภูมิภาคย่อยอีกต่างหากเรียกว่า อนุภูมิภาคอินโดมาลายัน ซึ่งอนุภูมิภาคนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น จุดศูนย์กลางการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลในภูมิภาค Indo-west Pacific นั้นเป็นสิ่งที่แสดงว่า น่านน้ำไทยมีความหลากหลายชนิดของสัตว์ทะเลสูงมากแห่งหนึ่งในโลก ในท้องทะเลไทยมีผู้ประมาณว่า มีปลาทะเลอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ชนิด (ประมาณร้อยละ 10 ของชนิดปลาทั่วโลก) หอยทะเลประมาณ 2,000 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ อีกประมาณ 11,900 ชนิด

ปัจจุบันได้มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันได้ว่า ภายใต้อิทธิพลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่า ทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศได้ถูกทำลาย หรือถูกสะสมพิษ จนทำให้เกิดการทำลาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์หรือต่อการรักษาสภาพของความหลากหลายดังกล่าวไว้ ตัวอย่างเช่น การนำเครื่องมือประมงประเภททวนลากหน้าดิน เข้ามาใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2500 ช่วงระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี พบว่า ปริมาณการจับสัตว์น้ำลดลงจนบัดนี้ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการทำลายสภาพแนวปะการัง โดยการระเบิดปลาหรือการทำประมงผิดวิธี การท่องเที่ยวโดยการทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง นักท่องเที่ยวที่ขาดประสบการณ์การดำน้ำและขาดความรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์โดยการหัก เหยียบปะการัง และเก็บปะการังไว้เป็นของส่วนตัวนำไปสู่การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ทะเล ต่อมาภายหลังมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม จึงทำให้มีของเสียที่เป็นพิษเพิ่มขึ้นในสิ่งแวดล้อม ทำให้ ดิน น้ำและอากาศ มีการปนเปื้อนเป็นพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต จนเป็นอันตรายต่อความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ จนกระทั่งมีอาจจะประเมินความเสียหายที่แท้จริงได้


บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก นับเป็นบริเวณหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นพื้นที่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมแห่งใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งนี้ยังมีเป้าหมายที่จะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นประตูใหม่ของประเทศสู่นานาชาติและเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จากการโครงการดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม ทำให้สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลในบริเวณนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระบบนิเวศแนวปะการัง ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า ระบบนิเวศทางทะเลแห่งนี้มีความสำคัญทั้งทางด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมต่อมนุษย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จัดทำโครงการการศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในบริเวณแนวปะการังในภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านชนิด การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลในภูมิภาคนี้ รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2540 ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีก่อนและจะขยายผลศึกษาในพื้นที่จังหวัดอื่นๆของภาคตะวันออกต่อไป

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย บริเวณตำแหน่งละติจูดที่ 13 องศา 21 ลิปดา 35 ฟลิปดา และลองจิจูดที่ 100 องศา 59 ลิปดา 10 ฟลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ

80 กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายบางนา-ตราด มีพื้นที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร โดยมีชายฝั่งทะเลยาว 156 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ชายทะเล 245 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- | | |
|-------------|---|
| ทิศเหนือ | ติดอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา |
| ทิศใต้ | ติดอำเภอบ้านฉาง และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง |
| ทิศตะวันออก | ติดอำเภอพนมสารคามและอำเภอสนาบชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา |
| ทิศตะวันตก | ติดชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย |



ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 อำเภอ 92 ตำบล 6 เทศบาล 20 สุขาภิบาล 674 หมู่บ้าน การปกครองรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง คือเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง มีจำนวน

ประชากรทั้งสิ้น 962,402 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ โดยเฉพาะไร่มันสำปะหลังและอ้อย เนื่องจากชลบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการเจริญในภูมิภาค นโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการดำเนินนโยบายที่สำคัญดังกล่าวทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชลบุรีค่อนข้างสูง กล่าวคือ มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมากมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและการประมง อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมไม้และวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2 นิคมอุตสาหกรรมทองโกรว์ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และมีสถานประกอบการธุรกิจการค้าต่างๆ มากมาย

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

1. พื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขา (Mountain) จะทอดตัวอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัด เป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต้ โดยเขตที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 เมตรขึ้นไป จะอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด

2. ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม (Flat terrain) พบอยู่ทางต้นบนของจังหวัดในเขตอำเภอพานทองและพนัสนิคม และแนวกึ่งกลางด้านตะวันตก

3. ชายฝั่งทะเล (Coastline) อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่อำเภอเมืองจนถึงอำเภอสัตหีบ มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มค้ำน้ำทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนขึ้นตั้งแต่อำเภอเมือง ถัดลงไปอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ (ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่ได้หมดสภาพไปแล้ว) นอกจากนี้บางแห่งเป็นชายหาดทราย ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

4. ส่วนที่เป็นเกาะ (Islands) ในจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ที่เป็นเกาะ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 46 เกาะ เรียงตัวขนานกับชายฝั่งทะเลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ เกาะที่มีความสำคัญที่สุดคือ เกาะสีชังมีฐานะเป็นอำเภอ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกาะล้าน กลุ่มเกาะแสมสารที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดเข้ามา 2 ทิศทางคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของ

ทุกปี และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทำให้ฤดูร้อนไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวไม่แห้งมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21.9-35.7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 1,314.6 มิลลิเมตร โดยมีฝนตกชุกมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม บริเวณใกล้ภูเขาที่มีฝนตกมากกว่าบริเวณใกล้ชายทะเล

ฤดูกาลของจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน ฤดูฝนตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน และฤดูหนาวตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ (สำนักงานงานจังหวัดชลบุรี, 2538)

ระบบนิเวศแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี

ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิปดา ถึง 13 องศา 20 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 42 ลิปดา ถึง 101 องศา ตะวันออก ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลบริเวณตอนบนใกล้ปากแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นทรายปนโคลน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากตะกอนแม่น้ำสายหลักไหลลงมาทับถมกัน บริเวณตอนล่างลงมามีสัดส่วนที่เป็นทรายมากขึ้น พื้นที่ทะเลมีความลึกไม่มากนักโดยมีระดับน้ำลึกเฉลี่ย 20 เมตร

แนวปะการังในจังหวัดชลบุรี กระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่งของเกาะต่างๆ ประมาณ 35 เกาะ ตั้งแต่เกาะสีชังลงไปจนถึงเกาะแสมสารอยู่ในระดับความลึก 5 เมตร บริเวณใกล้ชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปะการังบนพื้นทราย (Patch reef) ส่วนบริเวณด้านนอกห่างฝั่งออกมาแนวปะการังมีการพัฒนาจนเป็นแนวปะการังริมฝั่ง (Fringing reef) อย่างไรก็ตามแนวปะการังมีการพัฒนาอยู่ในระดับน้ำตื้นมาก ส่วนใหญ่ลึกเพียง 2-3 เมตรเท่านั้น การก่อตัวของแนวปะการังขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แนวปะการังส่วนใหญ่มีการพัฒนาได้ดีในบริเวณที่มีกำบังคลื่นลม ดังนั้นจึงมักพบแนวปะการังบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออกของเกาะหรือบริเวณที่มีกองหินและอ่าวกำบังคลื่นลม (โครงการจัดการทรัพยากรปะการัง, 2542)

โครงการจัดการทรัพยากรปะการัง กรมประมง (2542) ได้สรุปสภาพแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี พบว่า จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 7.6 ตารางกิโลเมตร โดยจัดเป็นกลุ่มดังนี้ หมู่เกาะสีชังมีพื้นที่แนวปะการังเพียง 0.63 ตารางกิโลเมตร แต่สภาพแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดี โดยเฉพาะบริเวณเกาะค้างคาว หมู่เกาะล้านมีพื้นที่แนวปะการัง 2.04 ตารางกิโลเมตร สภาพแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี หมู่เกาะไผ่มีพื้นที่แนวปะการังไม่มากนัก 1.22 ตารางกิโลเมตร สภาพแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดีมาก หมู่เกาะครามมีพื้นที่แนวปะการังมากประมาณ 2.31 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะบริเวณเกาะครามด้านทิศตะวันออกมีแนวปะการัง

ที่กว้างมากประมาณ 200-600 เมตร สภาพแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี หมู่เกาะแสมสารมีจำนวนเกาะมากแต่มีพื้นที่ปะการังค่อนข้างน้อยประมาณ 1.4 ตารางกิโลเมตร สภาพแนวปะการังหลายเกาะส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ยกเว้นเกาะเล็กๆบางเกาะ เช่น เกาะขามและเกาะฉางเกลือ ยังมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง

แนวปะการังในจังหวัดชลบุรีแบ่งประเภทได้ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวม 3 รูปแบบคือ

1. แนวปะการังริมฝั่ง (Fringing reef) เป็นแนวปะการังที่แท้จริงที่มีการสะสมหินปูนอันเกิดจากการสร้างโครงสร้างของปะการังแข็งทับถมกันเรื่อยมาจนก่อเกิดเป็นแนวหินปะการัง ในบริเวณนี้จะพบปะการังที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่มากกว่าหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2

2. กลุ่มปะการังบนพื้นทราย (Patch reef) เป็นลักษณะของปะการังขึ้นเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นทราย โดยที่แต่ละกลุ่มอาจจะเป็นปะการังชนิดใดชนิดหนึ่งและมีปะการังชนิดอื่นๆขึ้นบนโขดนั้น เป็นลักษณะของรูปแบบการเกิดของแนวปะการังในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเปิดรับแรงปะทะของคลื่นมากกว่าแนวปะการังริมฝั่ง ในบริเวณนี้เราจะพบมีพื้นทรายมากกว่าหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มปะการังบนพื้นทรายจะพบมากบริเวณเกาะมารวิชัยและเกาะรัตนทางทิศใต้ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3


3. กลุ่มปะการังบนโขดหิน (Coral community on rocky coast) เป็นลักษณะของปะการังขึ้นเป็นกลุ่มอยู่บนโขดหิน พบได้ตามชายฝั่งที่เปิดรับคลื่นและลมอย่างแรง ในบริเวณนี้เราจะพบมีโขดหินมากกว่าหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 4



ภาพที่ 2 แนวปะการังแตรริมฝั่ง (Fringing reef) บริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี



ภาพที่ 3 ปะการังบนพื้นทราย (Patch reef) บริเวณหมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี



ภาพที่ 4 กลุ่มปะการังบนโขดหิน (Coral community on rocky coast) บริเวณหมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี

ปัญหาในภาพรวมของแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการเสื่อมโทรมจากตะกอนจากการก่อสร้างชายฝั่ง ปัญหาน้ำทิ้งจากชุมชนชายฝั่งและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ปากอ่าวไทย เนื่องจากในบริเวณนี้รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึก การท่องเที่ยว เช่น การทอดสมอเรือในแนวปะการัง การเหยียบย่ำปะการังของนักท่องเที่ยว การเก็บปะการัง นอกจากนี้แล้วแนวปะการังในบริเวณนี้ยังได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เช่น การประมงโดยผิดวิธี เป็นต้น (สิทธิพันธุ์ สิริรัตนชัย, 2537) อย่างไรก็ตาม ในปี 2541 แนวปะการังในอ่าวไทย รวมทั้งจังหวัดชลบุรี ได้เกิดการฟอกขาว (Coral bleaching) ขึ้น อันเนื่องมาจากการปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อแนวปะการังเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้แนวปะการังส่วนมากกำลังมีการฟื้นตัว

จากความสำคัญของปะการัง หน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ จึงได้มีการประสานความร่วมมือกัน ในการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังภายใต้แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 สำหรับแนวปะการังของจังหวัดชลบุรีอยู่ในเขตต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มเกาะสีชัง จัดอยู่ในเขตการดูแลของท้องถิ่น (Local management zone) ประกอบด้วยเกาะค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น และเกาะเล็กอื่นๆ

2. กลุ่มพัทยา จัดอยู่ในเขตการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประเภทการท่องเที่ยวหนาแน่น (Intensive tourism zone) ประกอบด้วย เกาะสาก เกาะครก เกาะล้าน เกาะกลิ้งบาดาล เกาะมารวิชัย เกาะรีน และเกาะไผ่

3. กลุ่มสัตหีบ แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่

3.1 เขตการดูแลของท้องถิ่น ประกอบด้วย เกาะเกล็ดแก้ว เกาะครามใน อ่าวทุ่งไก่อเตี้ย เกาะเตาหม้อ เกาะอีเลา เกาะเขาแหลมขาม เกาะคราม แหลมปู่เจ้า เกาะยอ เกาะขาม เกาะแสมสาร เกาะจวง เกาะโรงหนัง และเกาะจาน

3.2 เขตอนุรักษ์เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและการวิจัย (Conservative zone) ประกอบด้วย เกาะคราม และเกาะครามใน

สำหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี เริ่มต้นตั้งแต่ Chou *et al.* (1991) ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแนวปะการังบริเวณเกาะนก อ่าวพัทยา ในช่วงระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่เดือนมกราคม 2527 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2529 ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชุมชนปะการังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านของเกาะแตกต่างกันและเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่พื้นที่ที่ครอบคลุมของปะการังมีแนวโน้มลดลงทั้งสองด้านของเกาะและชนิดของปลาเศรษฐกิจในบริเวณนี้ลดลงในขณะที่ปลาที่ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการประมงและผลของกิจกรรมของมนุษย์ทางการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง นอกจากนี้

ทางคณะผู้ทำการศึกษาได้รายงานชนิดของปะการังที่พบในบริเวณเกาะนกไ้ว้ทั้งหมด 12 วงศ์ 29 สกุล 50 ชนิด และปะการังไฟ 1 วงศ์ 1 ชนิด สิริพันธ์ ศิริรัตนชัยและคณะ (2527) ได้ทำการศึกษาสภาพแนวปะการังบริเวณเกาะแรดและเกาะข้างเคียง พบว่าปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเป็นอันมากโดยเฉพาะบริเวณระยะ 50-70 เมตรแรกของแนวปะการัง ส่วนใหญ่เป็นซากปะการังและมีปะการังเขากวาง, *Acropora* spp. เป็นชนิดเด่นแต่ส่วนมากได้ถูกทำลายลง ในปีต่อมาสิริพันธ์ ศิริรัตนชัยและคณะ (2528) ได้ทำการสำรวจสภาพปะการังบริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี พบว่ามีปะการังอยู่โดยรอบตั้งแต่บริเวณชายฝั่งไปจนถึงน้ำลึก มีความกว้างของแนวปะการังอยู่ระหว่าง 30-50 เมตร สภาพของแนวปะการังอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณรอบเกาะยอ มีปะการังในสภาพดีเพียง 60% ส่วนบริเวณรอบเกาะอีเลามีปะการังอยู่ในสภาพดี เพียง 25 % เท่านั้น

สรวิศ เผ่าทองสุขและคณะ (2536) ได้ทำการสำรวจสภาพของแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี โดยทำการสำรวจสภาพทั่วไปและลักษณะโครงสร้างในแนวตัดขวางของแนวปะการัง แบ่งพื้นที่ศึกษาเป็นสองบริเวณคือ หมู่เกาะล้านและหมู่เกาะแสมสาร พบว่าบริเวณหมู่เกาะล้านมีสภาพแนวปะการังโดยส่วนรวมดีกว่าบริเวณแสมสาร โดยมีเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมของปะการังมีชีวิตสูงกว่า ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองบริเวณได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันคือ บริเวณหมู่เกาะล้านได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ในขณะที่บริเวณแสมสารได้รับผลกระทบจากชุมชนและการประมงเป็นส่วนใหญ่ วิญญิต มั่นทะจิตร (2537) ได้ทำการศึกษาโครงสร้างและสังคมของปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังของจังหวัดชลบุรีและระยอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2535 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของแนวปะการังบริเวณที่ทำการศึกษาทั้งหมดจัดเป็นแนวปะการังที่พัฒนาการอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล เพราะมีระดับการพัฒนาไม่สูงมากนักแต่มีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า แนวปะการังที่อยู่ห่างฝั่งจะมีการพัฒนาที่ดีกว่าแนวปะการังที่อยู่ใกล้ฝั่งอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลต่างๆจากชายฝั่งทะเลที่มีไม่เท่ากัน สำหรับความแตกต่างของการพัฒนาในหมู่เกาะเดียวกันจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม สิริพันธ์ ศิริรัตนชัย (2537) ได้สรุปสถานการณ์ทรัพยากรแนวปะการังในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกพบว่า แนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพที่เสื่อมโทรมลงเป็นอันมากโดยมีสาเหตุที่ถูกทำลายส่วนใหญ่เนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะจากการประมง การท่องเที่ยว การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง และการทิ้งขยะ และของเสียลงสู่ทะเล

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลในแนวปะการัง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณในจังหวัดชลบุรีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2523-2526 โดยคณะอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (ในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยบูรพา) ภายใต้โครงการใหญ่เรื่องการวิจัยสภาวะแวดล้อมในอ่าวไทยและภาค

ตะวันออก พื้นที่ทำการศึกษาคือ แนวปะการังของหมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา ผลจากการศึกษาได้รายงานชนิดของปะการังแข็งในอันดับ Scleractinia จำนวน 12 วงศ์ 24 สกุล 55 ชนิด และปะการังไฟในอันดับ Hydrocorallina จำนวน 1 วงศ์ 1 สกุล 2 ชนิด สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังรอบเกาะล้านไม่รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามโขดหินริมชายฝั่ง พบสัตว์หน้าดินกลุ่มต่าง ๆ กันได้แก่ ฟองน้ำ (Phylum Porifera) ซีเลนเตอเรทหรือในดาเรีย (Phylum Coelenterata or Cnidaria) หนอนปล้อง (Phylum Annelida) มอลลัสก์ (Phylum Mollusca) ครัสเตเชียน (Class Crustacea) และเอคไคโนเดิร์ม (Phylum Echinodermata) เป็นจำนวนรวมกันมากกว่า 100 ชนิดแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้เนื่องจากขาดเอกสารอ้างอิง ส่วนชนิดที่ได้จำแนกไว้ ประกอบด้วย ฟองน้ำ 4 ชนิด ซีเลนเตอเรท 10 ชนิด หนอนปล้อง 1 ชนิด มอลลัสก์ 21 ชนิด ครัสเตเชียน 14 ชนิด และเอคไคโนเดิร์ม 10 ชนิด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ชนิด อย่างไรก็ตามการจำแนกชนิดของสัตว์ทะเลเหล่านี้ โดยเฉพาะเอคไคโนเดิร์มประสบปัญหาทางด้านเอกสารอ้างอิงอยู่มาก จึงอาจจะทำให้การจำแนกชนิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมาก (สมาน ศรีสัญญา และคณะ, 2523, 2524, 2525)

ใน พ.ศ. 2527 รัฐบาลออสเตรเลียได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ภายใต้โครงการ ASEAN-Australian Marine Science Project: Living Coastal Resources โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตชายฝั่งทะเลให้ความช่วยเหลือในการวางแผนจัดการระยะยาวของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดทักษะความชำนาญให้กับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศ ASEAN และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น remote sensing และการจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้กับประเทศในกลุ่ม ASEAN ผลจากการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียในครั้งนี้ นับว่ามีส่วนช่วยให้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่งของไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิเวศแนวปะการังและมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศแนวปะการัง เช่น การศึกษาโครงสร้างสังคมปะการัง (สรวิศ เผ่าทองสุข และคณะ, 2536) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังโดยการทดลองการปลูกย้ายปะการัง (Siriratanachai, Boonphakdee and Singkoravat, 1994) โครงสร้างสังคมปลาในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (Manthachitra, 1992; นลินี ทองแถม และวิภูษิต มั่นทะจิตร, 2534) เหล่านี้เป็นต้น ตลอดจนได้คู่มือวิธีการในการสำรวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตชายฝั่งทะเลในเขตร้อน (English, Wilkinson and Baker, 1994) คู่มือเบื้องต้นในการจำแนกชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย (Arnold and Birtles, 1985) แต่อย่างไรก็ตามภายใต้โครงการนี้งานวิจัยส่วนมากจะเน้นหนักไปที่การสำรวจและประเมินสถานภาพของแนวปะการัง การวางแผนจัดการ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังในภาพรวมมากกว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชนิด

สำหรับงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทางทะเลในบริเวณ จังหวัดชลบุรี แยกออกตามกลุ่มสิ่งมีชีวิตพอที่จะสรุปได้ดังนี้คือ

กลุ่มสัตว์จำพวกปะการังและระบบนิเวศแนวปะการัง วรณพร จิรวัฒน์ (2528) ได้ศึกษาอนุกรมวิธาน ของปะการังชนิดแข็งที่รวบรวมได้จากบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยพบปะการังชนิดแข็งในบริเวณอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก 14 วงศ์ 41 สกุล 66 ชนิด ครงค์ ยิ่งชล (2540) ได้ทำการสำรวจชนิดปะการังแข็งที่พบบริเวณหมู่ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี พบปะการังแข็งทั้งหมด 56 ชนิด 31 สกุล 12 วงศ์

กลุ่มสัตว์จำพวกหอยและหมีก กิติธร สรรพานิช (2538) ได้รายงานหอยทะเลฝาคู่ 70 ชนิดจากท่า เที่ยบเรือประมง หาดทราย หาดหิน และแนวปะการังในจังหวัดชลบุรีและระยอง

กลุ่มสัตว์จำพวกอาร์โทรพอด ได้แก่ กุ้ง กั้งและปูในแนวปะการังพบว่ามีสัตว์พวกนี้อยู่มากมาย หลายชนิดโดยส่วนใหญ่พบอาศัยอยู่กับปะการังในลักษณะร่วมกัน(Commensalism) สมชาย ศรีพงษ์ (2528) ได้ทำการสำรวจชนิดของปูที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสัตว์ทะเลจำพวกปะการัง ดอกไม้ทะเล ฟองน้ำ และหอย และหมีกตามชายฝั่งจังหวัดชลบุรี พบปู 8 วงศ์ 25 สกุล 29 ชนิด สุรินทร์ มัจฉาชีพ (2522) ได้เก็บตัวอย่างปู บริเวณชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี พบกลุ่มปูทั้งหมด 10 วงศ์ 32 สกุล 54 ชนิด สาริต โกวิทวที (2531) ได้ ทำการศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้ำเค็ม กั้งกระดาน และกั้งมังกรบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พบปูน้ำเค็ม ทั้งหมด 10 วงศ์ 26 สกุล 43 ชนิด กั้งกระดานพบทั้งหมด 1 วงศ์ 2 สกุล 3 ชนิดและกั้งมังกร 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด ต่อมายังได้ทำการศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้งทะเลและกั้งตั๊กแตนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พบกุ้ง ทะเลทั้งหมด 2 วงศ์ 9 สกุล 36 ชนิดและพบกั้งตั๊กแตนทั้งหมด 4 วงศ์ 8 สกุล 14 ชนิด (สาริต โกวิทวที, 2534)

กลุ่มสัตว์จำพวกเอคไคโนเดิร์ม เอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ที่อาจจะไม่ค่อยมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากนัก สำหรับประเทศไทย แต่ในแนวปะการัง เอคไคโนเดิร์มมีบทบาททางระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญ มาก ตัวอย่างเช่น ความงอกูหนามที่กินโพลิบของปะการังเป็นอาหาร ถ้าพบมีการระบาดเกิดขึ้นอาจจะทำให้ แนวปะการังเสื่อมโทรมลงได้ เป็นต้น จากการสำรวจเอกสารงานวิจัยพบว่า ลักษณะ กลินณศักดิ์ (2508) ได้ ทำการเก็บรวบรวมเอคไคโนเดิร์มในอ่าวไทยและพบเอคไคโนเดิร์ม 9 อันดับ 24 วงศ์ 37 ชนิด วัฒนา ไวยนิ ยา (2527) ได้ทำการศึกษาชนิดของดาวทะเลบริเวณหน้าอ่าวพัทยาและเกาะหนูช้าง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ เครื่องมือประมงอวนลากหน้าดิน พบดาวทะเล 12 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ (2541)ได้ทำการสำรวจชนิดเอคไคโนเดิร์มบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พบเอคไคโนเดิร์มจำนวน 65 ชนิด และถัดมา สุเมตต์ ปุจฉาการและ คณะ (สุเมตต์ และคณะ, 2543) ได้ทำการสำรวจชนิดปลิงทะเลในอันดับ Aspidochirotida ในบริเวณหมู่เกาะ ล้านและหมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี พบปลิงทะเลในแนวปะการังจำนวน 17 ชนิด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง (Marine Invertebrates)

แนวปะการังเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ทะเลนับร้อยชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยมีปะการังเป็นสัตว์กลุ่มใหญ่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหลักที่พบทั่วไปในแนวปะการังได้แสดงในภาพที่ 5 ประกอบด้วย

ฟองน้ำ: Sponges, Phylum Porifera เป็นสัตว์ชั้นต่ำที่มีโครงสร้างในระดับเซลล์แบบง่าย ๆ ประกอบด้วย โครงสร้างร่างกายสานกัน 2 ชนิด คือ หนามฟองน้ำหรือเส้นใยฟองน้ำหรือทั้งสองอย่างรวมกัน โครงสร้างของร่างกายเป็นระบบท่อหน้าที่ประกอบด้วย ช่องน้ำเข้ากระจายอยู่ตามผิวลำตัวของฟองน้ำ ช่องเหล่านี้จะเป็นทางผ่านของน้ำเข้าสู่ลำตัวฟองน้ำโดยการพัดโบกของเซลล์พิเศษที่มีขนและปลอกคอทำให้เกิดกระแส น้ำและทำหน้าที่กรองออกซิเจนไว้หายใจและจับอาหาร น้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกขับออกมาทางช่องน้ำออกซึ่งส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ท่อเดียว ฟองน้ำส่วนใหญ่อาศัยอยู่รวมกันเป็นโคโลนีซึ่งเป็นผลมาจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการแตกหน่อแล้วหน่อยังติดอยู่กับตัวเดิมทำให้มีสมาชิกหลายตัวอยู่ติดกันแผ่ขยายคลุมพื้นที่ออกไป ฟองน้ำนับเป็นระบบนิเวศย่อย (Micro-habitat) ในระบบนิเวศแนวปะการัง เนื่องจากมีสัตว์ทะเลหลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำ เช่น กุ้ง ปู ไล่เดือนทะเล ดาวเปราะ ปลิงทะเล โดยมากคอยดักจับอาหารที่ลอยมาตามกระแสน้ำที่เกิดขึ้นจากการพัดโบกของเซลล์ในน้ำบริเวณรูน้ำเข้า และยังอาศัยฟองน้ำเป็นที่หลบซ่อนจากศัตรู

ในดาเรีย : Phylum Cnidaria เป็นสัตว์หลายเซลล์ที่มีหมวดเรียงรายรอบปาก ร่างกายสมมาตรในแนวรัศมีประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นและมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยู่ระหว่างกลางรวมเป็น 3 ชั้น ท่อทางเดินอาหารมีเพียงช่องเดียวคือปาก ไม่มีทวารหนัก และมีนีมาโตซิส (Nematocysts) รูปร่างมี 2 แบบคือ โพลิป (Polyp) รูปร่างแบบโพลิป มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีฐานสำหรับยึดเกาะกับวัตถุใต้น้ำ ด้านบนเป็นปากที่มีหมวดมักเกาะอยู่กับที่ และเมดูซา (Medusa) มีลักษณะคล้ายร่มและมีหมวดอยู่ตามขอบร่ม ก้านร่มจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร ได้แก่ หมวดที่จับอาหาร ปากและกระเพาะอาหาร วายน้ำอย่างอิสระ ในดาเรียแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (Classes) คือ

1. กลุ่ม Hydrozoa ได้แก่ พวกไฮดรอยด์ ปะการังไฟ แวนดาพระอินทร์
2. กลุ่ม Scyphozoa ได้แก่ พวกแมงกระพรุนที่แท้จริง
3. กลุ่ม Anthozoa ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

- กลุ่มย่อย Zoantharia ได้แก่ ดอกไม้ทะเล เซอรีแอนทัส พรหมทะเล ดอกไม้ทะเลเห็ดหูหนู ปะการังแข็ง และปะการังดำ เป็นต้น

- กลุ่มย่อย Octocorallia หมายถึงสัตว์ที่มีโพลิปมีหมวด 8 เส้น ได้แก่ ปะการังสีน้ำเงิน ปะการังอ่อน กัลปังหา แส้ทะเล ปากกาทะเล เป็นต้น

นอกจากปะการังแข็งที่สร้างแนวปะการังแล้วเรายังจะพบในคาเรียเป็นสัตว์กลุ่มเด่นที่พบในแนวปะการังเสมอ

สัตว์กลุ่มหนอนทะเล (Marine worms) เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังที่มีลักษณะคล้ายหนอน มักพบอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแนวปะการัง บางชนิดอาศัยอยู่อย่างอิสระ กลุ่มสัตว์เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยพบมีความหลากหลายมากนักแต่ก็มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศแนวปะการัง สัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ในไฟลัมย่อย (Minor Phylum) ซึ่งมีสมาชิกไม่มากนัก สัตว์กลุ่มหนอนทะเลประกอบด้วย

หนอนตัวแบน: Flatworms, Phylum Platyhelminthes เป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้นพวกแรกที่ไม่ใช่ช่องลำตัว ร่างกายแบนลง ไม่แบ่งเป็นข้อปล้องและมีสมมาตรซีกซ้ายขวา บางชนิดดำรงชีวิตอย่างอิสระแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นพาราสิต หนอนตัวแบนที่อาศัยอยู่ในทะเล ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่ม Turbellaria ลักษณะร่างกายแบน ส่วนหัวมีหนวดเทียมหนึ่งคู่ กระเพาะอาหารจะแตกแขนงออกไปมากมาย บางชนิดมีสีส้มสวยงามและว่ายน้ำได้ กินสาหร่ายทะเล และอินทรีย์วัตถุตามพื้นเป็นอาหาร มักจะพบคืบคลานอยู่ตามก้อนหินหรือใต้ก้อนหิน หนอนตัวแบนส่วนมากจะมีสีส้มและลวดลายเลียนแบบทากทะเล เพื่อหลอกล่อศัตรูไม่ให้เข้ามาทำอันตราย

หนอนริบบิ้น: Ribbon worms, Phylum Nemertinea (Rhynchocoela) มีลักษณะใกล้เคียงกับหนอนตัวแบน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า “Nemerteans” ร่างกายยาวแบนและอ่อนนุ่ม บางชนิดยาวหลายเมตร เป็นสัตว์ที่ไม่มีช่องว่างในลำตัว ด้านหน้ามีงวง (Proboscis) ที่มีปลอกหุ้มใช้สำหรับจับเหยื่อและป้องกันตัว ลักษณะที่แตกต่างจากหนอนตัวแบนคือ หนอนริบบิ้นมีทางเดินอาหารที่เป็นท่อสมบูรณ์ มีปากและทวารหนัก มีระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งนับว่าเป็นสัตว์เนื้อเยื่อสามชั้นพวกแรกที่มีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบวงจรปิดอย่างง่าย มีปากที่อยู่ทางด้านหน้าแทนที่จะอยู่ทางด้านล่างและงวง ส่วนมากแล้วหนอนริบบิ้นจะอาศัยอยู่อย่างอิสระตามพื้นทะเล โดยเฉพาะที่เป็นดินเลนหรือทราย และตามใต้ซอกหินในแนวปะการัง มีสมาชิกอยู่ประมาณ 570 ชนิด

หนอนปล้อง : Annelids, Phylum Annelida เป็นสัตว์ที่มีช่องว่างในลำตัวที่แท้จริง ร่างกายแบ่งออกเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะคล้ายกันมากทั้งโครงสร้างภายในและภายนอก หายใจด้วยเหงือก บางชนิดมีรยางค์อยู่ภายนอกข้างลำตัวที่ช่วยในการเคลื่อนที่และมีขนตามลำตัว มีขนาดยาวตั้งแต่ไม่ถึง 1 เซนติเมตรจนถึงกว่า 1 เมตร เช่น ไส้เดือนทะเล บางชนิดว่ายน้ำได้อย่างอิสระ เช่น แม่เพรียง บางชนิดสามารถสร้างท่อหินปูนเจาะฝังเข้าไปในก้อนปะการังและยื่นหนวดที่เป็นฉัตรคล้ายขนนก เช่น หนอนดอกไม้ฟูฉัตร บางชนิดนำเม็ดทรายมา สร้างเป็นปลอกฝังตัวในพื้นทราย เช่น หนอนท่อ บางชนิดนำดินตะกอนมาสร้างปลอก เช่น หนอนดอกไม้ลายหางนกยูง การกินอาหารของหนอนปล้องจะแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะการดำรงชีวิต เช่น พวกกินซากพืชซากสัตว์ กรองกินแพลงก์ตอน รวมทั้งล่าสัตว์เล็กๆเป็นอาหาร เป็นต้น สมาชิกของหนอนปล้อง มีประมาณ 14,000 ชนิด รวมไปถึงไส้เดือนดิน และปลิงดูดเลือด ซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำจืดและบนพื้นดินด้วย หนอนปล้องบางชนิดอาจจะสร้างปัญหาแก่แนวปะการังเนื่องจากมันสร้างท่อเจาะเข้าไปในก้อนปะการังจึงนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติ ในขณะที่หนอนปล้องบางชนิดมีอวัยวะพิเศษที่มีสีสันสดใสสวยงามนับเป็นสัตว์ที่สร้างสีสันให้แก่แนวปะการังอีกด้วย

หนอนถั่ว: Peanut worms, Phylum Echiura เป็นสัตว์ที่มีช่องว่างในลำตัวที่แท้จริง ร่างกายมีเป็นรูปทรงกระบอกหรือทรงกระบอกที่มีส่วนท้ายของลำตัวพองออกคล้ายถุง ร่างกายไม่เป็นข้อปล้อง ส่วนหัวมีวงหรือวงหวนรอบปากที่แตกกิ่งก้านคล้ายหัวผักกาด วงหรือวงหวนชนิดนี้สามารถหดเข้าไปในลำตัวบางชนิดมีหัวคล้ายเป็นสายคล้ายผิวเปลือกถั่วลิสงจึงเรียกหนอนพวกนี้ว่า “หนอนถั่ว” พบอาศัยอยู่ตามพื้นทรายและโคลน ได้ก้อนหิน รวมทั้งเจาะปะการังอาศัยอยู่ภายใน หนอนถั่วในแนวปะการังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้หินปูนผุพังได้เร็วขึ้นมีบางชนิดสามารถเจาะเข้าไปในปะการังที่มีชีวิตส่งผลให้ปะการังผุพังลงได้ สมาชิกของหนอนถั่วมีไม่มากนักคาดว่ามียู่ประมาณ 100 ชนิด

หนอนช้อน: Spoon worms, Phylum Echiura เป็นสัตว์ที่มีช่องว่างในลำตัวที่แท้จริง มีลักษณะคล้ายกับหนอนถั่ว ร่างกายมีลักษณะเป็นถุงและส่วนหัวมีวงยื่นยาวออกไปหรือวงหวนที่แตกกิ่งก้านแต่ไม่สามารถหดเข้าไปในลำตัวได้เหมือนหนอนถั่ว วงมีลักษณะแบนและเป็นร่องตามยาวเพื่อชักนำเอาอาหารเข้าสู่ปาก บางชนิดมีความยาวมาก พบอาศัยอยู่ในทะเลตามพื้นทรายและโคลน ทุกระดับความลึกและส่วนใหญ่มักพบในเขตร้อน สำหรับในแนวปะการัง เรามักจะพบหนอนช้อนยื่นงวงออกมาหาอาหารจากใต้ก้อนปะการัง ออกหากินในเวลากลางวัน สมาชิกของหนอนช้อนมีประมาณ 130 ชนิด

สัตว์กลุ่มโลโฟพอร์เลต เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีช่องว่างในลำตัวที่แท้จริงและมีอวัยวะเฉพาะที่เรียกว่า โลโฟพอร์ (Lophophore) ลักษณะเป็นวงของหนวดที่มีเส้นขนสั้นเรียงตัวกันเป็นรูปเกือกม้าทางด้านหน้าของร่างกาย ภายในหนวดมีโพรงที่มีช่องลำตัวยื่นเข้ามาด้วยแต่ทวารหนักเปิดอยู่นอกวงหนวดนี้ โลโฟพอร์ทำหน้าที่ในการจับอาหารเข้าสู่ปากและการหายใจ สัตว์กลุ่มหลักของกลุ่มโลโฟพอร์เลตประกอบด้วย 4 Phyla คือ Phylum Bryozoa, Phylum Phoronida, Phylum Entoprocta และที่รู้จักกันดีคือ หอยปากเปิด (Phylum Branchiopoda)

ไบรโอซัว: Moss animals, Phylum Ectoprocta (Bryozoa) เป็นสัตว์ที่เกาะติดกับที่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่รวมกันเป็นโคโลนี โดยเกาะติดกับวัตถุแข็งได้น้ำ เช่น ก้อนหิน สาหร่าย ฟองน้ำ ปะการัง เป็นต้น สมาชิกในโคโลนีแต่ละตัวจะอาศัยอยู่ในปลอกกรองรับที่แยกจากกันและยื่นโลโฟพอร์ออกมาหาอาหาร โคโลนีของไบรโอซัว มีรูปร่างแตกต่างกันได้หลายแบบ เช่น เป็นต้นคล้ายสาหร่าย บางชนิดสามารถสร้างหินปูน

แผ่นกลมก้นหินหรือเจริญเป็นแผ่นคล้ายผักกาดหอม เป็นต้น ไบรโอซัวอาศัยอยู่ตั้งแต่บริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ชายฝั่งทะเลจนถึงทะเลลึก ปัจจุบันคาดว่ามีความหลากหลายประมาณ 5,000 ชนิด

หนอนเกลือ: *Phoronids, Phylum Phoronida* หนอนเกลือเป็นกลุ่มสัตว์โลโฟฟอร์เลต กลุ่มเล็กมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 17 ชนิด ร่างกายมีลักษณะคล้ายหนอนอาศัยอยู่ในปลอก ส่วนหัวจะเป็น โลโฟฟอร์ที่มีลักษณะเป็นเรียงเป็นวงจำนวน 1 คู่ พบอาศัยอยู่เฉพาะในทะเลทั้งหมด และมักจะอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆ เช่น ฟองน้ำ หรือดอกไม้ทะเลปลอก

หนอนถ้วย: *Goblet worms, Phylum Kamptozoa (Entoprocta)* หนอนถ้วยเป็นกลุ่มสัตว์ โลโฟฟอร์เลตโบราณมีขนาดเล็กตั้งแต่ 0.5 – 5 มิลลิเมตร รูปร่างคล้ายกับถ้วยดื่มเหล้าสมัยโบราณที่มีก้านจับ มีจำนวนสมาชิกทั่วโลกประมาณ 100 ชนิด ดำรงชีวิตอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลซึ่งอาจจะอยู่กันแบบโคโลนีหรือแบบเดี่ยวๆ แต่เดิมหนอนถ้วยถูกจัดอยู่ในกลุ่มของไบรโอซัวเนื่องจากมีวงโลโฟฟอร์เหมือนกัน แต่หนอนถ้วยมีทวารหนักอยู่ในวงโลโฟฟอร์จึงถูกยกขึ้นมาเป็นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่ง หนอนถ้วยมักจะอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆ เช่น ฟองน้ำ หนอนปล้อง ไบรโอซัวหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ โดยเฉพาะในวงศ์ Loxomatidae มักจะเฉพาะเจาะจงกับสัตว์ที่เป็นเจ้าบ้านด้วย

หอยและหมีก: *Molluscs, Phylum Mollusca* เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่รองลงมาจากพวกอาร์โทรพอด ในปัจจุบันคาดว่ามีความหลากหลายประมาณ 100,000 ชนิดและมีไม่น้อยกว่า 35,000 ชนิดที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ (Fossils) มีลักษณะสำคัญคือ ร่างกายอ่อนนุ่ม ไม่แบ่งเป็นข้อปล้อง ส่วนใหญ่มีการสร้างเปลือกจำพวกหินปูนห่อหุ้มลำตัวไว้ พบอาศัยอยู่ทั้งในทะเล แหล่งน้ำจืดและบนบก ดำรงชีวิตอย่างอิสระ มีลักษณะการกินอาหารหลากหลายรูปแบบ เช่น ชูดอาหารกินตามพื้น ลำตัวอื่นเป็นอาหาร กรองกินแพลงก์ตอนที่ลอยลอยในน้ำ เป็นต้น หอยและหมีก นับเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะนำมาบริโภคเป็นอาหารเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังนำเปลือกมาทำเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งได้ด้วย

หอยและหมีก ถูกจัดจำแนกออกได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ด้วยกันคือ

1. **กลุ่มหอยฝาชีโบราณ (Monoplacophora)** พวกนี้มีเปลือกชั้นเดียวเป็นฝาคล้ายฝาชี จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่พบอยู่ในฟอสซิลยุคแคมเบรียนหรือประมาณ 600 ล้านปี มีลักษณะปรากฏเป็นปล้อง แสดงถึงสายวิวัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างหนอนปล้องกับมอลลัส ปัจจุบันพบอาศัยอยู่ในเขตทะเลลึก เขตอบอุ่นถึงเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้น

2. **กลุ่มล้นทะเล (Polyplacophora)** มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หอยแปดเกล็ด” ซึ่งเมื่อนับแผ่นเกล็ดขวางตามลำตัวจะได้จำนวน 8 ชั้นพอดี ล้นทะเลจัดได้ว่าเป็นสัตว์ทะเลโบราณ เนื่องจากพบว่าล้นทะเลนี้พบเป็นซากดึกดำบรรพ์ในชั้นหินที่มีอายุ 400 ล้านปีแล้ว และลักษณะของล้นทะเลในปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากตัวอย่างที่เป็นซากดึกดำบรรพ์มากนัก รูปร่างของล้นทะเล มีลักษณะเป็นรูปไข่ ไม่มีส่วนหัวที่ชัดเจน

ด้านบนโค้งนูน และมีเปลือกคล้ายเกล็ดจำนวน 8 ชิ้นเรียงซ้อนกันจากด้านหน้าไปยังด้านหลังคล้ายกระเบื้อง
มุงหลังคา รอบๆเกล็ดเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างเปลือกเรียกว่า แมนเดิล (Mantle) และถูกปกคลุมด้วยหนามสั้นๆ
ด้านล่างเป็นพื้นแบนเรียบตรงกลางมีกล้ามเนื้อเท้ารูปไข่ช่วยในการเคลื่อนที่ ด้านนอกรอบเท้ามีแมนเดิลและ
มีร่องอยู่ระหว่างเท้ากับแมนเดิล ภายในร่องมีเหงือกที่ใช้ในการหายใจ ปากของลิ้นทะเลอยู่ทางด้านส่วนหน้า
ภายในปากมีแผ่นลิ้นที่ช่วยในการดูดสาหร่ายกินเป็นอาหาร

3. กลุ่มหอยงาช้าง (Scaphopoda) มีลักษณะเป็นเปลือกชั้นเดียว มีลักษณะเป็นหลอดยาว รูปร่าง
โค้งคล้ายงาช้าง มีช่องเปิดที่หัวและท้าย มักพบฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายโดยโผล่ส่วนปลายขึ้นมาเหนือพื้นดิน
หอยงาช้างมักจะถูกพบเป็นอาหารภายในกระเพาะอาหารของดาวทราย

4. กลุ่มหอยฝาเดียว (Gastropoda) ร่างกายมักมีเปลือกเวียนเป็นเกลียว ส่วนหัวเจริญดี มีตาและ
หนวด กล้ามเนื้อเท้าแผ่แบนขยายออกใช้ในการเคลื่อนที่ บางชนิดไม่มีเปลือก เช่น ทากทะเล (Sea slug) และ
เป็นพวกที่มีสีสันสดใส สะดุดตา หอยฝาเดียวจัดเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดในบรรดามอลลัสกทั้งหลาย
ประมาณ 30,000 ชนิด

5. กลุ่มหอยฝาคู่ (Bivalvies หรือ Pelecypoda) ร่างกายมีเปลือกเป็นฝา 2 ชั้นประกบกัน ห่อหุ้ม
อวัยวะภายในไว้ ไม่มีหัว ขากรรไกรและลิ้นดูดอาหาร มักจะพบเกาะอยู่กับที่หรือฝังตัวอยู่ตามพื้นทะเล กิน
อาหารโดยการกรอง และมีจำนวนสมาชิกมากเป็นอันดับสอง ประมาณ 10,000 ชนิด

6. กลุ่ม หมึกและหอยวงช้าง (Cephalopoda) จัดเป็นกลุ่มที่มีการวิวัฒนาการสูงที่สุดมีรูปร่าง
แตกต่างไปจากหอยในกลุ่มอื่นๆ มีส่วนหัวเจริญดี มีตาขนาดใหญ่ใช้มองเห็นภาพได้ กล้ามเนื้อเท้าพัฒนาเป็น
หนวดที่มีปุ่มดูดเรียงรายรอบปาก มีถุงเก็บหมึกไว้ในลำตัวเพื่อใช้พ่นอำพรางตัวจากศัตรู มีจะงอยปากแข็งแรง
คล้ายปากนกแก้ว มีกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยในการว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการดูดน้ำเข้าไปภายในลำตัว
แล้วอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้น้ำพุ่งออกมาทางท่อที่อยู่ที่อยู่ได้ส่วนหัวผลักดันให้หมึกเคลื่อนที่ไป
ในทางตรงกันข้ามคล้ายการทำงานของเครื่องขندไอน์ หมึกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ออกหากินในเวลากลางวัน
และมักจะพบเป็นฝูง เป็นสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น ลูกปลา หรือปลาขนาดเล็กๆ เป็นต้น หมึกจัดว่า
เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก เนื่องจากเป็นอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูงและเป็นที่นิยม
บริโภคของประชาชนโดยทั่วไป หมึกกล้วยและหมึกกระดองสามารถว่ายน้ำได้อย่างอิสระ บางชนิดชอบคืบ
คลานอยู่ตามพื้น เช่น หมึกสายหรือหมึกยักษ์ ส่วนในพวกหอยวงช้าง จะมีจำนวนหนวดมากกว่า มีเหงือก 4
อัน ไม่มีถุงเก็บน้ำหมึก มีเปลือกที่มีลักษณะขดเป็นวงคล้ายวงช้าง ภายในมีช่องที่ควบคุมน้ำและก๊าซเพื่อช่วย
ในการทรงตัว หอยวงช้างออกหากินในเวลากลางวัน

อาร์โทรพอด: Arthropods, Phylum Arthropoda เป็นสัตว์กลุ่มใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ เพราะมี
สมาชิกรวมกันประมาณ 1 ล้านชนิดหรือ 80 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนสัตว์ทั้งหมด ตามสายวิวัฒนาการมีความ

ใกล้เคียงกับพวกหนอนปล้อง ร่างกายแบ่งออกเป็นส่วนหัว ทรวงอกและส่วนท้อง โดยบางกลุ่มอาจมีการเชื่อมรวมกันของส่วนหัวและทรวงอกเข้าด้วยกัน (Cephalothorax) มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัว รางค์ขาเป็นข้อปล้อง มีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ เมื่อลอกคราบใหม่ๆ เปลือกที่หุ้มตัวจะอ่อนนุ่มและไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ดังนั้นสัตว์กลุ่มนี้ในช่วงการลอกคราบจะต้องหาที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวจากศัตรูจะมาทำร้ายหรือกินเป็นอาหาร

อาร์โทรพอดมีอยู่เป็นจำนวนมากในแนวปะการังแต่ส่วนมากมีขนาดเล็กอีกทั้งใช้ชีวิตหลบซ่อนตามพื้นและออกหากินในเวลากลางคืน เราจึงมักจะประเมินค่าของสัตว์กลุ่มนี้ต่อแนวปะการังน้อยกว่าความเป็นจริง อาร์โทรพอดที่เราพบอยู่ในแนวปะการังที่รู้จักกันดี จะเป็นกลุ่มครัสเตเชียน (Subphylum Crustacea) ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 45,000 ชนิด ส่วนมากจะอยู่ในพวกที่เรียกว่า เดคาพอด (Decapods) หรือสัตว์ที่มีขาสิบขา ได้แก่ กุ้งชนิดต่าง ๆ กุ้งมังกร กุ้งและปู สัตว์เหล่านี้มักจะแอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหิน ปะการังหรือใต้แผ่นปะการังตายในเวลากลางวันเพื่อป้องกันตัวจากการถูกล่าเป็นอาหาร โดยทั่วไปแล้วเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะสำรวจสัตว์กลุ่มครัสเตเชียนได้ก็คือ ช่วงเวลากลางคืนซึ่งออกมาจากที่ซ่อนเพื่อหาอาหาร เนื่องจากผู้ล่ามักจะกลับเข้ารัง อย่างไรก็ตามเราก็จะพบสัตว์กลุ่มนี้ในเวลากลางวันได้ เช่น กุ้งที่อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์อื่น ๆ เช่น ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล ปะการัง ปะการังอ่อน กัลปังหา ดาวขนนก และปลิงทะเล เป็นต้น ปูในแนวปะการังนั้นจัดเป็นสองพวก คือพวกมีรยางค์หางและไม่มียางค์หาง พวกมีรยางค์หาง เรียกว่า Anomurans ส่วนที่เป็นหางจะมองเห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างคือ ปูเสฉวนต่างจากปูอื่นตรงที่ไม่ต้องซ่อนตนเองขณะลอกคราบเพราะป้องกันตัวเองโดยใช้เปลือกหอยเป็นบ้านที่พาไปไหนมาไหนด้วย แต่จะต้องคอยหาบ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อตัวโตขึ้น สำหรับปูที่ไม่มีรยางค์หางเป็นพวก Branchyurans เป็นปูที่พบอยู่ทั่วไปในแนวปะการัง ที่มีมากและแพร่หลายที่สุดได้แก่ ปูใบ้ (วงศ์ Xanthidae) ซึ่งมีลักษณะเด่นมีกระดองหนา ก้ามมีขนาดใหญ่และแข็งแรง ปูอีกกลุ่มที่พบได้มากคือ ปูม้า (วงศ์ Portunidae) ปูกลุ่มนี้มีลักษณะเด่นตรงที่รยางค์ขาคู่สุดท้ายแบนเป็นใบพายเพื่อใช้ว่ายน้ำหรือช่วยในการฝังตัวลงกับพื้นทะเล อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ปูแสม (วงศ์ Grapsidae) ซึ่งมีส่วนของกระดองกว้างแบนเป็นเหลี่ยม พบบนก้อนหินชายฝั่งทั่วไป กลุ่มต่อมาคือปูลมและปูก้ามดาบในวงศ์ Ocypodidae ซึ่งพบตามหาดทราย ปูกลุ่มนี้มีก้ามดาบยาวยกขึ้นสูงเพื่อช่วยให้มีรัศมีการมองเห็นไกล สำหรับปูลมจะขุดรูอยู่ตามชายหาดในเวลากลางวันและขึ้นมาหากินในเวลากลางคืน ปู Branchyuran อีกกลุ่มที่พบอยู่ร่วมกับฟองน้ำ ปะการัง กัลปังหา และปะการังอ่อนคือปูแมงมุม วงศ์ Majidae

สัตว์กลุ่มครัสเตเชียนอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่กล่าวแล้วที่พบได้ตามแนวปะการังเรียกว่า Non-decapods ได้แก่ เพรียงหิน เพรียงคอห่าน และกั้ง สำหรับเพรียงหินนั้นตัวอ่อนของเพรียงจะต้องลอยไปในทะเลเหมือนตัวอ่อนครัสเตเชียนอื่นๆ เมื่อจมตัวลงเกาะพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วจึงยึดเปลือกนอกติดกับผิวพื้นด้วยสารพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นกาวและเปลี่ยนแปลงรยางค์เป็นอวัยวะสำหรับโบกหาอาหารที่มีขนขึ้นเต็มซึ่งจะยึดออกไปนอกเปลือกใช้โบกดักจับอาหารจำพวกแพลงก์ตอนที่ลอยมาตามกระแสน้ำ เพรียงคอห่านมี

ก้านยาวยึดเปลือกเข้ากับวัตถุลอยน้ำ เช่น ขอนไม้หรือท้องเรือ เพรียงหินมีรูปร่างเหมือนปล่องภูเขาไฟและพบเกาะอยู่ตามโขดหินในแนวน้ำขึ้นลง เพรียงที่เป็นพาราสิตบางชนิดจะเจาะลงไปอาศัยอยู่ในหอยหรือปะการัง บางชนิดเกาะติดอยู่กับหน้าท้องของปูและครัสเตเชียนอื่น

เอคไคโนเดิร์ม: Echinoderms, Phylum Echinodermata หมายถึงสัตว์ที่ผิวหนังเป็นหนามหรือมีแผ่นหินปูน(ossicle)อยู่ใต้ผิวหนัง จัดอยู่ใน Phylum Echinodermata ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ด้วยกันคือ คือ ดาวขนนก (Class Crinoidea) ดาวทะเล(Class Asteroidea) ดาวเปราะ(Class Ophiuroidea) เม่นทะเล เม่นหัวใจ และหรีดยทะเล (Class Echinoidea) และปลิงทะเล (Class Holothurioidea)

เอคไคโนเดิร์ม เป็นสัตว์ที่เริ่มเกิดขึ้นในยุค Paleozoic เมื่อประมาณ 570 ล้านปีมาแล้ว ในปัจจุบัน คาดว่ามีอยู่ประมาณ 6,000 ชนิด มีลักษณะที่สำคัญคือ เป็นสัตว์ที่มีช่องว่างภายในลำตัวที่แท้จริง ร่างกายสมมาตรในแนวรัศมี จำนวน 5 แฉก (Pentameric radial symmetry) ในแนวรัศมีจะสมมาตรซีกซ้ายขวา (bilateral symmetry) ร่างกายไม่เป็นข้อปล้อง ไม่มีหัว ไม่มีสมอง มีระบบท่อน้ำ(Water-vascular system) ที่ใช้ในการเคลื่อนที่และหาอาหาร มีอวัยวะพิเศษที่ใช้จับสัตว์เล็กๆหรือทำความสะอาดร่างกาย (Pedicellariae) ที่มีลักษณะแตกต่างกันและบางชนิดมีต่อมน้ำพิษอยู่ด้วย เช่น แบบเป็นก้านคล้ายดอกบัว (globiferous) แบบคล้ายหอยฝาคู่ (bivalves) เป็นต้น เอคไคโนเดิร์มทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเล และดำรงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินทั้งหมด พบอาศัยอยู่ตามความลึกระดับต่างๆ ตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงพื้นมหาสมุทรลึก มีนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกัน ได้แก่ เป็นผู้ล่า (Predator) พวกขูดกินอาหารจากพื้น (Grazing) พวกกินซากอินทรีย์ (Detritus feeder) พวกดักจับตะกอน (Suspension feeder) เป็นต้น

เอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ทะเลที่มีประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล ประมาณกันว่าการเก็บเกี่ยวเอคไคโนเดิร์มมาใช้ประโยชน์ทั่วโลกถึง 70,000 ตันต่อปี โดยพวกดาวทะเลใช้เป็น feed additive ในอาหารสัตว์และเป็นปุ๋ยจำพวกไนโตรเจน พวกปลิงทะเลและไข่ของเม่นทะเลเป็นอาหารที่มีราคาแพง ในระบบนิเวศทางทะเล เอคไคโนเดิร์มมีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น ความงกของหนาม, *Acanthaster planci* กินโพลิปของปะการังเป็นอาหาร ถ้าพบมีการระบาดเกิดขึ้นอาจจะทำให้แนวปะการังเสื่อมโทรมลงได้ เม่นทะเลอาจจะใช้เป็นดัชนีบ่งชี้สุขภาพของแนวปะการังได้โดยอ้อมเนื่องจากมันขูดหาอาหารตามพื้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพการเกิดใหม่ (recruitment) ของปะการัง หรือปริมาณสาหร่ายทะเล และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆ ที่อยู่ตามพื้น และปลิงทะเล เม่นหัวใจ หรีดยทะเล จะมีบทบาทในการกำจัดสารอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ตามพื้นทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ เอคไคโนเดิร์มยังมีประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ไข่ที่ได้รับการผสมของเม่นทะเลและดาวทะเลเป็นตัวแทนศึกษาการพัฒนากายของตัวอ่อนและใช้ในการตรวจสอบความเป็นพิษของสารมลพิษทางทะเล การใช้เอคไคโนเดิร์มเป็นแหล่งทรัพยากรในการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นสารต่อต้าน

มะเร็ง เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส การลงเกาะของเพรียงหินสำหรับเรือและอุปกรณ์ทางทะเล เอกโคโนเดิร์มแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่คือ

ดาวขนนก (Feather stars, Class Crinoidea) จัดได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกเอกโคโนเดิร์มทั้งหลาย กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อประมาณ 600 ล้านปีมาแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปแล้ว ปัจจุบันเหลือสมาชิกที่ดำรงชีวิตอยู่ประมาณ 700 ชนิด บางครั้งเราอาจจะเรียกดาวขนนกนี้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่ (Living fossil) เนื่องจากลักษณะดาวขนนกในปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากซากดึกดำบรรพ์ที่พบในชั้นหินที่มีอายุราว 400 ล้านปีเลย ดาวขนนก มีรูปร่างคล้ายคันปรง ร่างกายประกอบด้วยแผ่นกลางลำตัวขนาดเล็ก บนแผ่นกลางลำตัวจะเป็นเนื้อเยื่อที่เกี่ยวกับการกินอาหารและขับถ่าย มีปากหงายขึ้นด้านบน มีแขนยื่นต่อออกมาจากแผ่นกลางลำตัวโดยรอบในแนวรัศมี แต่ละแขนจะมีกิ่งของแขนออกไปอีกทั้งซ้ายและขวา ทำให้มองดูคล้ายขนนก กิ่งของแขนมีหลายลักษณะ เช่น กิ่งของแขนบริเวณใกล้ปากเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นหนามแข็งเพื่อป้องกันเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มบริเวณปาก กิ่งของแขนที่ใช้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ กิ่งของแขนที่ทำหน้าที่หาอาหาร เป็นต้น ด้านล่างของแผ่นกลางลำตัวจะมีกิ่งแขนยื่นออกมาตรงปลายเป็นเขี้ยวคล้ายตะขอใช้ในการยึดเกาะกับพื้น ดาวขนนกกินแพลงก์ตอนและตะกอนสารอินทรีย์ในน้ำทะเลเป็นอาหาร ปกติจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยใช้กิ่งของแขนคอยดักอาหาร ดังนั้นในตอนกลางวัน ดาวขนนกมักจะซ่อนตัวอยู่ในซอกปะการัง หรือบางชนิดจะเกาะอยู่กับพื้นนิ่งๆ บางชนิดชอบอาศัยร่วมกับกัลปังหาเพื่อคอยดักอาหารที่ลอยมาตามกระแสน้ำ ดาวขนนกเป็นเอกโคโนเดิร์ม เพียงกลุ่มเดียวที่สามารถว่ายน้ำได้โดยการยกแขนขึ้นลง บางชนิดมีสีสันสวยงามนับเป็นสัตว์แต่งแต้มสีสันในแนวปะการังชนิดหนึ่งเช่นกัน

ดาวทะเล (Starfishes, Class Asteroidea) เป็นเอกโคโนเดิร์ม มีรูปร่างคล้ายรูปดาว ร่างกายประกอบด้วยแผ่นกลางลำตัวและมีแขนยื่นออกไปจากส่วนกลางเป็นรัศมี ส่วนใหญ่จะมี 5 แฉก และส่วนน้อยมี 6, 8 หรือ 12 แฉก บางชนิดอาจจะมีมากถึง 40 แฉก ดาวทะเลไม่มีหัว ตามผิวหนังลำตัวมักมีหนามขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน มีปากอยู่ตรงกลางทางด้านล่างของแผ่นกลางลำตัว ด้านใต้แขนมีร่องให้เท้าท่อยื่นออกมาเป็นคู่เรียงกันเป็นแถว เท้าท่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อในร่างกาย เท้าท่อในพวกดาวทะเลมีประโยชน์ช่วยในการเคลื่อนที่จับอาหาร เป็นต้น ดาวทะเลสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยมีเพศแยกกันเป็นตัวผู้และตัวเมีย การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นภายนอกตัวในน้ำทะเล ไข่และสเปิร์มเมื่อผสมพันธุ์กันจะกลายเป็นตัวอ่อนล่องลอยอยู่ในน้ำทะเลระยะหนึ่ง แล้วจึงพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นดาวทะเลขนาดเล็กๆ ลงเกาะที่บดกลานตามพื้นทะเล ดาวทะเลเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตเป็นผู้ล่าสัตว์อื่นๆ กินเป็นอาหาร อาหารที่ดาวทะเลชอบกิน คือ หอยสองฝา ดาวทะเลหายใจโดยใช้อวัยวะพิเศษมีลักษณะเป็นขนสั้นๆ ยื่นออกมาจากผิวหนัง บางครั้งรวมกันเป็นกระจุกอยู่ตามผิวหนังของลำตัว

ดาวเปราะ (Brittle stars, Class Ophiuroidea) เป็นเอกโคโนเดิร์มที่มีลักษณะคล้ายกับดาวทะเล แต่มีแขนที่ยื่นยาวออกไปมากกว่าดาวทะเลและแขนสามารถเคลื่อนไหวได้ดีในแนวนอน เวลาเคลื่อนที่

จะใช้แขนเลื้อยไปตามพื้นทะเล ซึ่งทำให้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ดาวเลื้อย” ร่างกายของดาวเปราะประกอบด้วย แผ่นกลางลำตัวมีลักษณะค่อนข้างกลมและมีแขนยื่นยาวออกไป ปกติจะมี 5 แขน เช่นเดียวกับดาวทะเล แต่บางชนิดอาจจะมี 6 - 8 แขน และบางชนิดอาจจะมี 5 แขน แต่ละแขนมีการแตกแขนงออกไปคล้ายกิ่งไม้ ซึ่งเราจะเรียกดาวเปราะพวกนี้ว่า “ดาวตาข่าย” (Basket star) แขนของดาวเปราะจะแตกต่างจากแขนของดาวทะเลคือ ได้แขนจะไม่มีร่องให้เท้าท่อยื่นออกมาแต่จะมีรูเป็นคูให้เท้าท่อยื่นออกมาแทน และที่ด้านข้างของแขนจะมีหนามยาวยื่นออกมาเป็นซุดๆเรียงตัวในแนวโค้ง แขนของดาวเปราะมักจะเปราะและแตกหักง่าย แต่มันก็มีความสามารถที่จะงอกใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ดาวเปราะมักจะมีขนาดเล็กและจะอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ฟองน้ำ กัลปังหา ปะการังอ่อน หรือแม้แต่พวกเอคไคโนเดิร์มด้วยกัน โดยเฉพาะเม่นทะเล เหยี่ยวทะเล บางชนิดก็ดำรงชีวิตอยู่อิสระ อาหารของดาวเปราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ เช่น สาหร่าย เป็นต้น และพวกอินทรีย์วัตถุ ดาวเปราะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยจะแยกเพศผู้และเพศเมีย และปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกมาผสมพันธุ์ภายนอกในน้ำทะเล บางชนิดมีความสามารถพิเศษที่จะหักตัวมันเองออกเป็นสองส่วน แล้วแต่ละส่วนจะงอกใหม่เกิดเป็นดาวเปราะสองตัวและมีบางชนิดที่มีตัวผู้และตัวเมียมีขนาดที่แตกต่างกัน (Di-morphism) โดยตัวผู้จะมีขนาดเล็กและเป็นพยาธิของตัวเมียและทำหน้าที่สืบพันธุ์อย่างเดียว

เม่นทะเล เหยี่ยวทะเล และเม่นหัวใจ (Sea urchins, Class Echinoidea) เป็นเอคไคโนเดิร์มที่มีลักษณะค่อนข้างตรงตามชื่อของPhylum ลักษณะของเม่นทะเลจะมีรูปร่างค่อนข้างกลม รูปไข่ (เม่นหัวใจ) หรือแบนลง (เหยี่ยวทะเล) ภายนอกประกอบด้วยหนามเรียงตัวโดยรอบ บางชนิดมีหนามสั้น บางชนิดมีหนามยาว มีปากอยู่ด้านล่าง ด้านบนจะมีทวารหนักและช่องปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ ภายในจะมีเปลือกหุ้มอวัยวะภายใน จำนวน 10 คู่ เม่นทะเลสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบ่งแยกตัวผู้และตัวเมีย ดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระ กินอาหารจำพวกสาหร่ายทะเล โดยปากจะมีฟันสำหรับขูดสาหร่ายทะเลตามพื้น ส่วนเม่นหัวใจและเหยี่ยวทะเลจะฝังตัวอยู่ตามพื้นทะเล

ปลิงทะเล (Sea cucumbers, Class Holothuroidea) มีรูปร่างลำตัวเป็นท่อนทรงกระบอก สั้น บ้างยาวบ้าง ร่างกายยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นปากซึ่งอาจจะถือว่าส่วนหัว รอบปากมีหนวดที่แตกแขนงเป็นช่องใช้จับอาหารพวกสารอินทรีย์ในดินเข้าปาก บางชนิดใช้หนวดคอยดักจับสัตว์เล็กๆที่ลอยอยู่ในน้ำ ด้านตรงข้ามเป็นช่องเปิดเพื่อการขับถ่ายและมีโพรงติดต่อกับช่องเหงือกที่ใช้หายใจ แม้เราจะสัมผัสปลิงทะเลแล้วรู้สึกว่าอ่อนนุ่มแต่ภายใต้ผิวหนังของปลิงมีแผ่นหินปูนเป็นชิ้นเล็กๆขนาดต่างๆกันกระจัดกระจายทำให้ผนังลำตัวปลิงทะเลมีลักษณะคล้ายกระดูกอ่อน ปลิงทะเลหลายชนิดจึงถูกนำมาบริโภคเป็นอาหาร ปลิงทะเลมีบทบาทในระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญคือ ปลิงทะเลกินสารอินทรีย์ที่เคลือบดินตะกอนเป็นอาหารและจะขับถ่ายมูลที่เป็นตะกอนสะอาดไม่มีสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย ลักษณะคล้ายกับการทำความสะอาดให้กับพื้นท้องทะเล ซึ่งอาจจะเรียกปลิงทะเลได้ว่า “ผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเล”

เพรียงหัวหอม: Ascidians, Sea squirt, Phylum Chordata มีชื่อสามัญว่า Sea squirts ซึ่งหมายถึง สัตว์ทะเลที่มีรูปร่างทรงกระบอก สามารถฉีดน้ำออกมาทางปลายส่วนบนได้ จัดอยู่ใน Class Ascidiacea มีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 1,250 ชนิด สัตว์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในทะเลทั้งหมดและจัดอยู่ในสัตว์ที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่าง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง เนื่องจากตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้ายลูกอ๊อด (Tadpole larva) คล้ายตัวอ่อนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีโนโตคอร์ดที่ถูกสร้างด้วยกลุ่มเซลล์รวมตัวเป็นท่อนๆคล้าย กระดูกสันหลังของตัวอ่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วไปและจะหดหายไปเมื่อกลายเป็นตัวเต็มวัย เพรียงหัว หอมดำรง ชีวิตทั้งที่อยู่เดี่ยวๆและอยู่รวมกันเป็นโคโลนี แต่ละสมาชิกในโคโลนีจะเรียกว่า “ซูดอยด์” (Zooids) ร่างกายมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกตรงกลางจะโป่งออกมาคล้ายถังไม้ไผ่ มีฐานเรียบหรือมีก้าน หรือเส้นใยสำหรับเกาะพื้น เพรียงหัวหอมทุกชนิดมีช่องเปิด 2 ช่องคือ ช่องน้ำเข้าซึ่งเป็นปาก และช่องน้ำออก ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ภายในช่องลำตัวประกอบด้วยขนขนาดเล็ก มีหน้าที่ดักจับอาหารที่เป็นแพลงก์ตอนพืช และแบคทีเรีย ส่วนเซลล์สืบพันธุ์และสิ่งขับถ่ายจะถูกขับออกมาทางช่องน้ำออกขนาดเล็ก เรามักจะพบเพรียง หัวหอมติดอยู่กับก้อนหิน ซากปะการังหรือบนใบสาหร่ายในแนวปะการัง ตามโขดหินชายฝั่งทะเลและตาม เสาสะพานท่าเทียบเรือ เพรียงหัวหอมที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะคล้ายกับฟองน้ำมาก แต่จะขอให้สังเกต ว่าเป็นเพรียงหัวหอมจะมีช่องน้ำเข้าขนาดเล็กๆเห็นได้ชัด และมีช่องน้ำออกขนาดใหญ่ติดกับฟองน้ำที่มีช่อง น้ำเข้าขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและมีช่องน้ำออกขนาดใหญ่ เพรียงหัวหอมที่อาศัยอยู่ในแนว ปะการังมักจะมีสีส้มสวยงาม เป็นสัตว์ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชนิดหนึ่ง



อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

พื้นที่การศึกษา

การศึกษานี้ครอบคลุมแนวปะการังตามเกาะต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเกาะต่างๆ ออกเป็นหมู่ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และตั้งชื่อตามชื่อของเกาะที่เป็นหลัก เกาะที่ทำการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 หมู่เกาะ ตามลำดับจากอ่าวไทยตอนในออกมาทางตอนนอก ดังแสดงไว้ในภาพที่ 6 สำหรับรายละเอียด ชื่อ ที่ตั้ง และเกาะที่ทำการสำรวจมีรายละเอียด ดังนี้

1. หมู่เกาะสีชัง เป็นหมู่เกาะที่อยู่ตอนในสุดของอ่าวไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 10 ลิปดา ถึง 13 องศา 20 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 42 ลิปดา ถึง 100 องศา 47 ลิปดา ตะวันออก ตำแหน่งดังกล่าวอยู่ตรงข้ามชายฝั่งอำเภอศรีราชา มีเกาะทำการศึกษารวม 4 เกาะคือ เกาะสีชัง เกาะยายท้าว เกาะคางคาวและเกาะท้ายคาหมื่น รวม 4 จุดสำรวจ ประกอบด้วย

- 1.1 ช่องเขาขาด ทิศตะวันตกของเกาะสีชัง
- 1.2 เกาะยายท้าว ทิศใต้
- 1.3 เกาะคางคาว ทิศตะวันออก
- 1.4 เกาะท้ายคาหมื่น ทิศตะวันออก

2. หมู่เกาะล้าน เป็นหมู่เกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งในเขตเมืองพัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาไปทางทิศ ตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 องศา 50 ลิปดา ถึง 13 องศา 00 ลิปดา เหนือ และ เส้นแวงที่ 100 องศา 46 ลิปดาถึง 100 องศา 50 ลิปดา ตะวันออก มีเกาะทำการศึกษารวม 3 เกาะคือ เกาะ ล้าน เกาะครก และเกาะสาก รวม 9 จุดสำรวจ ประกอบด้วย

- 2.1 แหลมทองกลาง ทิศเหนือของเกาะล้าน
- 2.2 หาดสังวาลย์ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะล้าน
- 2.3 หาดเทียน ทิศตะวันตกของเกาะล้าน
- 2.4 หาดแสม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้าน
- 2.5 หาดนางนวล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะล้าน
- 2.6 เกาะครก ทิศตะวันตก
- 2.7 เกาะครก ทิศตะวันออก
- 2.8 อ่าวเกาะสาก ทิศเหนือของเกาะสาก
- 2.9 เกาะสาก ทิศใต้

๕๗๑.๗๗

๗๒๒

๕.๖

3. หมู่เกาะไผ่ เป็นหมู่เกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งของเมืองพัทยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในอดีตเคยมีชาวประมงอาศัยอยู่บ้างแต่ปัจจุบันได้ย้ายออกไปแล้ว เกาะไผ่อยู่ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 25 กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะล้านห่างจากเกาะล้านประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง ที่ 12 องศา 47 ลิปดา ถึง 13 องศา 00 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 35 ลิปดา ถึง 100 องศา 42 ลิปดา

ตะวันออก มีเกาะที่ทำการศึกษารวม 6 เกาะคือ เกาะไผ่ เกาะเหลื่อม เกาะเหลื่อมน้อย เกาะหูช้าง เกาะกึ่งบาดาล เกาะมารวิชัย และเกาะรีน รวม 13 จุดสำรวจ ประกอบด้วย

- 3.1 แหลมบ่อน้ำ ทิศตะวันตกของเกาะไผ่
- 3.2 แหลมหาดกรวด ทิศใต้ของเกาะไผ่
- 3.3 แหลมทองกลาง ทิศตะวันออกของเกาะไผ่
- 3.2 แหลมดาดี ทิศเหนือของเกาะไผ่
- 3.4 เกาะเหลื่อม ทิศเหนือ
- 3.5 เกาะเหลื่อม ทิศตะวันตก
- 3.6 เกาะเหลื่อม ทิศตะวันออก
- 3.7 เกาะเหลื่อมน้อย
- 3.8 เกาะหูช้าง ทิศตะวันออก
- 3.9 เกาะหูช้าง ทิศตะวันตก
- 3.10 เกาะกึ่งบาดาล ทิศตะวันออก
- 3.11 เกาะกึ่งบาดาล ทิศตะวันตก
- 3.12 เกาะมารวิชัย ทิศตะวันออก
- 3.13 เกาะมารวิชัย ทิศตะวันตก

4. หมู่เกาะรีน เป็นเกาะที่อยู่ทางทิศใต้ของหมู่เกาะไผ่ ตั้งอยู่บริเวณระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 องศา 47 ลิปดา 59.91 ฟลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 42 ลิปดา 14.98 ฟลิปดา ตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 12 องศา 47 ลิปดา 21.88 ฟลิปดา เหนือและเส้นแวงที่ 100 องศา 42 ลิปดา 22.55 ฟลิปดาตะวันออก มีเกาะที่ทำการศึกษารวม 2 เกาะ คือ เกาะรีนและเกาะหินขาว รวม 3 จุดสำรวจ ประกอบด้วย

- 4.1 เกาะรีน ทิศเหนือ
- 4.2 เกาะรีน ทิศใต้
- 4.3 เกาะหินขาว

5. หมู่เกาะคราม เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือในอำเภอสตูล เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหายากโดยเฉพาะเต่าทะเล ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 องศา 40 ลิปดา ถึง 12 องศา 48 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 46 ลิปดา ถึง 100 องศา 50 ลิปดา ตะวันออก มีเกาะที่ทำการศึกษา 3 เกาะคือ เกาะคราม เกาะครามน้อย และเกาะอีร้า รวม 5 จุดสำรวจ ประกอบด้วย

- 5.1 อ่าวพุดซาวัน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคราม
- 5.2 หาดต้นเลียบ ทิศเหนือของเกาะคราม
- 5.3 หาดหน้าบ้าน ทิศตะวันออกของเกาะคราม
- 5.4 เกาะครามน้อย ทิศตะวันออก

5.5 เกาะอีร้า ทิศตะวันออก

6. หมู่เกาะแสมสาร เป็นหมู่เกาะในอำเภอสัตหีบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในอดีตเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ ปัจจุบันเป็นเกาะอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 องศา 20 ลิปดา ถึง 12 องศา 30 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 55 ลิปดา ถึง 101 องศา 00 ลิปดา ตะวันออก มีเกาะที่ทำการศึกษารวม 2 เกาะคือ เกาะแสมสารและเกาะขาม รวม 6 จุดสำรวจ ประกอบด้วย

6.1 อ่าวหมาจอบ แนวปะการังชายฝั่ง ค่ายลแสมสาร

6.2 เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก

6.3 เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก

6.4 เกาะขาม ทิศเหนือ

6.5 แหลมญี่ปุ่น ทิศใต้ของเกาะขาม

6.6 หินหลักเบ็ด ทางทิศเหนือของเกาะขาม

วิธีการศึกษา

1. ทำการสำรวจในพื้นที่ทำการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 2540 – เดือนมีนาคม 2545 โดยการดำน้ำทั้งการดำน้ำผิวน้ำ (Skin diving) และการใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ (SCUBA diving) ในเวลากลางวัน และตุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ในบริเวณทำการสำรวจตั้งแต่เขตปะการังพื้นราบ (Reef flat) จนถึงเขตปะการังลาดชัน (Reef slope) ต่อเนื่องออกไปตามพื้นทรายในบริเวณใกล้เคียง ตัวอย่างที่พบจะทำการบันทึกภาพใต้น้ำ ตำแหน่งและความลึกที่พบ ลักษณะและชนิดวัตถุใต้น้ำที่สัตว์เกาะติด รวมทั้งข้อสังเกตทางพฤติกรรมบางประการ จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อคเพื่อนำไปจำแนกชนิดต่อไป ในกรณีที่ตัวอย่างพบได้ทั่วไปหรือหายากแต่รู้ชื่อชนิดแล้วจะไม่ทำการเก็บตัวอย่างแต่จะบันทึกข้อมูลไว้ เนื่องจากทางคณะสำรวจต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เหล่านี้ไว้ หลังจากนั้นจะนำตัวอย่างไปทำการจำแนกชนิดในห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

2. ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม มาจัดทำรายงานการวิจัยโดยแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของตารางชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลที่พบจากการสำรวจตามแหล่งที่พบ และภาพใต้น้ำเพื่อใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานสัตว์ทะเลในแนวปะการังจังหวัดชลบุรีต่อไป

เอกสารหลักอ้างอิง

ในการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังครั้งนี้ใช้เอกสารหลักในการอ้างอิงดังต่อไปนี้

ภาพรวมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Marine Invertebrates in General) ประกอบด้วย

1. Colin, P.L. and C. Arneson. 1995. Tropical pacific invertebrates: A field guide to the marine invertebrate occurring on tropical Pacific coral reefs, seagrass beds and mangroves. Coral Reef Press, USA. 296 p.
2. George, J.D. and J.J. George. 1979. Marine Life: An illustrated Encyclopedia of invertebrate in the sea. John Wiley & Sons, New York. 288 p.
3. Gosliner, T.M., D.W. Behrens and G.C. Williams. 1996. Coral reef animals of the Indo-Pacific: Animal life from Africa to Hawaii exclusive of the Vertebrates. Sea Challengers, Monterey, California. 314 p.
4. Arnold, P.W. and R.A. Birtles. 1985. Soft-Sediment Marine Invertebrates of Southeast Asia and Australia: A Guide to Identification. S.A. English. (eds.). Australian Institute of Marine Science, Townsville, 272 p.

ฟองน้ำทะเล (Phylum Porifera) ประกอบด้วย

1. Hooper, J.N.A. 1997. Sponge Guide. Queensland Museum, Australia. 143 p.
2. Hooper J.N.A. and R.W.M. Van Soest. 2002. Systema Porifera. Vol. I & II. Kluwier Publisher Company, UK. 1708 p.
3. Bergquist, P.R. 1965. Sponges of the Palua Islands I. *Pacific Science*, 19(2):123-204.

ปะการังแข็ง (Phylum Cnidaria, Order Scleractinia) ประกอบด้วย

1. ตรงค์ ยิ่งชล. 2540. ชนิดของปะการังแข็งที่พบบริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2540. มหาวิทยาลัยบูรพา. 32 หน้า.
2. วรณพร จิรวัฒน์. 2528. การศึกษาอนุกรมวิธานของปะการังชนิดแข็งที่รวบรวมได้จากอ่าวไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 297 หน้า.
3. Veron, J.E.N. 1986. Corals of Australia and Indo-Pacific. Angus and Robertson Publishing. 644 p.
4. Veron, J.E.N. 2000. Corals of the World Vol. I-III. Angus and Robertson Publishing.

ในดาเรียอื่นๆ (Phylum Cnidaria, other than Order Scleractinia) ประกอบด้วย

1. Fautin, D.G. and G.R. Allen. 1992. Field Guide to Anemonefishes and their host sea anemones. Western Australian Museum, Perth. 157 p.

สัตว์ในกลุ่มหนอนทะเล (Phylum Platyhelminthes, Phylum Nemertea, Phylum Annelida, Phylum Sipunculida, Phylum Echiura) ประกอบด้วย

1. Fauchald, K. 1977. The polychaete worms: Definition and key of the Orders, Family and Genera. Natural History Museum of Los Angeles County. 188 p.

2. Gibson, R. 1997. Chapter 16: Nemerteans (Phylum Nemertea). pp. 905-975. In S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.

3. <http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~bu6/index.html>

สัตว์ในกลุ่มโลโฟพอร์เลต (Phylum Entoprocta, Phylum Phoronida, Phylum Bryozoa)

ประกอบด้วย

1. Shepherd, S.A. 1997. Chapter 18: Phoronids (Phylum Phoronida). pp. 993-998. In S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.
2. Wasson, K. and S.A. Shepherd. 1997. Chapter 17: Nodding heads (Phylum Kamptozoa Or Entoprocta). pp. 975-992. In S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.

หอยและหมีก (Phylum Mollusca) ประกอบด้วย

1. กิตติธรรพรพานิช. 2527. การศึกษาชนิดของหอยตามแนวปะการังบริเวณชายฝั่งบ้านช่องแสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี. ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 77 หน้า.
2. กิตติธรรพรพานิช. 2538. การศึกษาอนุกรมวิธานของหอยทะเลปากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรีและระยอง). เอกสารงานวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. เลขที่ 62/2538. 57 หน้า.
3. Abbott, R.T. and S.P. Dance. 2000. Compendium of sea shells. Odyssey Publishing, USA. 411p.
4. Dance, S.P. 1974. The collector's encyclopedia of shells. McGraw-Hill Book Company, New York, 288 p.
5. Ono, A. 1999. Opisthobranchs of Kerama Islands. TBS-Britannica Co., LTD., Japan 183 p.
6. Swenne C., R.G. Moolenbeek, N. Ruttanadukul, H. Hobbelink, H. Dekker and S. Hajisamae. 2001. The molluscs of the Southern Gulf of Thailand. *Thai Studies in Biodiversity* 4: 210 p.
7. Wells, F.E. and C.W. Bryce. 1993. Sea slugs and their relatives of Western Australia. Western Australian Museum, Australia. 184 p.

กุ้ง กั้ง ปู (Phylum Arthropoda) ประกอบด้วย

1. ชินวัฒน์ พิทักษ์สาธิต. 2523. อนุกรมวิธานของปูเสฉวนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 147 หน้า.


2. พะยอม ข่อยงาม. 2525. การศึกษาชนิดของปูน้ำเค็มที่เก็บได้จากท่าเทียบเรือประมงในอ่าวไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 196 หน้า.
3. สมชาย ศรีพงษ์. 2528. การสำรวจชนิดของปูที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ Coelenterates Sponges, Mollusks บางชนิด บริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
4. สาริต โกวิทวที. 2531. การศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้ำเค็ม กุ้งกระดาน และกุ้งมังกร บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย. รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 80 หน้า.
5. สาริต โกวิทวที. 2534. การศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้งทะเลและกุ้งคักแดนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 141 หน้า.

เอคไคโนเดิร์ม (Phylum Echinodermata) ประกอบด้วย

1. สุมเมตต์ ปุณณาการ. 2541. การศึกษาอนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มบริเวณชายฝั่งตะวันออก. รายงานการวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. 109 หน้า 8 แผ่นภาพ.
2. Clark, A.M & F.W.E. Rowe. 1971. Monograph of shallow-water Indo-West Pacific Echinoderms. Trustees of the British Museum (Natural History), London: 238 p., 100 fig., 31 pls..
3. Cannon, L.R.G. & H. Silver. 1986. Sea cucumber of Northern Australia. Queensland Museum, South Brisbane, Australia : 60 p. 11 figs..
4. Guille, A., P. Laboute & J.-L. Menou. 1986. Guide des étoiles de mer, oursins et autres échinodermes du lagon de Nouvelle-Calédonie. OSTROM, Paris. 238 p.
5. Hoggett, A.K. 1991. The Genus *Macrophiothrix* (Ophiuroidea: Ophiotrichidae) in Australian Waters. *Invertebr. Taxon.* 4: 1077-1146, 36 figs.

เพรียงหัวหอม (Phylum Chordata, Subclass Urochordata) ประกอบด้วย

1. Kott, P. 1997. Chapter 23: Tunicates (Sub-Phylum Tunicata). pp. 1092-1255. In S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.
2. Monniot, C., F. Monniot and P. Laboute. 1991. Coral Reef Ascidiates of New Caledonia. OSTROM, Paris. 248 p.
3. Tokioka, T. 1967. Pacific Tunicata of the United States National Museum. *United States National Museum Bulletin* 251. Smithsonian Press. 247 p.



ภาพที่ 6 แผนที่แสดงพื้นที่ทำการศึกษาตามหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี

ผลการศึกษา

จากการสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบริเวณแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆและชายฝั่งทะเลใน จังหวัดชลบุรี รวม 22 เกาะ จำนวน 40 จุดสำรวจ ระหว่างเดือนมกราคม 2540 – เดือนมีนาคม 2545 โดยการสำรวจใช้วิธีการดำน้ำและสุมเก็บตัวอย่างตั้งแต่เขตปะการังพื้นราบจนถึงขอบนอกแนวปะการังในบริเวณจุดสำรวจ พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 428 ชนิด จาก 15 Phyla จำแนกออกได้ดังนี้ ฟองน้ำ (Porifera) 54 ชนิด ในคาเรีย (Cnidaria) 151 ชนิด หวีวุ้น (Ctenophora) 1 ชนิด หนอนตัวแบน (Platyhelminth) 8 ชนิด หนอนริบบิ้น (Nemertea) 1 ชนิด หนอนปล้อง (Annelida) 18 ชนิด หนอนถั่ว (Siphuncula) 1 ชนิด หนอนชอน (Echiura) 1 ชนิด หนอนถั่ว (Entoprocta) 1 ชนิด หนอนเกลือ (Phoronida) 1 ชนิด ไบรโอซัว (Ectoprocta) 3 ชนิด มอลลัสกา (Mollusca) 63 ชนิด กุ้ง กั้ง ปู (Arthropoda) 21 ชนิด เอคไคโนเดิร์ม (Echinodermata) 71 ชนิด และเพรียงหัวหอม (Chordata, Urochordata) 32 ชนิด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ฟองน้ำทะเล (Marine sponges) จากการสำรวจพบฟองน้ำทะเลทั้งหมดจำนวน 54 ชนิดแบ่งออกเป็นฟองน้ำใน class Demospongiae จำนวน 52 ชนิดและฟองน้ำหินปูน (Class Calcarea) 2 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 และแผ่นภาพที่ 1 ฟองน้ำที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 26 ชนิด หมู่เกาะล้าน 38 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 25 ชนิด หมู่เกาะรี 20 ชนิด หมู่เกาะคราม 34 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 29 ชนิด ฟองน้ำที่พบเป็นชนิดเด่นและพบในทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ฟองน้ำลูกกอล์ฟ, *Paratetilla bacca*; ฟองน้ำหนังสีน้ำตาล, *Chondrilla australiensis*; ฟองน้ำฝักตัว, *Biemna fortis*; ฟองน้ำฝักตัวสีแดง, *Mycale (Aegogropila) grandis*; ฟองน้ำเคลือบบางสีน้ำตาล, *Phobas arborescens*; ฟองน้ำสีดำเมือกม่วง, *Iotrochota baculifera*; ฟองน้ำเคลือบสีเหลืองดำ, *Iotrochota purpurea*; ฟองน้ำเคลือบสีฟ้า, *Gelliodes petrosioides*; ฟองน้ำสีน้ำเงิน, *Neopetrosia* sp. “blue”; ฟองน้ำสีม่วง, *Xestospongia* sp.; ฟองน้ำครก, *Xestospongia testudinaria*; ฟองน้ำท่อพุ่มสีแดง, *Oceanapia sagittaria*; ฟองน้ำยืดหยุ่นสีดำ, *Hyrtios gumminea*; ฟองน้ำเคลือบสีม่วง, *Chelonaphysilla erecta* และฟองน้ำเปลี่ยนสีสีเหลือง, *Pseudoceratina* sp. ฟองน้ำที่พบเป็นชนิดเด่นเหล่านี้ เป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปในแนวปะการังในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (นิจนาจ ชัยชนาวินสุทธิ์ และคณะ, 2545) และทะเลจีนใต้ (Hooper, 2000)

จากการศึกษาครั้งนี้ พบฟองน้ำที่คาดว่าน่าจะเป็นฟองน้ำชนิดใหม่ประมาณ 3 ชนิด ได้แก่ ฟองน้ำเคลือบสีแดง, *Raspailia (Raspaxilla)* sp. ซึ่งเป็นฟองน้ำที่ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบในภูมิภาคทะเลจีนใต้อีกด้วย, ฟองน้ำสีน้ำเงิน, *Neopetrosia* sp. “blue” ซึ่งเป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปแต่ไม่มีผู้ใดทำการบรรยายชนิด ฟองน้ำชนิดนี้สามารถพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำสวยงามได้, ฟองน้ำสีม่วง, *Xestospongia* sp. “purple” เป็นฟองน้ำที่พบอยู่ทั่วไปทุกหมู่เกาะชอบอาศัยอยู่ในถิ่นอาศัยที่มีแสงสว่างค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังพบฟองน้ำหูช้าง, *Cliona patera* ซึ่งเป็นฟองน้ำหายาก (Rare species) ชนิดหนึ่งของโลกและเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 นอกจากนี้ยังพบฟองน้ำอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถทำการจำแนกชนิดได้ในระดับชนิด โดยเฉพาะฟองน้ำในสกุล *Haliclona* ซึ่งเป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปในแนวปะการังและมีลักษณะและโครงสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของฟองน้ำทะเลในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Family Tethyidae							
10. <i>Tethya seychellensis</i> (Wright)	ฟองน้ำลูกบอล	-	-	X	-	-	X
Order POECILOSCLERIDA							
Suborder MICROCIONINA							
Family Microcionidae							
11. <i>Clathria (Thalysias) reinwardti</i> Vosmer	ฟองน้ำเชือก	X	X	X	-	X	X
12. <i>Clathria (Thalysias)</i> sp.	ฟองน้ำเคลือบสีส้ม	X	-	-	-	-	-
13. <i>Clathria (Microciona)</i> sp.	ฟองน้ำเคลือบสีแดงลายขาว	X	-	-	-	X	X
Family Raspailiidae							
14. <i>Echinodictyum asperum</i> Ridley&Dendy	ฟองน้ำก้อนหนามสีน้ำตาล	X	X	-	-	-	-
15. <i>Raspailia (Raspaxilla)</i> sp.	ฟองน้ำเคลือบสีแดง	-	-	-	X	-	-
Suborder Mycalina							
Family Desmacellidae							
16. <i>Biemna fortis</i> (Topsent)	ฟองน้ำฝักตัว	X	X	X	X	X	X
Family Isodictyiidae							
17. <i>Coelocarteria singaporensis</i> (Carter)	ฟองน้ำกระชาย	-	X	-	-	X	-
Family Mycalidae							
18. <i>Mycale (Aegogropila) grandis</i> Gray	ฟองน้ำฝักตัวสีแดง	X	X	X	X	X	X
19. <i>Mycale (Zygomycale) parishii</i> (Bowerbank)	ฟองน้ำเคลือบสีม่วงคราม	X	X	-	-	-	-
Suborder MYXILLINA							
Family Hymedesmiidae							
20. <i>Phobas arborescens</i> (Ridley)	ฟองน้ำเคลือบบางสีน้ำตาล	X	X	X	X	X	X
Family Iotrochotidae							
21. <i>Iotrochota baculifera</i> Ridley	ฟองน้ำสีด้าเมือกม่วง	X	X	X	X	X	X
22. <i>Iotrochota purpurea</i> (Bowerbank)	ฟองน้ำเคลือบสีเหลืองด้า	X	X	X	X	X	X
Family Crambeidae							
23. <i>Monanchora unguiculata</i> (Dendy)	ฟองน้ำเคลือบบางสีแดง	-	X	X	X	X	-
Order HALICHONDRIDA							
Family Halichondriidae							
24. <i>Amorphinopsis excavan</i> Carter	ฟองน้ำปะการังสีฟ้า	-	X	-	-	-	-
25. <i>Halichondria</i> sp.	ฟองน้ำสีม่วง	X	-	-	-	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของฟองน้ำทะเลในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Family Axinellidae							
26. <i>Dragmacidon australis</i> (Bergquist)	ฟองน้ำเคลือบสีส้ม	X	-	-	-	-	-
Order HAPLOSCLERIDA							
Suborder HAPLOSCLERINA							
Family Chalinidae							
27. <i>Haliclona</i> (Gellius) <i>cymaeiformis</i> Esper	ฟองน้ำสีเขียว	X	-	-	-	X	X
28. <i>Haliclona</i> (Gellius) <i>amboinensis</i> (Lévi)	ฟองน้ำก้อนหนามสีขาว	-	X	-	-	-	-
29. <i>Haliclona</i> (<i>Halichoclona</i>) sp.	ฟองน้ำหินปูนสีเทา	-	-	-	-	-	X
30. <i>Haliclona</i> (<i>Reniera</i>) <i>toxius</i> (Topsent)	ฟองน้ำปะการังสีม่วง	-	X	-	-	X	-
31. <i>Haliclona</i> (<i>Reniera</i>) sp.1	ฟองน้ำปะการังสีม่วง	-	X	-	-	X	-
32. <i>Haliclona</i> (<i>Reniera</i>) sp.2	ฟองน้ำเส้นหมี่สีดำ	-	-	-	-	-	X
33. <i>Haliclona</i> (<i>Rhizoniera</i>) sp.	ฟองน้ำเคลือบสีฟ้า	-	X	-	-	X	-
34. <i>Haliclona</i> (<i>Soestella</i>) sp.	ฟองน้ำสีดำ	X	X	-	-	X	X
Family Callyspongiidae							
35. <i>Callyspongia</i> (<i>Toxochalina</i>) <i>folioides</i> (Bowerbank)	ฟองน้ำหนามสีฟ้า	-	X	-	-	X	-
36. <i>Callyspongia</i> (<i>Euplaccella</i>) <i>joubini</i> Topsent	ฟองน้ำหนามสีขาว	-	X	X	-	X	-
Family Niphatidae							
37. <i>Gelliodes petrosioides</i> Dendy	ฟองน้ำเคลือบสีฟ้า	X	X	X	X	X	X
Suborder PETROSINA							
Family Petrosiidae							
38. <i>Neopetrosia exigua</i> (Kirkpatrick)	ฟองน้ำสีน้ำตาล	-	-	X	X	X	-
39. <i>Neopetrosia</i> sp. "blue"	ฟองน้ำสีน้ำเงิน	X	X	X	X	X	X
40. <i>Xestospongia testudinaria</i> (Lamarck)	ฟองน้ำครก	X	X	X	X	X	X
41. <i>Xestospongia</i> sp. "purple"	ฟองน้ำสีม่วง	X	X	X	X	X	X
Family Phloeodictyidae							
42. <i>Aka mucosa</i> (Bergquist)	ฟองน้ำฝักตัวสีดำ	-	-	-	-	-	X
43. <i>Oceanapia sagittaria</i> (Sollas)	ฟองน้ำท่อพุ่มสีแดง	X	X	X	X	X	X
Order DICTYOCERATIDA							
Family Dysideidae							
44. <i>Lamellodysidea herbacea</i> (Keller)	ฟองน้ำสีเขียว	-	-	-	X	-	X
45. <i>Dysidea</i> sp. "bushy white"	ฟองน้ำคั่นไม้สีขาว	-	X	X	-	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของฟองน้ำทะเลในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Family Irciniidae	ฟองน้ำก้อนสีขาว						
46. <i>Ircinia mutans</i> (Wilson)		-	X	-	-	X	-
Family Thorectidae	ฟองน้ำขีดหุ่นสีดำ						
47. <i>Hyrtios gumminea</i> (Ridley)		X	X	X	X	X	X
Order DENDROCERATIDA	ฟองน้ำเคลือบสีม่วง						
Family Darwinellidae							
48. <i>Chelonaplysilla erecta</i> (Row)		X	X	X	X	X	X
Order HALISARCA	ฟองน้ำเคลือบสีขาว						
Family Halisarcidae							
49. <i>Halisarca ectofibrosa</i> Vancelet et al.		-	X	-	-	-	-
Order VERONGIDA	ฟองน้ำเคลือบสีทองอ่อน ฟองน้ำเปลี่ยนสีสีเหลือง ฟองน้ำเปลี่ยนสีสีเหลือง						
Family Ianthellidae							
50. <i>Hexadella purpurea</i> (Burton)		-	X	-	-	X	-
Family Pseudoceratinidae							
51. <i>Pseudoceratina purpurea</i> (Carter)		-	X	X	-	X	X
52. <i>Pseudoceratina</i> sp.		X	X	X	X	X	X
Class CALCAREA	ฟองน้ำหินปูนท่อสีขาว ฟองน้ำหินปูนท่อสีขาว						
Order CLATHRINIDA							
Family Clathrinidae							
53. <i>Clathrina</i> sp.1		-	-	X	-	-	-
54. <i>Clathrina</i> sp.2		-	-	X	-	-	-



ฟองน้ำลูกกอล์ฟ, *Paratetilla bacca*



ฟองน้ำต้นไม้สีดำ, *Pachampilla* sp.




ฟองน้ำหนังสีน้ำตาล, *Chondrilla australiensis*



ฟองน้ำหนังสีดำ, *Chondrilla nucula*




ฟองน้ำหนังสีน้ำตาลลาย, *Chondrosia chucalla*



ฟองน้ำหูช้าง, *Cliona patera*




ฟองน้ำฝักตัวสีส้ม, *Cliona aurivillii*




ฟองน้ำปล่องภูเขาไฟ, *Spheciospongia congenera*


แผ่นภาพที่ 1 ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี



ฟองน้ำเคลือบสีน้ำเงิน, *Protosuberites granulosa*




ฟองน้ำลูกบอล, *Tethya seychellensis*




ฟองน้ำเชือก, *Clathria (Thalysias) reinwardti*



ฟองน้ำเคลือบสีส้ม, *Clathria (Thalysias) reinwardti*




ฟองน้ำเคลือบสีแดงลายขาว, *Clathria (Microciona) sp.*



ฟองน้ำก้อนหนาม, *Echinodictyum asperum*



ฟองน้ำเคลือบสีแดง, *Raspailia (Raspaxilla) sp*




ฟองน้ำฝังตัว, *Biemna fortis*


แผ่นภาพที่ 1 (ต่อ) ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี



ฟองน้ำกระชาย, *Coelocarteria singaporensis*



ฟองน้ำฝักตัวสีแดง, *Mycale (Aegogropila) grandis*




ฟองน้ำเคลือบสีม่วงคราม, *Mycale (Zygomycale) parishii*



ฟองน้ำเคลือบสีน้ำตาล, *Phobas arborescens*




ฟองน้ำสีดำเมือกม่วง, *Iotrochota baculifera*



ฟองน้ำเคลือบสีเหลืองดำ, *Iotrochota purpurea*



ฟองน้ำเคลือบบางสีแดง, *Monanchora unguiculata*



ฟองน้ำปะการังสีฟ้า, *Amorphinopsis excavan*


แผ่นภาพที่ 1(ต่อ) ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ฟองน้ำสีม่วง, *Halichondria* sp.



ฟองน้ำเคลือบสีส้ม, *Dragmacidon australis*




ฟองน้ำสีเขียว, *Haliclona (Gellius) cymaeformis*




ฟองน้ำก้อนหนามสีขาว, *Haliclona (Gellius) amboinensis*



* ฟองน้ำหินปูนสีเทา, *Haliclona (Halichoclona)* sp.



ฟองน้ำปะการังสีม่วง, *Haliclona (Reniera) toxius*



ฟองน้ำปะการังสีม่วง, *Haliclona (Reniera)* sp.1



ฟองน้ำเส้นไหมสีดำ, *Haliclona (Reniera)* sp.2

แผ่นภาพที่ 1(ต่อ) ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ฟองน้ำเคลือบสีฟ้า, *Haliclona (Rhizoniera)* sp.




ฟองน้ำสีดำ, *Haliclona (Soestella)* sp.




ฟองน้ำหนามสีฟ้า, *Callyspongia (Toxochalina) folioides*




ฟองน้ำหนามสีขาว, *Callyspongia (Euplacella) joubini*



ฟองน้ำเคลือบสีฟ้า, *Gelliodes petrosioides*



ฟองน้ำสีน้ำตาล, *Neopetrosia exigua*



ฟองน้ำสีน้ำเงิน, *Neopetrosia* sp. "blue"



ฟองน้ำครก, *Xestospongia testudinaria*


แผ่นภาพที่ 1(ต่อ) ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ฟองน้ำสีม่วง, *Xestospongia* sp. "purple"



ฟองน้ำฝักตัวสีดำ, *Aka mucosa*




ฟองน้ำท่อพุ่มสีแดง, *Oceanapia sagittaria*



ฟองน้ำสีเขียว, *Lamellodysidea herbacea*



ฟองน้ำต้นไม้สีขาว, *Dysidea* sp. "bushy white"



ฟองน้ำก้อนสีขาว, *Ircinia mutans*




ฟองน้ำปีกหุบสีดำ, *Hyrtios gumminea*




ฟองน้ำเคลือบสีม่วง, *Chelonaplysilla erecta*

แผ่นภาพที่ 1(ต่อ) ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ฟองน้ำเคลือบสีขาว, *Halisarca ectofibrosa*




ฟองน้ำเคลือบสีตองอ่อน, *Hexadella purpurea*




ฟองน้ำเปลี่ยนสีสีเหลือง, *Pseudoceratina purpurea*



ฟองน้ำเปลี่ยนสีสีเหลือง, *Pseudoceratina* sp.



ฟองน้ำหินปูนท่อสีขาว, *Clathrina* sp.1



ฟองน้ำหินปูนท่อสีขาว, *Clathrina* sp.2

แผ่นภาพที่ 1 (ต่อ) ฟองน้ำทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี

2. **ไนดาเรีย (Phylum Cnidaria)** จากการสำรวจพบว่าไนดาเรียเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบมากที่สุดคือ 151 ชนิดจาก 3 กลุ่มใหญ่ประกอบด้วย Class Anthozoa (ปะการังแข็ง กัลปังหา ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล) จำนวน 142 ชนิด Class Hydrozoa (ไฮดรอยด์) 7 ชนิดและ Class Scyphozoa (แมงกะพรุนแท้) 2 ชนิด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 2 ดังนี้คือ

Class Anthozoa เป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบมากที่สุด โดยเฉพาะปะการังแข็งซึ่งเปรียบเสมือนกับเจ้าบ้านในแนวปะการัง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์อื่นๆเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย สัตว์ที่พบในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 9 อันดับด้วยกันคือ

2.1 ปะการังแข็ง (Order Scleractinia) จากการสำรวจพบปะการังแข็งทั้งหมด 89 ชนิดจาก 14 วงศ์ ปะการังแข็งที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 34 ชนิด หมู่เกาะล้าน 70 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 67 ชนิด หมู่เกาะรีน 35 ชนิด หมู่เกาะคราม 43 ชนิดและหมู่เกาะเสมสาร 42 ชนิด ปะการังแข็งที่พบเป็นชนิดเด่นและพบในทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ, *Pocillopora damicornis*; ปะการังเขากวางฟุ่ม, *Acropora cytherea*; ปะการังเขากวางโต๊ะ, *Acropora hyacinthus*; ปะการังเขากวางกิ่ง, *Acropora formosa*; ปะการังเขากวางพุ่ม, *Acropora humilis*; ปะการังดาว, *Asteropora myriophthalma*; ปะการังเห็ด, *Fungia (Fungia) fungites*; ปะการังพาน, *Podabacia crustacea*; ปะการังโจด, *Porites lutea*; ปะการังดอกไม้ทะเลหนวดยาว, *Goniopora norfolkensis*; ปะการังลายดอกไม้, *Pavona decussata*; ปะการังลายกลีบดอกไม้, *Psammocora contigua*; ปะการังกาแลคซี่, *Galaxea astreata*; ปะการังวงแหวน, *Oulastrea crispata*; ปะการังรังผึ้ง, *Goniastrea aspera*; ปะการังรังผึ้ง, *Goniastrea retiformis*; ปะการังร่องยาว, *Goniastrea australiensis*; ปะการังวงแหวน, *Favia fava*; ปะการังวงแหวน, *Favia speciosa*; ปะการังช่องเหลี่ยม, *Favites abdita*; ปะการังสมอง, *Platygyra sinensis*; ปะการังสมองร่องยาว, *Platygyra daedalea*; ปะการังดาวใหญ่, *Diploastrea heliopora*; ปะการังดาวเล็ก, *Cyphastrea chalcidicum*; ปะการังหนามขนุน, *Hydnophora exesa*; ปะการังหนามขนุน, *Hydnophora microconos*; ปะการังสมองร่องใหญ่, *Symphyllia radians*; ปะการังถ้วยสมอง, *Lobophyllia hemprichi*; และปะการังถ้วยส้ม, *Tubastrea faulkneri* ปะการังเหล่านี้เป็นปะการังที่พบมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามแนวปะการังในเขตอินโดแปซิฟิก (Veron, 1986 และ Veron, 2000) ปะการังแข็งที่พบมีการกระจายอยู่ทุกหมู่เกาะที่สำรวจนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปทรงแบบก้อน (Massive form) ซึ่งเป็นปะการังที่เป็นสมาชิกหลักในแนวปะการังของจังหวัดชลบุรี

2.2 ปะการังอ่อน (Order Alcyoniina) จากการสำรวจพบปะการังอ่อนทั้งหมด 7 ชนิดจาก 3 วงศ์ ปะการังอ่อนที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 4 ชนิด หมู่เกาะล้าน 5 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 4 ชนิด หมู่เกาะรีน 4 ชนิด หมู่เกาะคราม 3 ชนิดและหมู่เกาะเสมสาร 6 ชนิด ปะการังอ่อนที่พบเป็นชนิดเด่นและพบในทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ปะการังอ่อนในสกุล *Cladiella*; ปะการังอ่อนนิ้วมือในสกุล *Sinularia* และปะการังอ่อนใบเฟิร์นในสกุล *Xenia* ปะการังอ่อนที่พบมีจำนวนชนิดใกล้เคียงกันทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากปะการังอ่อนต้องการถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะ เช่น บริเวณที่มีกระแสน้ำไหล เป็นต้นนอกจากนี้ ปะการังอ่อนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้เนื่องจากขาดเอกสารอ้างอิงและผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา

2.3 กัลปังหา (Order Gorgonacea) จากการสำรวจพบกัลปังหาทั้งหมด 11 ชนิดจาก 5 วงศ์ กัลปังหาที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสี่ช้าง 4 ชนิด หมู่เกาะล้าน 6 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 5 ชนิด หมู่เกาะรีน 6 ชนิด หมู่เกาะคราม 2 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 2 ชนิด กัลปังหาที่พบเป็นชนิดเด่นและพบในทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ได้แก่ กัลปังหาเส้นในสกุล *Rumphella* และกัลปังหาสี่ส้อมในสกุล *Melithaea* กัลปังหาที่พบมีจำนวนชนิดใกล้เคียงกันยกเว้นในบริเวณหมู่เกาะครามและหมู่เกาะแสมสารทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากในบริเวณนี้มีแนวปะการังค่อนข้างตื้นและไม่ลาดชันมากนัก ซึ่งจากการสำรวจมักจะพบกัลปังหาชอบอาศัยอยู่ตามบริเวณที่ค่อนข้างลาดชันตามโขดหิน โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะรีน ถึงแม้จะมีจุดสำรวจน้อยกว่าบริเวณอื่นๆแต่ก็พบว่ามีความหลากหลายของกัลปังหามากชนิดกว่าบริเวณอื่นๆ ในการจำแนกชนิดกัลปังหาเช่นเดียวกันกับปะการังอ่อนที่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้เนื่องจากขาดเอกสารอ้างอิงและผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา

2.4 ปากกาทะเล (Order Pennatulacea) จากการสำรวจพบปากกาทะเลทั้งหมด 3 ชนิดจาก 2 วงศ์ หมู่เกาะที่พบมีการแพร่กระจายของปากกาทะเลมากที่สุดคือ หมู่เกาะไผ่ พบจำนวน 3 ชนิดส่วนบริเวณอื่นๆพบเพียง 1 ชนิดคือ ปากกาทะเลในสกุล *Virgularia* และเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เราจะพบปากกาทะเลได้ตามพื้นทรายขอบนอกของแนวปะการัง

2.5 พรมงทะเล (Order Zoanthidea) เป็นสัตว์ทะเลใกล้เคียงกับดอกไม้ทะเลและมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันการลงเกาะของปะการัง จากการสำรวจพบพรมงทะเลทั้งหมด 6 ชนิดจาก 1 วงศ์ พรมงทะเลที่พบมีการแพร่กระจายมากที่สุดตามหมู่เกาะต่างๆคือ หมู่เกาะล้าน พบจำนวน 5 ชนิด รองลงมาคือหมู่เกาะไผ่และหมู่เกาะรีน ชนิดพรมงทะเลที่พบแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะได้แก่ พรมงทะเล, *Zoanthus pacificus* และพรมงทะเล, *Palythoa tuberculosa* พรมงทะเลมักจะพบเกาะติดอยู่บนวัตถุใต้น้ำ จากการศึกษาครั้งนี้พบพรมงทะเลที่อาศัยอยู่ตามพื้นทรายคือ พรมงทะเล, *Palythoa* sp.1

2.6 ดอกไม้ทะเล (Order Actinaria) เป็นในคาเรียที่มักจะพบเป็นชนิดเด่นในแนวปะการัง ทั้งยังเป็นเจ้าบ้านให้กับปลาการ์ตูน ดอกไม้ทะเลแต่ละชนิดสามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ในถิ่นอาศัยย่อยต่างๆ ในแนวปะการังได้หลากหลาย เช่น ซอกปะการัง พื้นทรายช่องว่างระหว่างปะการัง พื้นทรายหรือวัตถุใต้น้ำในแนวปะการัง เป็นต้น จากการสำรวจพบดอกไม้ทะเลทั้งหมด 16 ชนิดจาก 7 วงศ์ ดอกไม้ทะเลที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสี่ช้าง 4 ชนิด หมู่เกาะล้าน 10 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 8 ชนิด หมู่เกาะรีน 3 ชนิด หมู่เกาะคราม 7 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 10 ชนิด ดอกไม้ทะเลที่พบเป็นชนิดเด่นและพบในทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ดอกไม้ทะเลหนวดคมในสกุล *Entacmaea* ทั้งสองชนิด และดอกไม้ทะเลสีม่วง, *Heteractis magnifica* ซึ่งเป็นดอกไม้ทะเลที่เป็นเจ้าบ้านให้กับปลาอินเดียนแดง, *Amphiprion perideraion* นอกจากนี้ยังพบดอกไม้ทะเลดิน, *Heteractis malu* เป็นเจ้าบ้านให้กับปลาการ์ตูนอานม้า, *Amphiprion polymnus* ซึ่งจะพบตามขอบนอกของแนวปะการัง ดอกไม้ทะเลที่พบบางชนิดยังมีพฤติกรรมที่น่าสนใจ เช่น ดอกไม้ทะเล, *Boloceroidees mcmurichii* ที่สามารถว่ายน้ำได้และมักจะพบไปเกาะอยู่ที่ผนังลำตัวของปลิงทะเล เป็นต้น

2.7 ดอกไม้ทะเลเห็ด (Order Corallimorphalia) เป็นในคาเรียที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างปะการังแข็งกับดอกไม้ทะเล โดยที่โพลิปของดอกไม้ทะเลเห็ดมีโครงสร้างคล้ายกับโพลิปของปะการังแต่ไม่มีโครงร่างเป็นหินปูน ดอกไม้ทะเลเห็ดจึงถูกแยกออกมาจากทั้งสองกลุ่มและตั้งเป็นอันดับใหม่ จากการสำรวจพบดอกไม้ทะเลเห็ดทั้งหมด 6 ชนิดจาก 2 วงศ์ ดอกไม้ทะเลเห็ดที่พบเป็นชนิดเด่นและพบในทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ดอกไม้ทะเลเห็ดในสกุล *Discosoma* และสกุล *Metarhodactis* นอกจากนี้แล้วยังพบดอกไม้ทะเลหนวดปม, *Pseudocorynactis* sp. ซึ่งพบบริเวณพื้นทรายปนโคลนบริเวณขอบนอกของแนวปะการังและพบเฉพาะถิ่นที่หมู่เกาะลันเตานั้น

2.8 ดอกไม้ทะเลปลอก (Order Ceriantharia) เป็นดอกไม้ทะเลที่สร้างปลอกขึ้นมาห่อหุ้มลำตัวไว้และฝังตัวตามพื้นทรายในบริเวณขอบนอกของแนวปะการัง ดอกไม้ทะเลปลอกจะมีหนวดเรียงตัวรอบปากสองชั้นโดยมีหนวดยาวอยู่วงนอกและหนวดสั้นอยู่วงใน จากการสำรวจพบดอกไม้ทะเลปลอกเพียงสองชนิดในสกุล *Cerianthus* sp.1 ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะและ sp. 2 พบเฉพาะหมู่เกาะแสมสาร

2.9 ปะการังดำ (Order Antipatharia) เป็นในคาเรียที่มีลักษณะคล้ายกับกัลปังหา แต่จะแตกต่างจากกัลปังหาตรงที่ปะการังดำโพลิปมีหนวดจำนวนหกเส้นเหมือนกับดอกไม้ทะเล จากการศึกษาค้นคว้าพบสัตว์ในกลุ่มนี้เพียง 2 ชนิดคือ ปะการังดำในสกุล *Antipathes* sp. และเส้ทะเลในสกุล *Cirrhipathes* sp. ทั้งสองชนิดมักจะพบในบริเวณเขตปะการังลาดชันติดกับขอบนอกของแนวปะการัง

Class Hydrozoa เป็นในคาเรียที่มีวงจรชีวิตที่มีรูปร่างสองแบบคือ โพลิปที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก และเมดูซา (Medusae) มีลักษณะคล้ายร่ม ไฮโดรซัวที่พบในแนวปะการังจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษบางชนิดสามารถสร้างหินปูนได้เหมือนกับปะการัง แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ

2.10 ไฮโดรอยด์ (Order Hydroida) เป็นในคาเรียที่อยู่รวมกันแบบโคโลนี มีลักษณะคล้ายต้นไม้แต่จะกิ่งจะแตกแขนงออกไปเป็นซี่คล้ายขลุ่ย จากการสำรวจพบไฮโดรอยด์ทั้งหมด 7 ชนิดจาก 4 วงศ์ ไฮโดรอยด์ที่พบเป็นชนิดเด่นและพบในทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ขนนกทะเล, *Macrorhynchia philippina* เป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษ นอกจากนั้นจะเป็นไฮโดรอยด์ที่พบเฉพาะแต่ละหมู่เกาะแตกต่างกันไป จากการสำรวจในครั้งนี่ยังพบแมงกะพรุนเทียมในสกุล *Aequorea* ที่เป็นแพลงก์ตอนถาวรถูกกระแสน้ำชักนำเข้ามาในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะลันเตอีกด้วย

2.11 ปะการังไฟ (Order Milleporina) เป็นไฮโดรซัวที่สามารถสร้างหินปูนคล้ายกับปะการัง ปะการังไฟเป็นสัตว์ที่มีพิษคล้ายกับขนนกทะเล จากการสำรวจพบปะการังไฟเพียงหนึ่งชนิดคือ *Millepora platyphylla* ซึ่งเป็นปะการังไฟที่มีลักษณะเป็นแผ่นตั้งและมีการแพร่กระจายอยู่ในบริเวณหมู่เกาะไฟ หมู่เกาะริน หมู่เกาะครามและหมู่เกาะแสมสาร

Class Scyphozoa หรือแมงกะพรุนแท้ เป็นในคาเรียที่มีรูปร่างคล้ายร่ม (Medusa) ดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอน จากการศึกษาค้นคว้าพบ 1 อันดับคือ

2.12 แมงกะพรุนแท้ (Order Rhizostomae) เป็นแมงกะพรุนแท้ที่มีลักษณะคล้ายร่ม ก้านร่วมเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหาอาหารและทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ทะเลเศรษฐกิจที่สามารถนำมาแปรรูป

เป็นอาหารได้ จากการศึกษาคพบ 2 ชนิดคือ แมงกะพรุนไฟ, *Rhopilema hispidum* ซึ่งพบลอยตามกระแสน้ำเข้ามาในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะล้าน และแมงกะพรุนหนัง, *Rhopilema rhopalophorum* ถูกพัดพาเข้ามาในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะเสมสาร

3. หวีวุ้น (Comb jellyfishes, Phylum Ctenophora) หวีวุ้นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคล้ายแมงกะพรุน ลักษณะกลมรี ใส ผ่องลำตัวมีแถบซี่หวีจำนวนแปดแถบต่อเนื่องออกไปเป็นหนวด หวีวุ้นไม่มีนิมาโตซิส ดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ถาวร จากการสำรวจพบหวีวุ้นเพียงชนิดเดียวในสกุล *Bolinopsis* ซึ่งพบว่าการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะที่ทำการสำรวจ ดังแสดงไว้ในตอนท้ายของตารางที่ 2 และแผ่นภาพที่ 2

ตารางที่ 2 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของในดาเรียและหวีวุ้นในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ศึกษา: A = หมู่เกาะสีชัง; B = หมู่เกาะล้าน; C = หมู่เกาะไผ่; D = หมู่เกาะรีน; E = หมู่เกาะคราม; F = หมู่เกาะเสมสาร
การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM CNIDARIA							
Class ANTHOZOA							
Order SCLERACTINIA							
Family Pocilloporidae	ปะการังแข็ง						
1. Pocillopora damicornis (Linnaeus)	ปะการังดอกกะหล่ำ	X	X	X	X	X	X
2. Pocillopora verrucosa (Ellis & Solander)	ปะการังดอกกะหล่ำ	-	X	-	-	X	-
Family Acroporidae							
3. Acropora cytherea (Dana)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	X	X	X	X	X	X
4. Acropora daviricata (Dana)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	-	-	X	-	-	-
5. Acropora dendrum (Bassett-Smith)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	-	X	X	-	-	X
6. Acropora florida (Dana)	ปะการังเขากวางกิ่ง	-	-	X	-	-	-
7. Acropora grandis (Brook)	ปะการังเขากวางกิ่ง	-	-	X	-	X	-
8. Acropora hyacinthus (Dana)	ปะการังเขากวางโต๊ะ	X	X	X	X	X	X
9. Acropora millepora (Ehrenberg)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	-	-	X	-	-	X
10. Acropora nobilis (Dana)	ปะการังเขากวางกิ่ง	-	X	X	-	X	-
11. Acropora formosa (Dana)	ปะการังเขากวางกิ่ง	X	X	X	X	X	X
12. Acropora humilis (Dana)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	X	X	X	X	X	X
13. Acropora digitifera (Dana)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	-	-	X	-	-	-
14. Acropora samoensis (Brook)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	-	-	X	-	-	-

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของไนดาเรียและหวิ้นในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
15. <i>Acropora valida</i> (Dana)	ปะการังเขากวางฟุ่ม	-	-	X	-	-	-
16. <i>Montipora digitata</i> (Dana)	ปะการังนิ้วมือ	-	X	X	-	X	X
17. <i>Montipora aequituberculata</i> Bernard	ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง	X	X	X	-	-	X
18. <i>Montipora informis</i> Bernard	ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง	-	X	-	-	-	-
19. <i>Montipora efflorescens</i> Bernard	ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง	-	-	X	-	-	X
20. <i>Montipora tuberculosa</i> (Lamarck)	ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง	X	X	X	-	-	X
21. <i>Montipora turtlensis</i> Veron & Wallace	ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง	-	-	X	X	-	-
22. <i>Asteropora myriophthalma</i> (Lamarck)	ปะการังดาว	X	X	X	X	X	X
23. <i>Asteropora ocellata</i> Bernard	ปะการังดาว	-	X	X	-	-	X
Family Fungiidae							
24. <i>Fungia (Fungia) fungites</i> (Linnaeus)	ปะการังดอกเห็ด	X	X	X	X	X	X
25. <i>Fungia (Verrillofungia) repanda</i> Dana	ปะการังดอกเห็ด	-	-	-	-	-	X
26. <i>Ctenactis echinata</i> (Pallas)	ปะการังรองเท้าแตะ	-	X	X	X	X	X
27. <i>Herpolitha limax</i> (Houttuyn)	ปะการังนูนเมอแรง	-	-	-	X	-	-
28. <i>Polyphyllia talpina</i> (Lamarck)	ปะการังนูนเมอแรง	-	X	X	-	-	-
29. <i>Podabacia crustacea</i> (Pallas)	ปะการังพาน	X	X	X	X	X	X
30. <i>Lithophyllon mokai</i> Hoeksema	ปะการังใบหิน	-	X	-	-	-	-
Family Poritidae							
31. <i>Porites lobata</i> Dana	ปะการังโขด	-	-	X	-	-	-
32. <i>Porites lutea</i> Edwards & Haime	ปะการังโขด	X	X	X	X	X	X
33. <i>Porites (Synaraea) rus</i> (Forskal)	ปะการังผิวขี้	-	X	X	-	X	-
34. <i>Goniopora norfolkensis</i> Veron&Pichonn	ปะการังดอกไม้ทะเลหนวดขาว	X	X	X	X	X	X
35. <i>Goniopora columna</i> Dana	ปะการังดอกไม้ทะเล	-	X	X	-	-	-
36. <i>Alveopora gigas</i> Veron	ปะการังดอกไม้ทะเล	-	X	-	-	-	-
Family Agaricidae							
37. <i>Pachyseris speciosa</i> (Dana)	ปะการังลายลูกฟูก	-	-	X	-	-	-
38. <i>Coeloseris mayeri</i> Vaughan	ปะการังลายดอกไม้	-	X	-	-	-	-
39. <i>Pavona decussata</i> (Dana)	ปะการังลายดอกไม้	X	X	X	X	X	X
40. <i>Pavona explanulata</i> (Lamarck)	ปะการังลายดอกไม้	X	X	X	X	X	X
41. <i>Pavona frondifera</i> (Lamarck)	ปะการังลายดอกไม้	-	X	X	-	-	-
42. <i>Pavona cactus</i> (Forskal)	ปะการังลายดอกไม้	-	X	-	-	-	-
43. <i>Pavona venosa</i> (Ehrenberg)	ปะการังลายดอกไม้	-	X	-	-	-	-

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของไคเรียและหิวัวในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
44. <i>Gardineroseris planulata</i> (Dana)	ปะการังช่องหินอ่อน	X	X	X	-	-	-
Family Siderastreidae							
45. <i>Psammocora contigua</i> (Esper)	ปะการังลายกลีบดอกไม้	X	X	X	X	X	X
46. <i>Psammocora digitata</i> Edwards & Haime	ปะการังลายกลีบดอกไม้	-	-	X	-	-	-
47. <i>Coscinaraea exesa</i> (Dana)	ปะการังลายกลีบดอกไม้	-	X	-	-	-	-
Family Oculinidae							
48. <i>Galaxea astreata</i> (Lamarck)	ปะการังกาแล็คซี่	X	X	X	X	X	X
49. <i>Galaxea fasicularis</i> (Linnaeus)	ปะการังกาแล็คซี่	-	-	X	-	X	-
Family Faviidae							
50. <i>Oulastrea crispata</i> (Lamarck)	ปะการังวงแหวน	X	X	X	X	X	X
51. <i>Goniastrea aspera</i> Verrill	ปะการังรังผึ้ง	X	X	X	X	X	X
52. <i>Goniastrea retiformis</i> (Lamarck)	ปะการังรังผึ้ง	X	X	X	X	X	X
53. <i>Goniastrea pectinata</i> (Ehrenberg)	ปะการังรังผึ้ง	-	X	-	-	-	-
54. <i>Goniastrea australiensis</i> Milne Edwards & Hailme	ปะการังร่องยาว	X	X	X	X	X	X
55. <i>Favia favius</i> (Forsk.)	ปะการังวงแหวน	X	X	X	X	X	X
56. <i>Favia speciosa</i> (Dana)	ปะการังวงแหวน	X	X	X	X	X	X
57. <i>Favites abdita</i> (Ellis & Solander)	ปะการังช่องเหลี่ยม	X	X	X	X	X	X
58. <i>Platygyra sinensis</i> (Edwards & Haime)	ปะการังสมอง	X	X	X	X	X	X
59. <i>Platygyra daedalea</i> (Ellis & Solander)	ปะการังสมองร่องยาว	X	X	X	X	X	X
60. <i>Platygyra pini</i> Chevalier	ปะการังสมอง	-	-	-	-	-	X
61. <i>Leptoria phrygia</i> (Ellis & Solander)	ปะการังสมองร่องเล็ก	-	X	X	-	-	-
62. <i>Plesiastrea versipora</i> (Lamarck)	ปะการังวงแหวนเล็ก	-	X	-	-	-	-
63. <i>Diploastrea heliopora</i> (Lamarck)	ปะการังดาวใหญ่	X	X	X	X	X	X
64. <i>Oulophyllia bennettiae</i> Veron, Pichon & Best	ปะการังสมองร่องเล็ก	-	X	-	-	-	-
65. <i>Leptastrea transversa</i> Klunzinger	ปะการังดาวช่องเหลี่ยม	-	X	-	-	-	-
66. <i>Cyphastrea chalcidicum</i> (Forsk.)	ปะการังดาวเล็ก	X	X	X	X	X	X
67. <i>Cyphastrea microphthalma</i> (Lamarck)	ปะการังดาวเล็ก	X	X	X	-	X	X
68. <i>Echinopora lamellosa</i> (Esper)	ปะการังแผ่นช่องหนาม	-	X	X	-	X	-
Family Merulinidae							
69. <i>Hydnophora exesa</i> (Pallas)	ปะการังหนามขนุน	X	X	X	X	X	X
70. <i>Hydnophora microconos</i> (Lamarck)	ปะการังหนามขนุน	X	X	X	X	X	X
71. <i>Merulina ampliata</i> (Ellis & Solander)	ปะการังใบร่องหนาม	-	X	X	-	X	-

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของไนดาเรียและหิวัว้นในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Family Mussidae							
72. <i>Acanthastrea</i> sp.	ปะการังถ้วยสมอง	-	X	-	-	-	-
73. <i>Symphyllia radians</i> Edwards & Haime	ปะการังสมองร่องใหญ่	X	X	X	X	X	X
74. <i>Symphyllia recta</i> (Dana)	ปะการังสมองร่องใหญ่	-	X	X	-	X	-
75. <i>Lobophyllia hemprichi</i> (Ehrenberg)	ปะการังถ้วยสมอง	X	X	X	X	X	X
76. <i>Lobophyllia</i> sp.	ปะการังถ้วยสมอง	-	X	-	-	-	-
77. <i>Scolymia</i> sp.	ปะการังถ้วยสมอง	-	-	X	-	-	-
Family Pectinidae							
78. <i>Pectinia lactuca</i> (Pallas)	ปะการังแผ่นเปลวไฟ	-	X	-	-	-	-
79. <i>Pectinia</i> sp.	ปะการังแผ่นเปลวไฟ	-	X	-	-	-	-
80. <i>Echinophyllia aspera</i> (Ellis & Solander)	ปะการังเคลือบหนาม	-	-	X	-	-	-
81. <i>Oxypora lacera</i> (verrill)	ปะการังแผ่นหนาม	-	X	-	-	-	-
Family Dendrophyllidae							
82. <i>Turbinaria peltata</i> (Esper)	ปะการังจาน	-	-	X	-	X	-
83. <i>Turbinaria mesenterina</i> (Lamarck)	ปะการังจาน	-	X	X	-	-	-
84. <i>Turbinaria reniformis</i> Bernard	ปะการังจาน	-	X	X	-	-	-
85. <i>Tubastrea faulkneri</i> Wells	ปะการังถ้วยส้ม	X	X	X	X	X	X
86. <i>Tubastrea micrantha</i> Ehrenberg	ปะการังกึ่งดำ	-	X	X	X	X	X
Family Caryophylliidae							
87. <i>Heterocyathus aequicostatus</i> Edwards & Haime	ปะการังเม็ดกระดุม	-	X	X	-	-	-
Family Euphyllidae							
88. <i>Euphyllia (Fimbriaphyllia) ancora</i> Veron & Pichon	ปะการังหนวดถั่ว	-	X	-	-	-	-
89. <i>Plerogyra sinuosa</i> (Dana)	ปะการังมุกดา	-	X	-	X	-	-
Order ALCYONIINA							
Family Alcyoniidae							
90. <i>Cladiella</i> sp.	ปะการังอ่อน	X	X	X	X	X	X
91. <i>Sarcophyton</i> sp.	ปะการังอ่อนดอกเห็ด	-	-	-	X	-	-
92. <i>Sinularia dura</i> (Pratt)	ปะการังอ่อน	X	-	-	-	-	X
93. <i>Sinularia</i> sp.	ปะการังอ่อนนิ้วมือ	X	X	X	X	X	X
Family Nephtidae							
94. <i>Dendronephthya</i> sp.1	ปะการังอ่อนต้นวุ้น	-	-	X	-	-	X

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของไนดาเรียและหิวัว้นในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
95. <i>Dendronephthya</i> sp.2	ปะการังอ่อนต้นสั้น	-	X	-	-	-	X
96. <i>Dendronephthya</i> sp.3	ปะการังอ่อนต้นสั้น	-	X	-	-	-	-
Family Xeniidae							
97. <i>Xenia</i> sp.	ปะการังอ่อนใบเฟิร์น	X	X	X	X	X	X
Order GORGONACEA	กัลปังหา						
Family Acanthogorgiidae							
98. <i>Acanthogorgia</i> sp.	กัลปังหาดอกขาว	X	-	-	-	-	-
99. <i>Muricella</i> sp.	กัลปังหาสีเขียว	-	-	X	-	-	-
Family Plexauridae							
100. <i>Menella</i> sp.1	กัลปังหาแดงดอกม่วง	-	X	-	-	-	-
101. <i>Menella</i> sp.2	กัลปังหาดอกเหลือง	-	X	X	-	-	-
102. <i>Subergorgia</i> sp.1	กัลปังหาแดงดอกขาว	-	-	-	X	-	-
103. <i>Subergorgia</i> sp.2	กัลปังหาสีแดงดอกเหลือง	-	-	-	X	-	-
Family Ellisellidae							
104. <i>Ctenocella</i> (<i>Ellisella</i>) sp.	กัลปังหาสีแดง	-	-	-	X	-	-
105. <i>Junceella fragilis</i> Ridley	กัลปังหาแฉ่	X	X	X	X	-	-
Family Gorgoniidae							
106. <i>Rumphella</i> sp.	กัลปังหาแฉ่	X	X	X	X	X	X
Family Melithaeidae							
107. <i>Melithaea</i> sp.1	กัลปังหาสีส้ม	X	X	X	X	X	X
108. <i>Melithaea</i> sp.2	กัลปังหาสีแดง	-	X	-	-	-	-
Order PENNATULACEA	ปากกาทะเล						
Family Pteroeididae							
109. <i>Pteroeides</i> sp.1	ปากกาทะเล	-	-	X	-	-	-
110. <i>Pteroeides</i> sp.2	ปากกาทะเล	-	-	X	-	-	-
Family Pteroeididae							
111. <i>Virgularia</i> sp.	ปากกาทะเล	X	X	X	X	X	X
Order ZOANTHIDEA	พรมทะเล						
Family Zoanthidae							
112. <i>Zoanthus pacificus</i> Walsh & Bowers	พรมทะเล	X	X	X	X	X	X
113. <i>Palythoa tuberculosa</i> Esper	พรมทะเล	X	X	X	X	X	X

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของในคาเรียและหิววันในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
114. <i>Palythoa</i> sp.1	พรมทะเล	-	X	-	-	-	-
115. <i>Palythoa</i> sp.2	พรมทะเลสีน้ำเงิน	-	-	-	X	-	-
116. <i>Palythoa</i> sp.3	พรมทะเลสีชมพู	-	X	X	X	X	-
117. <i>Parazoanthus</i> sp.	ดอกไม้ทะเลพรม	-	X	X	-	-	-
Order ACTINARIA	ดอกไม้ทะเล						
Family Actiniidae							
118. <i>Dofleinia</i> sp.	ดอกไม้ทะเลดิน	-	-	-	-	-	X
119. <i>Entacmaea</i> sp.1	ดอกไม้ทะเลหนวดปม	X	X	X	X	X	X
120. <i>Entacmaea</i> sp.2	ดอกไม้ทะเลหนวดปม	X	X	X	X	X	X
Family Boloceroididae							
121. <i>Boloceroides mcmurichii</i> (Kwietniewski)	ดอกไม้ทะเล	X	X	-	-	-	-
Family Aliciidae							
122. <i>Alicia</i> sp.	ดอกไม้ทะเล	-	-	X	-	-	-
123. <i>Triactis producta</i> Klunzinger	ดอกไม้ทะเลหนวดโป่ง	-	X	-	-	-	X
Family Actinodendriidae							
124. <i>Megalactis hemprichii</i> Ehrenberg	ดอกไม้ทะเลหนวดแขนง	-	X	X	-	-	X
Family Phymanthidae							
125. <i>Phymanthus</i> aff. <i>crucifer</i> Leseur	ดอกไม้ทะเล	-	-	-	-	X	-
126. <i>Phymanthus muscosus</i> Haddon & shackleton	ดอกไม้ทะเลลูกปัด	-	X	-	-	-	-
127. <i>Heteranthus</i> sp.	ดอกไม้ทะเลดิน	-	-	X	-	X	-
Family Edwardsiidae							
128. <i>Edwardsia pucida</i> Verrill	ดอกไม้ทะเลดินสีน้ำตาล	-	X	X	-	X	X
129. <i>Edwardsia</i> sp.	ดอกไม้ทะเลดินสีม่วง	-	-	-	-	-	X
Family Stichodactylidae							
130. <i>Heteractis malu</i> Haddon & shackleton	ดอกไม้ทะเลดิน	-	X	-	-	-	-
131. <i>Heteractis magnifica</i> Quay & Gaimard	ดอกไม้ทะเลสีม่วง	X	X	X	X	X	X
132. <i>Stichodactyla gigantea</i> (Forskål)	ดอกไม้ทะเลหนวดเล็ก	-	X	X	-	X	X
133. <i>Stichodactyla tapetum</i> Ehrenberg	ดอกไม้ทะเลดิน	-	-	-	-	-	X
Order CORALLIMORPHARIA	ดอกไม้ทะเลเห็ดหูหนู						
Family Actinodiscidae							
134. <i>Discosoma bryoides</i> Haddon & shackleton	เห็ดหูหนูทะเลหนวดสั้น	X	X	X	X	X	X

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของในคาเรียและหิวู้นในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
135. <i>Discosoma</i> sp.1	เห็ดหูหนูทะเลหนวดสั้น	X	X	X	X	X	X
136. <i>Discosoma</i> sp.2	เห็ดหูหนูทะเลหนวดสั้น	-	X	-	-	-	-
137. <i>Metarhodactis</i> sp.1	เห็ดหูหนูทะเลหนวดขาว	X	X	X	X	X	X
138. <i>Metarhodactis</i> sp.2	เห็ดหูหนูทะเลหนวดขาว	X	X	X	X	X	X
Family Corallimorphidae							
139. <i>Pseudocorynactis</i> sp.	ดอกไม้ทะเลหนวดปม	-	X	-	-	-	-
Order <i>CERIANTHARIA</i>	ดอกไม้ทะเลปลอก						
Family Cerianthidae							
140. <i>Cerianthus</i> sp.1	ดอกไม้ทะเลปลอก	X	X	X	X	X	X
141. <i>Cerianthus</i> sp.2	ดอกไม้ทะเลปลอก	-	-	-	-	-	X
Order <i>ANTIPATHARIA</i>	ปะการังดำ						
Family Antipathidae							
141. <i>Antipathes</i> sp.	ปะการังดำ	X	X	X	X	X	X
142. <i>Cirrhipathes</i> sp.	แสทะเล	X	X	X	X	X	X
Class HYDROZOA	ไฮดรอยด์						
Order <i>HYDROIDA</i>							
Family Aglaopheniidae							
143. <i>Macrorhynchia philippina</i> Kirchenpauer	ขนนกทะเล	X	X	X	X	X	X
144. <i>Macrorhynchia</i> sp.	ไฮดรอยด์สีแดง	-	-	-	-	-	X
Family Halocordylidae							
145. <i>Pinnaria disticha</i> Goldfuss	ไฮดรอยด์	-	-	X	-	-	X
146. <i>Pinnaria</i> sp.1	ไฮดรอยด์	-	-	X	-	-	-
147. <i>Pinnaria</i> sp.2	ไฮดรอยด์	-	X	-	-	-	-
Family Aequoreidae							
148. <i>Aequorea</i> sp.	แมงกะพรุนเข็ม	-	X	-	-	-	-
Order <i>MILLEPORINA</i>							
Family Milleporidae							
149. <i>Millepora platyphylla</i> Hemprich and Ehrenberg	ปะการังไฟ	-	-	X	X	X	X

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของไนดาเรียและหิวู้นในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Class SCYPHOZOA <i>Order RHIZOSTOMAE</i> Family Rhizostomidae 150. <i>Rhopilema hispidum</i> (Vanhöffen) 151. <i>Rhopilema rhopalophorum</i> Haeckel	แมงกระพรุนแท้ แมงกระพรุนไฟ แมงกระพรุนหนั้	 - -	 X -	 - -	 - -	 - -	 - X
PHYLUM CTENOPHORA <i>Order LOBATA</i> Family Bolinopsidae 1. <i>Bolinopsis</i> sp.	หิวู้น หิวู้น	 X	 X	 X	 X	 X	 X




ปะการังดอกกะหล่ำ, *Pocillopora damicornis*



ปะการังดอกกะหล่ำ, *Pocillopora verrucosa*



ปะการังเขากวาง, *Acropora cytherea*




ปะการังเขากวางพุ่ม, *Acropora daviricata*




ปะการังเขากวางพุ่ม, *Acropora dendrum*



ปะการังเขากวาง, *Acropora florida*




ปะการังเขากวาง, *Acropora grandis*



ปะการังเขากวางโต๊ะ, *Acropora hyacinthus*

แผ่นภาพที่ 2 ในดาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ปะการังเขากวางโต๊ะ, *Acropora millepora*




ปะการังเขากวาง, *Acropora nobilis*




ปะการังเขากวาง, *Acropora formosa*



ปะการังเขากวางพุ่ม, *Acropora humilis*




ปะการังเขากวางพุ่ม, *Acropora digitifera*



ปะการังเขากวางพุ่ม, *Acropora samoensis*



ปะการังเขากวางพุ่ม, *Acropora valida*



ปะการังนิ้วมือ, *Montipora digitata*


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิรุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง, *Montipora aequituberculata*



ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง, *Montipora informis*



ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง, *Montipora efflorescens*



ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง, *Montipora tuberculosa*



ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง, *Montipora turtlensis*



ปะการังดาว, *Asteropora myriophthalma*



ปะการังดาว, *Asteropora ocellata*



ปะการังดอกเห็ด, *Fungia (Fungia) fungites*

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหริวุ่นที่พิบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปะการังดอกเห็ด, *Fungia (Verrillofungia) repanda*



ปะการังรองเท้าตะแคง, *Ctenactis echinata*



ปะการังบูมเมอแรง, *Herpolitha limax*



ปะการังบูมเมอแรง, *Polyphyllia talpina*




ปะการังพาน, *Podabacia cruceata*



ปะการังใบหิน, *Lithophyllon mokai*




ปะการังโขด, *Porites lobata*



ปะการังโขด, *Porites lutea*

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปะการังผิวขี้, *Porites (Synaraea) rus*



ปะการังดอกไม้มะเลหนวดขาว, *Goniopora norfolkensis*




ปะการังดอกไม้มะเล, *Goniopora columna*



ปะการังดอกไม้มะเล, *Alveopora gigas*



ปะการังลายลูกฟูก, *Pachyseris speciosa*



ปะการังลายดอกไม้ม, *Coeloseris mayeri*



ปะการังลายดอกไม้ม, *Pavona decussata*



ปะการังลายดอกไม้ม, *Pavona explanulata*

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหิวู้นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปะการังลายดอกไม้, *Pavona frondifera*




ปะการังลายดอกไม้, *Pavona cactus*




ปะการังลายดอกไม้, *Pavona venosa*



ปะการังช่องหินอ่อน, *Gardineroseris planulata*



ปะการังลายกลีบดอกไม้, *Psammocora contigua*



ปะการังลายกลีบดอกไม้, *Psammocora digitata*



ปะการังลายกลีบดอกไม้, *Coscinaraea exesa*



ปะการังกาแล็คซี่, *Galaxea fascicularis*


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิ้นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปะการังกาแลคซี่, *Galaxea astreata*



ปะการังวงแหวน, *Oulastrea crispata*



ปะการังรังผึ้ง, *Goniastrea aspera*




ปะการังรังผึ้ง, *Goniastrea retiformis*



ปะการังรังผึ้ง, *Goniastrea pectinata*



ปะการังร่องขาว, *Goniastrea australiensis*



ปะการังวงแหวน, *Favia favus*




ปะการังวงแหวน, *Favia speciosa*

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในดาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ปะการังช่องเหลี่ยม, *Favites abdita*



ปะการังสมอง, *Platygyra sinensis*




ปะการังสมองร่องขาว, *Platygyra daedalea*



ปะการังสมอง, *Platygyra pini*



ปะการังสมองร่องเล็ก, *Leptoria phrygia*



ปะการังดาวเล็ก, *Plesiastrea versipora*



ปะการังดาวใหญ่, *Diploastrea helipora*



ปะการังสมองร่องลึก, *Oulophyllia bennettiae*

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ปะการังดาวช่องเหลี่ยม, *Leptastrea transversa*



ปะการังดาวเล็ก, *Cyphastrea chalcidicum*




ปะการังดาวเล็ก, *Cyphastrea microphthalma*



ปะการังแผ่นช่องหนาม, *Echinopora lamellosa*



ปะการังหนามขนุน, *Hydnophora exesa*



ปะการังหนามขนุน, *Hydnophora microconos*




ปะการังใบร่องหนาม, *Merulina ampliata*



ปะการังถ้วยสมอง, *Acanthastrea* sp.


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิวุ่นที่พบบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ปะการังสมองร่องใหญ่, *Symphyllia radians*



ปะการังสมองร่องใหญ่, *Symphyllia recta*



ปะการังถ้วยสมอง, *Lobophyllia hemprichi*



ปะการังถ้วยสมอง, *Lobophyllia* sp.



ปะการังถ้วยสมอง, *Scolymia* sp.



ปะการังแผ่นเปลวไฟ, *Pectinia lactuca*



ปะการังแผ่นเปลวไฟ, *Pectinia* sp.



ปะการังเคลือบหนาม, *Echinophyllia aspera*

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในดาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปะการังจาน, *Turbinaria peltata*




ปะการังจาน, *Turbinaria mesenterina*



ปะการังจาน, *Turbinaria reniformis*



ปะการังถ้วยส้ม, *Tubastrea faulkneri*




ปะการังกิ่งดำ, *Tubastrea micrantha*



ปะการังเม็ดกระดุม, *Heterocyathus aequicostatus*




ปะการังหนวดแก้ว, *Euphyllia ancora*




ปะการังมุกดา, *Pleropyra sinuosa*

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในดาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ปะการังอ่อน, *Cladiella* sp.



ปะการังอ่อนดอกเห็ด, *Sarcophyton* sp.




ปะการังอ่อนนิ้วมือ, *Sinularia dura*




ปะการังอ่อนนิ้วมือ, *Sinularia* sp.



ปะการังอ่อนต้นวุ้น, *Dendronephthya* sp.1



ปะการังอ่อนต้นวุ้น, *Dendronephthya* sp.2



ปะการังอ่อนต้นวุ้น, *Dendronephthya* sp.3



ปะการังอ่อน, *Xenia* sp.

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในดาเรียและหวิวุ้นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



กัลปังหาดอกขาว, *Acanthogorgia* sp.




กัลปังหาสีเขียว, *Muricella* sp.




กัลปังหาสีแดงดอกม่วง, *Menella* sp.1




กัลปังหาสีแดงดอกเหลือง, *Menella* sp.2



กัลปังหาสีแดงดอกขาว, *Subergorgia* sp.1



กัลปังหาสีแดงดอกเหลือง, *Subergorgia* sp.2




กัลปังหาสีแดง, *Ctenocella* (*Ellisella*) sp.



กัลปังหาเส้, *Juncella fragilis*


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวีวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



กัลปังหาเส้, *Rumphella* sp.



กัลปังหาสีส้ม, *Melithaea* sp.1



กัลปังหาสีแดง, *Melithaea* sp.2




ปากกาทะเล, *Pteroeides* sp.1



ปากกาทะเล, *Pteroeides* sp.2



ปากกาทะเล, *Virgularia* sp.



พรมทะเล, *Zoanthus pacificus*




พรมทะเล, *Palythoa tuberculosa*


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวีวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



พรมทะเล, *Palythoa* sp.1




พรมทะเล, *Palythoa* sp.2



พรมทะเล, *Palythoa* sp.3



ดอกไม้ทะเลพรม, *Parazoanthus* sp.



ดอกไม้ทะเลดิน, *Dofleinia* sp.



ดอกไม้ทะเลหนวดปม, *Entacmaea* sp.1



ดอกไม้ทะเลหนวดปม, *Entacmaea* sp.2




ดอกไม้ทะเล, *Boloceroides mcmurichii*


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ดอกไม้ทะเล, *Alicia* sp.




ดอกไม้ทะเลหนวดโป่ง, *Triactis producta*



ดอกไม้ทะเลหนวดแขนง, *Megalactis hemprichii*



ดอกไม้ทะเล, *Phymanthus* aff. *crucifer*



ดอกไม้ทะเลลูกปัด, *Phymanthus muscosus*



ดอกไม้ทะเลดิน, *Heteranthus* sp.




ดอกไม้ทะเลดินสีม่วง, *Edwardsia pucida*



ดอกไม้ทะเลดินสีม่วง, *Edwardsia* sp.

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหริวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ดอกไม้ทะเลดิน, *Heteractis malu*



ดอกไม้ทะเลสีม่วง, *Heteractis magnifica*




ดอกไม้ทะเลหนวดเล็ก, *Stichodactyla gigantea*




ดอกไม้ทะเลดิน, *Stichodactyla tapetum*




เห็ดหูหนูทะเลหนวดสั้น, *Discosoma bryoides*



เห็ดหูหนูทะเลหนวดสั้น, *Discosoma* sp.1



เห็ดหูหนูทะเลหนวดสั้น, *Discosoma* sp.2



เห็ดหูหนูทะเลหนวดยาว, *Metarhodactis* sp.1


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิรุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



หิ้งหนูหนุทะเลหนวดขาว, *Metarhodactis* sp.1




ดอกไม้ทะเลหนวดปุ่ม, *Pseudocorynactis* sp.




ดอกไม้ทะเลปลอก, *Cerianthus* sp.1




ดอกไม้ทะเลปลอก, *Cerianthus* sp.2




ปะการังดำ, *Antipathes* sp.



แส้ทะเล, *Cirrhipathes* sp.




ขนนกทะเล, *Macrorhynchia philippina*




ไฮดรอยด์, *Macrorhynchia* sp.


แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในคาเรียและหวิวุ่นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ไฮดรอยด์, *Pinnaria disticha*




ไฮดรอยด์, *Pinnaria* sp.1



ไฮดรอยด์, *Pinnaria* sp.2




แมงกระพรุนเข็ม, *Aequorea* sp.




ปะการังไฟ, *Millepora platyphylla*



แมงกระพรุนไฟ, *Rhopilema hispidum*



แมงกระพรุน, *Rhopilema rhopalophorum*



หิวู้น, *Bolinopsis* sp.

แผ่นภาพที่ 2(ต่อ) ในดาเรียและหิวู้นที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี

4. สัตว์กลุ่มหนอนทะเล (Marine worms) จากการศึกษาพบสัตว์กลุ่มหนอนทะเล จำนวน 30 ชนิด จาก 5 Phyla ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 3 ประกอบด้วย

4.1 หนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes) เป็นสัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่มีลักษณะแบน มักพบอาศัยอยู่อิสระตามพื้นทะเลและใต้ก้อนหินหรือซากปะการัง จากการศึกษาพบหนอนตัวแบนทั้งหมด 8 ชนิด จาก 2 วงศ์ การแพร่กระจายของหนอนตัวแบนแต่ละชนิดค่อนข้างจะกระจายตัวเฉพาะตามหมู่เกาะต่างๆและพบเพียงชนิดเดียวที่พบทั่วไปในทุกหมู่เกาะคือ หนอนตัวแบนในสกุล *Acanthozoon* ซึ่งเป็นชนิดที่พบมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิก แต่ยังไม่ได้มีผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ไว้

4.2 หนอนริบบิ้น (Phylum Nemertea) เป็นสัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่มีลักษณะแบนยาวคล้ายสายริบบิ้น มักพบอาศัยอยู่อย่างอิสระใต้ก้อนหินหรือซากปะการังและออกหากินในเวลากลางวัน เราจึงไม่ค่อยพบหนอนริบบิ้นในช่วงเวลากลางวันที่สำรวจ จากการศึกษาครั้งนี้พบหนอนริบบิ้นจำนวน 2 ชนิด จาก 2 วงศ์ ได้แก่ หนอนริบบิ้นมัลลาย, *Baseodiscus quinquelineatus* ซึ่งพบการแพร่กระจายอยู่ 2 หมู่เกาะคือ หมู่เกาะล้านและหมู่เกาะเสมสาร อีกชนิดหนึ่งคือ หนอนริบบิ้นสีชมพูในสกุล *Cerebratulus* พบที่หมู่เกาะสีชัง

4.3 หนอนปล้อง (Phylum Nemertea) เป็นสัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่มีลักษณะเป็นข้อปล้องแต่ละปล้องจะมียางค้ำยื่นออกมาทางด้านข้าง หนอนปล้องเป็นสัตว์หน้าดินมีการดำรงชีวิตหลากหลายรูปแบบ เช่น อาศัยอยู่อย่างอิสระใต้ก้อนหิน ซอกปะการัง เจาะปะการัง และอาศัยอยู่ในปลอกที่สร้างขึ้นเอง เป็นต้น จากการศึกษาในครั้งนี้พบหนอนปล้อง จำนวน 18 ชนิดจาก 8 วงศ์ หนอนปล้องที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 3 ชนิด หมู่เกาะล้าน 14 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 10 ชนิด หมู่เกาะรีน 2 ชนิด หมู่เกาะคราม 5 ชนิดและหมู่เกาะเสมสาร 9 ชนิด หนอนปล้องที่พบเป็นชนิดเด่นและมีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะ ได้แก่ หนอนคอกไม้ลายทางนกยูง, *Sabellastarte sanctijosephi* ซึ่งเป็นหนอนปล้องที่อาศัยอยู่ในปลอกที่สร้างขึ้นจากดินตะกอนและเมือกตัวเอง และหนอนคอกไม้พู่ฉัตร, *Spirobranchus giganteus* ซึ่งเป็นหนอนปล้องที่สามารถเจาะก้อนปะการังที่มีชีวิตอาศัยอยู่ ส่วนหนอนปล้องชนิดอื่นๆที่พบจากการศึกษา ได้แก่ หนอนเกล็ดปลิงทะเล 1 ชนิดคือ *Gastrolepideela clavigera* ซึ่งพบอาศัยอยู่กับปลิงหินในสกุล *Stichopus*, แม่เพรียงในสกุล *Eunice* ซึ่งเป็นแม่เพรียงที่มีขนาดใหญ่ หนอนปล้องท่อในสกุล *Lagis* พบ 1 ชนิดซึ่งเป็นหนอนปล้องที่อาศัยอยู่ในท่อที่สร้างขึ้นจากเมือกทราย, หนอนคอกไม้หินปูน, *Filograna implexa* ซึ่งเป็นหนอนปล้องที่สร้างปลอกเป็นหินปูนและอยู่รวมกันเป็นโคโลนี เป็นต้น

4.4 หนอนถั่ว (Phylum Sipunculida) เป็นสัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่มีลักษณะคล้ายงูคาแฟหรือหัวผักกาด จากการศึกษาในครั้งนี้พบเพียง 1 ชนิดในสกุล *Siphonosoma* และพบในบริเวณหมู่เกาะไผ่ หนอนถั่วที่พบเป็นพวกที่ขุดรูอยู่ตามพื้นทะเลบริเวณขอบนอกของแนวปะการัง

4.5 หนอนชอน (Phylum Echiura) เป็นสัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่มีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกับหนอนถั่ว ทั้งยังมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเพียงส่วนหัวของหนอนถั่วสามารถหดเข้าไปในลำตัวได้แต่หนอนชอนไม่สามารถหดเข้าไปได้ จากการศึกษาในครั้งนี้พบเพียง 1 ชนิดในสกุล *Bonellia* และแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะที่ทำการศึกษา


ตารางที่ 3 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มหนอนทะเลในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ศึกษา: A = หมู่เกาะสีชัง; B = หมู่เกาะล้าน; C = หมู่เกาะไผ่; D = หมู่เกาะร่น; E = หมู่เกาะคราม; F = หมู่เกาะแสมสาร
การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM PLATYHELMINTHES Class TURBELLARIA <i>Order POLYCLADIDA</i> Family Pseudocerotidae 1. <i>Acanthozoon</i> sp. 2. <i>Maiazoon orsaki</i> Newman & Cannon 3. <i>Pseudobiceros uniaborensis</i> Newman & Cannon 4. <i>Pseudoceros scintillates</i> Newman & Cannon 5. <i>Pseudoceros</i> sp.1 6. <i>Pseudoceros</i> sp. 2 7. <i>Thysanozoon nigropapillosum</i> Hyman Family Pericelididae 8. <i>Pericelis</i> sp.	หนอนตัวแบน หนอนตัวแบน หนอนตัวแบนสีดำจุดส้ม หนอนตัวแบนสีครีมขอบดำ หนอนตัวแบนสีดำขอบขาวส้ม หนอนตัวแบนสีดำขาวขอบส้ม หนอนตัวแบนสีขาวขอบน้ำเงิน หนอนตัวแบนสีขาวขอบประ หนอนตัวแบนสีดำจุดเหลือง หนอนตัวแบนสีชมพูลาย						
PHYLUM NEMERTEA Class Anopla <i>Order HETERONEMERTEA</i> Family Valenciniidae 1. <i>Baseodiscus quinquelineatus</i> Quay & Gaimard Family Cerebratulidae 2. <i>Cerebratulus</i> sp.	หนอนริบบิ้น หนอนริบบิ้นมัลลาย หนอนริบบิ้นสีชมพู						
		-	X	-	-	-	X
		X	-	-	-	-	-
PHYLUM ANNELIDA Class POLYCHAETA <i>Order PHYLLODOCIDA</i> Family Polynoidae 1. <i>Gastrolepideela clavigera</i> Schmarda <i>Order AMPHINOMIDA</i> Family Amphinomidae 2. <i>Chloeia flava</i> (Pallas) 3. <i>Pherecardia striata</i> (Kinberg) 4. <i>Notopygos</i> sp.	หนอนปล้อง หนอนเกล็ด หนอนเกล็ดปลิงทะเล นึ่งทะเล นึ่งทะเล นึ่งทะเล นึ่งทะเล						
		-	X	X	-	-	-
		X	X	-	-	-	X
		-	-	-	-	-	X
		-	X	-	-	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มหนอนทะเลในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Order PHYLLODOCIDA	หนอนเกล็ด						
Family Polynoidae							
5. Iphione muricata (Savigny)	หนอนเกล็ด	-	X	X	-	X	X
Order EUNICIDA	แม่เพรียง						
Family Eunicidae							
6. Eunice antennata (Lamarck)	แม่เพรียง	-	X	-	-	-	X
Family Onuphidae							
7. Onuphid sp.1	แม่เพรียง	-	X	-	-	-	-
Order TERESELLIDA	หนอนท่อ						
Family Pectinariidae							
8. Lagis sp.	หนอนท่อ	-	X	X	-	-	X
Order SABELLIDA	หนอนดอกไม้						
Family Sabellidae							
9. Sabella fusca Grube	หนอนดอกไม้	-	X	-	-	-	X
10. Sabellastarte sanctijosephi (Gravier)	หนอนดอกไม้ลายหางนกยูง	X	X	X	X	X	X
11. Sabellid sp.1	หนอนดอกไม้	-	X	-	-	-	-
12. Sabellid sp.2	หนอนดอกไม้	-	X	-	-	-	-
13. Sabellid sp.3	หนอนดอกไม้	-	-	X	-	-	-
14. Sabellid sp.4	หนอนดอกไม้	-	-	X	-	-	-
Family Serpulidae							
15. Pomatostegus stellatus (Abildgaard)	หนอนดอกไม้ปะการัง	-	X	X	-	X	-
16. Spirobranchus giganteus (Pallas)	หนอนดอกไม้ฟุ้งคร	X	X	X	X	X	X
17. Protula sp.	หนอนดอกไม้ฟุ้งคร	-	-	X	-	-	-
18. Filograna implexa Berkeley	หนอนดอกไม้หินปูน	-	X	X	-	X	X
PHYLUM SIPUNCULA	หนอนถั่ว						
Order SIPUNCULIFORMIS	หนอนถั่ว						
Family Sipunculidae							
1. Siphonosoma sp.	หนอนถั่ว	-	-	X	-	-	-
PHYLUM ECHIURA	หนอนชอน						
Order ECHIUROIDEA	หนอนชอน						
Family Bonelliidae							
1. Bonellia sp.	หนอนชอน	X	X	X	X	X	X



หนอนตัวแบนสีดำจุดส้ม, *Acanthozoon* sp.



หนอนตัวแบนสีครีมขอบดำ, *Maiazoon orsaki*




หนอนตัวแบนสีดำขอบขาวส้ม, *Pseudobiceros uniarborensis*



หนอนตัวแบนสีดำขาวขอบส้ม, *Pseudoceros scintillates*



หนอนตัวแบนสีม่วงขอบน้ำเงิน, *Pseudoceros* sp.1



หนอนตัวแบนสีม่วงขอบประ, *Pseudoceros* sp.2



หนอนตัวแบนสีดำจุดเหลือง, *Thysanozoon nigropapillosum*




หนอนตัวแบนสีชมพูลาซ, *Pericelis* sp.


แผ่นภาพที่ 3 สัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



หนอนริบบิ้นม้าลาย, *Baseodiscus quinquelineatus*



หนอนริบบิ้นสีชมพู, *Cerebatulus* sp.



หนอนเกล็ดปลิงทะเล, *Gastrolepideela clavigera*



นึ่งทะเล, *Chloeia flava*



นึ่งทะเล, *Pherecardia striata*



นึ่งทะเล, *Notopygos* sp.



หนอนเกล็ด, *Iphione muricata*



แม่เพรียง, *Eunice antennata*

แผ่นภาพที่ 3(ต่อ) สัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




แม่เพรียง, Onuphid sp.1



หนอนท่อ, *Lagis* sp.




หนอนดอกไม้, *Sabella fusca*




หนอนดอกไม้, *Sabellastarte sanctijosephi*




หนอนดอกไม้, Sabellid sp.1



หนอนดอกไม้, Sabellid sp.2



หนอนดอกไม้, Sabellid sp.3



หนอนดอกไม้, Sabellid sp.4

แผ่นภาพที่ 3(ต่อ) สัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




หนอนดอกไม้ปะการัง, *Pomatostegus stellatus*



หนอนดอกไม้ฟูฉัตร, *Spirobranchus giganteus*



หนอนดอกไม้ฟูฉัตร, *Protula* sp.



หนอนดอกไม้หินปูน, *Filograna implexa*



หนอนถั่ว, *Siphonosoma* sp.



หนอนชอน, *Bonellia* sp.

แผ่นภาพที่ 3(ต่อ) สัตว์กลุ่มหนอนทะเลที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี

5. สัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลต (Lophophorates) เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีช่องว่างในลำตัวที่แท้จริงและมีอวัยวะเฉพาะที่เรียกว่า โลโฟฟอร์ (Lophophore) ลักษณะเป็นวงของหนวดที่มีเส้นขนสั้นเรียงตัวกันเป็นรูปเกือกม้าทางด้านหน้าของร่างกาย จากการศึกษาพบสัตว์ในกลุ่มโลโฟฟอร์เลต 3 Phyla ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 4 คือ

5.1 หนอนถั่ว (Goblet worms, Phylum Kamptozoa or Entoprocta) หนอนถั่วเป็นกลุ่มสัตว์โลโฟฟอร์เลตโบราณมีขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกับถั่วคิมเหล้าสมัยโบราณที่มีก้านจับ จากการศึกษาในครั้งนี้พบหนอนถั่วเพียง 1 ชนิดในสกุล *Loxosomella* เป็นหนอนถั่วที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำคันไม้สีดำ, *Pachampilla* sp. ในบริเวณหมู่เกาะสิขัง หมู่เกาะริน หมู่เกาะครามและหมู่เกาะแสมสาร

5.2 หนอนเกือกม้า (Phoronids, Phylum Phoronida) เป็นกลุ่มสัตว์โลโฟฟอร์เลตกลุ่มเล็กที่มีจำนวนสมาชิกทั่วโลกเพียง 17 ชนิด จากการศึกษาในครั้งนี้พบหนอนเกือกม้าเพียง 1 ชนิดคือ *Phoronis australis* ซึ่งมีลักษณะเด่นคือวงโลโฟฟอร์มีสีดำ พบอาศัยอยู่พื้นทรายขอบนอกแนวปะการังของหมู่เกาะไผ่

5.3 ไบรโอซัว (Phylum Ectoprocta) เป็นสัตว์ที่เกาะติดกับที่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่รวมกันเป็นโคโลนี โดยเกาะติดกับวัตถุแข็งได้น้ำ เช่น ก้อนหิน สาหร่าย ฟองน้ำ ปะการัง เป็นต้น จากการศึกษาในครั้งนี้พบไบรโอซัว 3 ชนิด จาก 3 วงศ์ซึ่งมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไบรโอซัวร่วม, *Caulibugula* sp. ซึ่งเป็นไบรโอซัวที่มีลักษณะคล้ายร่มโดยมีก้านชูขึ้นไปด้านปลายแตกแขนงออกในแนวรัศมีคล้ายร่ม มักจะพบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไบรโอซัวชนิดนี้พบเพียงแห่งเดียวที่หมู่เกาะริน; ไบรโอซัวเคลือบหิน, *Schizoporella* sp. เป็นไบรโอซัวที่เคลือบตามวัตถุได้น้ำ และไม่ค่อยชอบแสงสว่าง โดยมักจะพบได้ก้อนหิน พบมีการแพร่กระจายอยู่ 2 บริเวณคือ หมู่เกาะล้านและหมู่เกาะไผ่; ชนิดสุดท้ายคือ ไบรโอซัวเส้นไหม, *Zoobotryon verticillatum* เป็นไบรโอซัวที่มีเส้นใยใสรองรับ Zoooids และแตกกิ่งก้านสาขา พบการแพร่กระจายเพียงแห่งเดียวคือบริเวณแนวปะการังชายฝั่งแสมสาร

ตารางที่ 4 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลตในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


พื้นที่ศึกษา: A = หมู่เกาะสิขัง; B = หมู่เกาะล้าน; C = หมู่เกาะไผ่; D = หมู่เกาะริน; E = หมู่เกาะคราม; F = หมู่เกาะแสมสาร

การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM ENTOPROCTA <i>Order SOLITARIA</i> Family <i>Loxosomella</i> 1. <i>Loxosomella</i> sp.	หนอนถั่ว						
	หนอนถั่วฟองน้ำ	X	-	-	X	X	X
PHYLUM PHORONIDA Family <i>Phoronidae</i> 1. <i>Phoronis australis</i> Haswell	หนอนเกือกม้า						
	หนอนเกือกม้าสีดำ	-	-	X	-	-	-

ตารางที่ 4 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลตในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM BRYOZOA Class GYMNOLAEMATA <i>Order CHEILOSTOMIDA</i> Family Bugulidae 1. <i>Caulibugula</i> sp. Family Schizoporellidae 2. <i>Schizoporella</i> sp. <i>Order CTENOSTOMATA</i> Family Vesiculariidae 3. <i>Zoobotryon verticillatum</i> (Della Chiaje)	ไบรโอซัว						
	ไบรโอซัวร์	-	-	-	X	-	-
	ไบรโอซัวเคลือบหิน	-	X	X	-	-	-
	ไบรโอซัวเส้นหมี่	-	-	-	-	-	X




หนอนถ้วยฟองน้ำ, *Loxosomelia* sp.




หนอนเกือกม้า, *Phoronis australis*



ไบรโอซัวร์, *Caulibugula* sp.



ไบรโอซัวร์เคลือบหิน, *Schizoporella* sp.



ไบรโอซัวร์เส้นไหม, *Zoobotryon verticillatum*

แผ่นภาพที่ 4 สัตว์กลุ่มโอฟิโอรเลตที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี

6. หอยและหมีก (Phylum Mollusca) จากการสำรวจพบสัตว์ทะเลในกลุ่มหอยและหมีกจำนวน 63 ชนิดจาก 39 วงศ์และเป็นสัตว์ที่พบมากเป็นอันดับสามในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 5 หอยและหมีกที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 27 ชนิด หมู่เกาะล้าน 41 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 39 ชนิด หมู่เกาะรีน 28 ชนิด หมู่เกาะคราม 38 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 31 ชนิด หอยและหมีกที่พบสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ

6.1 กลุ่มลิ่นทะเล (Class Polyplacophora) พบเพียงชนิดเดียวในสกุล *Acanthopleura* และมีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะที่ทำการศึกษา ลิ่นทะเลชนิดนี้มักพบอาศัยอยู่ตามโขดหินด้านรับคลื่นลมตามเขตนํ้าขึ้นนํ้าลงในแนวปะการัง

6.2 กลุ่มหอยฝาเดียว (Class Gastropoda) กลุ่มหอยฝาเดียวที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆคือ หอยฝาเดียวและทากทะเล ดังนี้คือ

6.2.1 หอยฝาเดียว (Shells) จากการศึกษาในครั้งนี้พบหอยฝาเดียวจำนวน 19 ชนิดจาก 14 วงศ์ หอยฝาเดียวที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 10 ชนิด หมู่เกาะล้าน 14 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 14 ชนิด หมู่เกาะรีน 10 ชนิด หมู่เกาะคราม 14 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 9 ชนิด หอยฝาเดียวที่พบเป็นชนิดเด่นและมีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะ ได้แก่ หอยนมสาว, *Trochus (Tectus) niloticus*; หอยอุฐ, *Tectus (Tectus) pyramis*; หอยดาวัว, *Turbo (Marmarostoma) bruneus*; หอยจู้เบง, *Cerithium obeliscus*; หอยเบี้ยควาย, *Cypraea (Mauritia) Arabica*; หอยเบี้ยเสือดาว, *Cypraea (Cypraea) tigris*; หอยเงาะ, *Vasum (Vasum) turbinellum*; หอยสังข์จุฬารามณ์, *Cymbiola nobilis* และหอยหมวกเจ็ก, *Siphonaria atra* หอยฝาเดียวที่พบส่วนใหญ่เป็นหอยที่พบได้ทั่วไปในแนวปะการังในเขตภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและบางชนิดเป็นหอยที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หอยสังข์จุฬารามณ์และหอยเบี้ย นอกจากนี้ยังพบหอยหายากและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ หอยเป้าฮือ เป็นต้น

6.2.1 ทากเปลือย (Nudibranchs) จากการศึกษาในครั้งนี้พบทากทะเลจำนวน 20 ชนิดจาก 11 วงศ์ ทากทะเลที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 6 ชนิด หมู่เกาะล้าน 9 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 11 ชนิด หมู่เกาะรีน 5 ชนิด หมู่เกาะคราม 9 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 9 ชนิด ทากทะเลที่พบเป็นชนิดเด่นและมีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะ ได้แก่ ทากทะเลสีขาวยุดดำ, *Jorunna funebris* ซึ่งมักจะพบอาศัยอยู่ใกล้กับฟองน้ำสีน้ำเงิน, *Neopetrosia* sp. "blue" เข้าใจว่าทากทะเลชนิดนี้กินฟองน้ำสีน้ำเงินเป็นอาหาร บางครั้งยังพบรังไข่ของทากทะเลชนิดนี้นบนฟองน้ำอีกด้วย; ทากทะเลสีเทาจุดขาว, *Platydoris scabra* เป็นทากทะเลที่ มักจะพบได้ก้อนหินหรือซากปะการัง; ทากทะเลปุ่มสีขาวลายดำ, *Phyllidia elegans* และทากทะเลปุ่มสีดำจุดชมพู, *Phyllidiella nigra* ทั้งสองชนิดเป็นทากทะเลที่พบทั่วไปบนก้อนหินหรือตามซอกหินในแนวปะการัง ทากทะเลที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นทากทะเลที่พบทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิก นอกจากนี้ยังพบทากทะเลในสกุล *Armina* ที่กินปากกาทะเลเป็นอาหาร

6.3 กลุ่มหอยฝาคู่ (Class Bivalvia) จากการศึกษาในครั้งนี้พบหอยฝาคู่ทั้งหมด 20 ชนิดจาก 11 วงศ์ หอยฝาคู่ที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 10 ชนิด หมู่เกาะล้าน 15

ชนิด หมูเกะไผ่ 14 ชนิด หมูเกะรีน 10 ชนิด หมูเกะคราม 12 ชนิดและหมูเกะแสมสาร 12 ชนิด หอยฝาคู่ที่พบเป็นชนิดเด่นและมีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมูเกะ ได้แก่ หอยแครงหิน, *Arca ventricosa* ซึ่งพบอาศัยอยู่กับปะการังก้อน, *Porites lutea*; หอยเจาะปะการัง, *Lithophaga zittelliana* เป็นหอยฝาคู่ที่สร้างสารละลายหินปูนเพื่อฝังตัวเข้าไปอาศัยอยู่; หอยจอบ, *Atrina pectinata* มักพบอาศัยอยู่บริเวณขอบนอกแนวปะการัง; หอยพัดปะการัง, *Pedum spondyloideum* ซึ่งพบอาศัยอยู่กับปะการังก้อน; หอยมุกกาง, *Pteria penguin* เป็นหอยที่พบอาศัยอยู่ร่วมกับกัลปังหา; หอยฟองน้ำปะการัง, *Spondylus* sp.1 ซึ่งพบอาศัยอยู่ตามชอกปะการังก้อน; หอยมือหมี, *Hyotissa hyotis*; หอยจาวมะพร้าว, *Periglypta puerpera* เป็นหอยฝาคู่ที่ฝังตัวอยู่ใต้ซากปะการังหรือใต้ปะการังที่มีชีวิต ปกติจะยื่นท่อน้ำเข้าและออกไหล่พื้นพื้นออกมา; หอยมือแมว, *Tridacna crocea* และหอยมือเสือ, *Tridacna squamosa* ทั้งสองชนิดเป็นหอยฝาคู่ที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งกำลังถูกคุกคามจากมนุษย์ หอยมือเสือและหอยมือแมวมีสาหร่ายทะเลพวก *Zooxanthellae* อาศัยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน

6.4 กลุ่มหมึก (Class Cephalopoda) จากการศึกษาในครั้งนี้พบหมึกทั้งหมด 3 ชนิดจาก 2 วงศ์ ได้แก่ หมึกกระดองพบชนิดเดียวในสกุล *Sepia* ซึ่งเป็นหมึกที่อาศัยตามพื้นทะเลและมักจะพบฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายขอบนอกแนวปะการังและวางไข่ได้ก่อนหินหรือซากปะการังในแนวปะการัง หมึกอีกพวกหนึ่งที่พบจากการศึกษาครั้งนี้คือ หมึกสายหรือหมึกยักษ์ พบสองชนิดในสกุล *Octopus* หมึกสายมักพบอาศัยอยู่ตามหลุมพื้นท้องทะเล เปลือกหอย เศษแก้วหรือขวดเบียร์ที่นักท่องเที่ยวทิ้งลงไปในแนวปะการัง

ตารางที่ 5 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของหอยและหมึกในบริเวณหมูเกะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ศึกษา: A = หมูเกะสีซัง; B = หมูเกะล้าน; C = หมูเกะไผ่; D = หมูเกะรีน; E = หมูเกะคราม; F = หมูเกะแสมสาร
การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM MOLLUSCA Class POLYPLACOPHORA <i>Order NEOLORICATA</i> Family Chitonidae 1. <i>Acanthopleura</i> sp.	ลิ่นทะเล						
	ลิ่นทะเล	X	X	X	X	X	X
Class GASTROPODA <i>Superorder VETIGASTROPODA</i> Family Haliotidae 2. <i>Haliotis ovina</i> Gmelin 3. <i>Haliotis asinina</i> Linnaeus	หอยฝาคู่เดี่ยว						
	หอยเป้าฮื้อ	X	X	X	X	-	-
	หอยเป้าฮื้อ	-	-	X	-	X	-

ตารางที่ 5 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของหอยและหมีกในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Family Trochidae							
4. Trochus (Tectus) niloticus Linnaeus	หอยนมสาว	X	X	X	X	X	X
5. Tectus (Tectus) pyramis Born	หอยอุรุ	X	X	X	X	X	X
Family Turbinidae							
5. Turbo (Marmarostoma) bruneus Röding	หอยดาวัว	X	X	X	X	X	X
Superorder CAENOCASTROPODA							
Family Cassididae							
7. Phalium glaucum Linnaeus	หอยกระด้าย	-	-	-	-	X	X
Family Cerithidae							
8. Cerithium obeliscus Bruguière	หอยจู้บแจง	X	X	X	X	X	X
Family Cypraeidae							
9. Cypraea (Mauritia) arabica Linnaeus	หอยเบี้ยควาย	X	X	X	X	X	X
10. Cypraea (Cypraea) tigris Linnaeus	หอยเบี้ยเสียดาว	X	X	X	X	X	X
11. Cypraea (Erronea) erronea Linnaeus	หอยเบี้ยกวาง	-	-	X	-	-	-
Family Muricidae							
12. Murex trapa Röding	หอยกังปลา	-	X	-	-	-	-
13. Chicoreus (Chicoreus) ramosus Linnaeus	หอยสังข์หน้ายักษ์	-	X	X	-	-	-
Family Nassariidae							
14. Nassarius sp.	หอยปากมัน	-	-	-	-	X	-
Family Olividae							
15. Oliva (Oliva) oliva Linnaeus	หอยกระดุม	-	X	X	-	-	-
Family Ranellidae							
16. Cymatium (Monoplex) pileare Linnaeus	หอยสังข์ปากหนา	-	-	-	-	X	-
Family Turbinellidae							
17. Vasum (Vasum) turbinellum Linnaeus	หอยเงาะ	X	X	X	X	X	X
Family Volutidae							
18. Cymbiola nobilis Lightfoot	หอยสังข์จุกพราหมณ์	X	X	X	X	X	X
Family Siliquariidae							
19. Siliquaria ponderosa (Morch)	หอยหนอน	-	X	-	-	X	-

ตารางที่ 5 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของหอยและหมึกในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Order BASOMMATOPHORA							
Family Siphonariidae							
20. <i>Siphonaria atra</i> Quoy and Gaimard	หอยหมวกเจ็ก	X	X	X	X	X	X
Subclass OPHISTHOBRANCHIA							
Order ANASPIDEA							
Family Aplysiidae							
21. <i>Aplysia juliana</i> Quoy and Gaimard	กระด่ายทะเลสีน้ำตาล	-	-	-	-	X	-
Order SACOGLOSSA							
Family Elysiidae							
22. <i>Elysia ornata</i> (Swainson)	กระด่ายทะเลสีเขียว	-	-	X	-	-	-
Family Plakobranchidae							
23. <i>Plakobranthus ocellatus</i> van Hasselt	กระด่ายทะเลสีเขียว	-	-	-	-	X	X
Order NUDIBRANCHIA							
Family Dorididae							
24. <i>Discodoris boholensis</i> Bergh	ทากทะเลสีน้ำตาลลายขาว	-	X	X	-	X	-
25. <i>Hoplodoris</i> sp.	ทากทะเลปุ่มสีน้ำตาล	-	-	-	-	X	-
26. <i>Jorunna funebris</i> (Kelaart)	ทากทะเลสีขาวจุดดำ	X	X	X	X	X	X
27. <i>Platydoris scabra</i> (Cuvier)	ทากทะเลสีเทาจุดขาว	X	X	X	X	X	X
Family Chromodoridae							
28. <i>Glossodoris cincta</i> (Bergh)	ทากทะเลสีน้ำตาลขอบฟ้า	-	-	X	-	-	-
29. <i>Glossodoris atromarginata</i> (Cuvier)	ทากทะเลสีเหลืองขอบดำ	-	-	-	-	-	X
30. <i>Hypselodoris</i> aff. <i>kanga</i> Rudman	ทากทะเลสีขาวจุดน้ำเงินเหลือง	-	-	X	-	-	-
31. <i>Risbecia tryoni</i> (Garrett)	ทากทะเลจุดสีน้ำตาล	-	X	-	-	-	-
Family Dendrodorididae							
32. <i>Dendrodoris denisoni</i> (Angas)	ทากทะเลปุ่มสีน้ำตาลจุดฟ้า	X	-	-	-	-	-
Family Gymnodorididae							
33. <i>Gymnodoris alba</i> Baba	ทากทะเลสีขาวจุดส้ม	-	-	X	-	-	-
Family Phyllidiidae							
34. <i>Fryeria menindie</i> Brunckhorst	ทากทะเลปุ่มสีฟ้าจุดเหลือง	-	X	X	-	-	-
35. <i>Phyllidia elegans</i> Bergh	ทากทะเลปุ่มสีขาวลายดำ	X	X	X	X	X	X
36. <i>Phyllidiella pustulosa</i> (Cuvier)	ทากทะเลปุ่มสีชมพู	X	X	X	-	X	X

ตารางที่ 5 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของหอยและหมีกในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
37. <i>Phyllidiella nigra</i> (van Hasselt)	ทากทะเลปุ่มสีดำจุดสีชมพู	X	X	X	X	X	X
Family Flabellinidae							
38. <i>Flabellina rubrolineata</i> (O'Donoghue)	ทากทะเลมังกรน้อย	-	-	-	-	-	X
Family Glaucidae							
39. <i>Pteraeolidia ianthina</i> (Angas,)	ทากทะเลมังกรน้อย	-	-	-	-	-	X
Family Arminidae							
40. <i>Armina</i> aff. <i>cygnea</i> (Bergh)	ทากทะเลลายเส้น	-	X	-	X	-	-
Class Bivalvia	หอยฝาคู่						
Family Arcidae							
41. <i>Arca ventricosa</i> Lamarck	หอยแครงหิน	X	X	X	X	X	X
Family Mytillidae							
42. <i>Lithophaga zittelliana</i> Dunker	หอยเจาะปะการัง	X	X	X	X	X	X
43. <i>Septifer bilocularis</i> Linnaeus	หอยแมลงงูปะการัง	-	-	-	-	-	X
Family Pinnidae							
44. <i>Atrina pectinata</i> (Linnaeus)	หอยจอบ	X	X	X	X	X	X
Family Pectinidae							
45. <i>Chlamys</i> sp.	หอยแครงพัด	-	-	X	-	-	-
46. <i>Pedum spondyloideum</i> (Gmelin)	หอยพัดปะการัง	X	X	X	X	X	X
Family Pteriidae							
47. <i>Pinctada</i> sp.	หอยมุก	-	-	X	-	-	-
48. <i>Pteria penguin</i> (Röding)	หอยมุกกวาง	X	X	X	X	X	X
49. <i>Pteria crocea</i> (Lamarck)	หอยมุกขนนกทะเล	-	X	-	-	-	-
Family Spondylidae							
50. <i>Spondylus wrightianus</i> Crosse	หอยนางรมหนาม	-	-	X	-	X	-
51. <i>Spondylus</i> sp.1	หอยฟองน้ำปะการัง	X	X	X	X	X	X
52. <i>Spondylus</i> sp.2	หอยนางรมหนาม	-	X	-	-	-	-
53. <i>Spondylus</i> sp.3	หอยฟองน้ำ	-	X	-	-	-	-
Family Ostreidae							
54. <i>Hyotissa hyotis</i> (Linnaeus)	หอยมือหมี	X	X	X	X	X	X
55. <i>Lopha</i> sp.	หอยนางรมหวี	-	-	-	-	X	-

ตารางที่ 5 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของหอยและหมึกในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Family Limidae	หอยแครงกระโดด						
56. <i>Limaria fragile</i> Gmelin		X	X	X	X	X	X
Family Mactridae	หอยนาก						
57. <i>Lutraria sieboldii</i> Reeve		-	X	-	-	-	-
Family Veneridae	หอยจาวมะพร้าว						
58. <i>Periglypta puerpera</i> (Linnaeus)		-	X	X	-	-	X
Family Tridacnidae	หอยมือแมว						
59. <i>Tridacna crocea</i> Lamarck		X	X	X	X	X	X
60. <i>Tridacna squamosa</i> Lamarck	หอยมือเสือ	X	X	X	X	X	X
Class Cephalopoda	หมึก						
Family Sepiidae	หมึกกระดอง						
61. <i>Sepia</i> sp.		-	X	-	X	X	-
Family Octopodidae	หมึกสาย						
62. <i>Octopus</i> sp.1		-	X	-	X	X	-
63. <i>Octopus</i> sp. 2	หมึกสาย	-	X	-	-	-	-



ลิมปะเต, *Acanthopleura* sp.



หอยเป้าสี, *Haliotis ovina*



หอยเป้าสี, *Haliotis asinina*



หอยนมสาว, *Trochus (Tectus) niloticus*



หอยอุฐ, *Tectus (Tectus) pyramis*



หอยดาว, *Turbo (Marmarostoma) bruneus*



หอยกระด่าย, *Phalium glaucum*



หอยจื๊อ, *Cerithium obeliscus*

แผ่นภาพที่ 5 หอยและหมีกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี



หอยเบี้ยควาย, *Cypraea (Mauritia) Arabica*




หอยเบี้ยเสือดำ, *Cypraea (Cypraea) tigris*



หอยเบี้ยกว้าง, *Cypraea (Erronea) erronea*



หอยกังปลา, *Murex trapa*



หอยสังข์หน้ายักษ์, *Chicoreus (Chicoreus) ramosus*



หอยปากมัน, *Nassarius* sp.




หอยกระดุม, *Oliva (Oliva) oliva*



หอยสังข์ปากหนา, *Cymatium (Monoplex) pileare*


แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมีกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี



หอยเงาะ, *Vasum (Vasum) turbinellum*



หอยสังข์จุฬามณี, *Cymbiola nobilis*



หอยหนอน, *Siliquaria ponderosa*



หอยหมวกเจ็ก, *Siphonaria atra*



กระต่ายทะเลสีน้ำตาล, *Aplysia juliana*



กระต่ายทะเลสีเขียว, *Elysia ornata*



กระต่ายทะเลสีเขียว, *Plakobranchus ocellatus*




ทากทะเลสีน้ำตาลลายขาว, *Discodoris boholensis*

แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมีกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี




ทากทะเลปุ่มตีนน้ำตาล, *Hoplodoris* sp.



ทากทะเลสีขาวจุดดำ, *Jorunna funebris*



ทากทะเลสีเขียวจุดขาว, *Platydorid scabra*



ทากทะเลสีน้ำตาลขอบฟ้า, *Glossodorid cincta*



ทากทะเลสีเหลืองขอบดำ, *Glossodorid atromarginata*



ทากทะเลสีขาวจุดน้ำเงินเหลือง, *Hypselodorid* aff. *kanga*



ทากทะเลจุดสีน้ำตาล, *Risbecia tryoni*



ทากทะเลปุ่มตีนน้ำตาลจุดฟ้า, *Dendrodoris denisoni*


แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมึกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี



தாகทะเลสีขาวจุดส้ม, *Gymnodoris alba*



தாகทะเลปุ่มสีฟ้าจุดเหลือง, *Fryeria menindie*



தாகทะเลปุ่มสีขาวลายดำ, *Phyllidia elegans*



தாகทะเลปุ่มสีชมพู, *Phyllidiella pustulosa*



தாகทะเลปุ่มสีดำจุดชมพู, *Phyllidiella nigra*



தாகทะเลมังกรน้อย, *Flabellina rubrolineata*



தாகทะเลมังกรน้อย, *Pteraeolidia ianthina*



தாகทะเลลายเส้น, *Armina* aff. *cygnea*


แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมีกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




หอยแครงหิน, *Arca ventricosa*



หอยเจาะปะการัง, *Lithophaga zittelliana*



หอยแมลงภู่ปะการัง, *Septifer bilocularis*




หอยจอบ, *Atrina pectinata*



หอยแครงพัด, *Chlamys* sp.



หอยพัดปะการัง, *Pedum spondyloideum*



หอยมุก, *Pinctada* sp.



หอยมุกกว้าง, *Pteria penguin*

แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมีกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




หอยมุกขนนกทะเล, *Pteria crocea*



หอยนางรมหนาม, *Spondylus wrightianus*



หอยฟองน้ำปะการัง, *Spondylus* sp.1



หอยนางรมหนาม, *Spondylus* sp.2




หอยฟองน้ำ, *Spondylus* sp.3



หอยมือหมี, *Hyotissa hyotis*



หอยนางรมหวี, *Lopha* sp.



หอยแครงกระโดด, *Limaria fragile*

แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมีกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



หอยนาง, *Lutraria sieboldii*




ท่อน้ำของหอยนาง, *Lutraria sieboldii*



หอยจาวมะพร้าว, *Periglypta puerpera*




ท่อน้ำของหอยจาวมะพร้าว, *Periglypta puerpera*



หอยมือแมว, *Tridacna crocea*



หอยมือเสือ, *Tridacna squamosa*



หมึกกระดองลายเสือ, *Sepia* sp.



หมึกสาย, *Octopus* sp.1

แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมึกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี



หมึกสาย, *Octopus* sp.2

แผ่นภาพที่ 5(ต่อ) หอยและหมึกที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี

7. อาร์โทรพอด (Phylum Arthropoda) เป็นสัตว์กลุ่มใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ เพราะมีสมาชิก รวมกันประมาณ 1 ล้านชนิดหรือ 80 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนสัตว์ทั้งหมด สมาชิกของสัตว์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย กุ้ง กิ้ง และปู ซึ่งพบว่ามีสมาชิกอยู่เป็นจำนวนมากในท้องทะเล แต่จากการศึกษาในครั้งนี้พบ อาร์โทรพอดค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสัตว์กลุ่มนี้ใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ตามซอกปะการัง ได้ก้น หินทำให้พบได้ยาก อีกทั้งเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน ซึ่งการปฏิบัติงานดำน้ำในครั้งนี้เกือบทั้งหมด ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวันจึงไม่ค่อยพบอาร์โทรพอดมากนัก การศึกษาในครั้งนี้พบอาร์โทรพอดทั้งหมด 21 ชนิดจาก 4 กลุ่มใหญ่ อาร์โทรพอดที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสี่ซัง 6 ชนิด หมู่เกาะล้าน 14 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 24 ชนิด หมู่เกาะรีน 8 ชนิด หมู่เกาะคราม 14 ชนิดและหมู่เกาะ แสมสาร 16 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 6 ดังนี้คือ

7.1 เพรียงหิน (Subclass Cirripedia) เป็นสัตว์ในกลุ่มอาร์โทรพอดที่สร้างแผ่นหินปูนปกคลุม ร่างกายคล้ายงูเขาไฟ มักจะพบมากในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง จากการศึกษาครั้งนี้พบเพียง 1 ชนิดในสกุล *Balanus* ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

7.2 กุ้งทะเล (Infraorder Caridea) เรามักจะพบกุ้งทะเลอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ทะเลอื่นๆเป็น ส่วนมากในแนวปะการัง เช่น ฟองน้ำ ปะการัง ปะการังอ่อน และเอคโคไคโนเดิร์ม เป็นต้น จากการศึกษาครั้งนี้ พบกุ้งทะเล 5 ชนิดในอันดับย่อย Caridea ทั้งหมด ในจำนวนนี้พบ 1 ชนิดที่มีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะ ที่ทำการสำรวจคือ กุ้งรูลาปูในสกุล *Alpheus* ซึ่งเป็นกุ้งที่อาศัยอยู่ร่วมกับปลาปูในบริเวณพื้นทรายขอบนอก แนวปะการัง นอกจากนั้นเป็นกุ้งทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆ ได้แก่ กุ้งดอกไม้ทะเล, *Periclimenes holthuisi* ; กุ้งไฮปะการัง, *Periclimenes tenuipes* และ กุ้งไฮปะการัง, *Periclimenes* sp. และพบกุ้งที่อาศัยอยู่ อย่างอิสระคือ กุ้งมดแดงในสกุล *Rhynchocinetes* ซึ่งพบที่ หมู่เกาะล้าน

7.3 ปูเสฉวน (Infraorder Anomura) ปูเสฉวนเป็นอาร์โทรพอดที่มีส่วนท้องอ่อนนุ่ม ดังนั้นจึง ต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยหรือวัสดุอื่นๆเพื่อป้องกันส่วนท้องนี้ ในกลุ่มนี้ยังรวมถึงพวกปูตัวแบนที่อาศัยอยู่ ร่วมสัตว์ชนิดอื่นๆด้วย จากการศึกษาพบปูเสฉวนทั้งหมด 3 ชนิด จาก 2 วงศ์ ได้แก่ ปูเสฉวนในสกุล *Dardanus* พบ 2 ชนิดคือ ปูเสฉวนขน, *Dardanus lagopodes* ซึ่งพบแพร่กระจายอยู่บริเวณหมู่เกาะไผ่และหมู่ เกาะแสมสารและปูเสฉวนแดง, *Dardanus megistos* ซึ่งเป็นปูเสฉวนขนาดใหญ่และพบแพร่กระจายมาก ที่สุดคือ หมู่เกาะไผ่ หมู่เกาะครามและหมู่เกาะแสมสาร ปูเสฉวนอีกชนิดหนึ่งเป็นปูเสฉวนที่พบในเขตน้ำขึ้น น้ำลง ได้แก่ ปูเสฉวนในสกุล *Coenobita* นอกจากนี้ยังพบปูตัวแบน 1 ชนิดในสกุล *Galathea* ซึ่งพบอาศัยอยู่ กับฟองน้ำกระชายบริเวณขอบนอกแนวปะการังหมู่เกาะไผ่

7.4 ปูทะเล (Infraorder Branchyura) การศึกษาในครั้งนี้พบปูทะเลทั้งหมด 11 ชนิดจาก 8 วงศ์ ปูทะเลที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสี่ซัง 2 ชนิด หมู่เกาะล้าน 5 ชนิด หมู่ เกาะไผ่ 6 ชนิด หมู่เกาะรีน 3 ชนิด หมู่เกาะคราม 3 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 4 ชนิด ปูทะเลที่มีการ แพร่กระจายทุกหมู่เกาะ 2 ชนิดคือ ปูหิน, *Thalamita* sp.2 ในวงศ์ Portunidae และปูใบปะการัง, *Trapezia* sp.

ส่วนปูชนิดอื่นๆที่พบเป็นปูที่ส่วนมากอาศัยอยู่อย่างอิสระในวงศ์ Xanthidae นอกจากนี้ยังพบปูม้าลาย, *Zebrida adamsi* ที่กินเนื้อเยื่อภายนอกของเม่นเต่างั่ว, *Toxopneustes pileolus* เป็นอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของอาร์โทรพอดในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ศึกษา: A = หมู่เกาะสีชัง; B = หมู่เกาะล้าน; C = หมู่เกาะไผ่; D = หมู่เกาะรี; E = หมู่เกาะคราม; F = หมู่เกาะแสมสาร
การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM ARTHROPODA Subphylum CRUSTACEA Class MAXILLOPODA Subclass CIRRIPIEDIA <i>Order THORACICA</i> Family Balanidae 1. <i>Balanus</i> sp.	เพรียงหิน เพรียงหิน	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Class MALACOSTRACA <i>Order DECAPODA</i> <i>Infraorder CARIDEA</i> Family Palaemonidae 2. <i>Periclimenes holthuisi</i> Bruce 3. <i>Periclimenes tenuipes</i> Borradaile 4. <i>Periclimenes</i> sp. Family Rhynchocinetidae 5. <i>Rhynchocinetes</i> sp. Family Alpheidae 6. <i>Alpheus</i> sp.	กั้ง กั้ง ปู กั้งทะเล กั้งดอกไม้ทะเล กั้งใส่ปะการัง กั้งใส่ปะการัง กั้งมดแดง กั้งรูปลาปู	 - - - - X	 - - - X X	 X - - - X	 - - - - X	 - - - X X	 - - - - X
<i>Infraorder ANOMURA</i> Family Diogenidae 7. <i>Dardanus lagopodes</i> Forskål 8. <i>Dardanus megistos</i> Herbst Family Coenobitidae 9. <i>Coenobita</i> sp. Family Galatheididae 10. <i>Galathea</i> sp.	ปูเสฉวน ปูเสฉวนขน ปูเสฉวนแดง ปูเสฉวน ปูตัวแบน	 - - - -	 - - - -	 X - X -	 - - X X	 - - X -	 X - X -

ตารางที่ 6 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของอาร์โทรพอดในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
<i>Infraorder BRANCHYURA</i>	ปู						
Family Dromiidae							
11. <i>Dromia</i> sp.	ปูฟองน้ำ	-	-	X	-	-	-
Family Eumedonidae							
12. <i>Zebrida adamsi</i> White	ปูม้าลาย	-	X	-	-	-	-
Family Majidae							
13. <i>Schizophrys aspera</i> (H.Milne Edwards)	ปูแมงมุม	-	-	-	X	-	-
Family Latreillidae							
14. <i>Latreilla</i> sp.	ปูแมงมุม	-	-	X	-	-	-
Family Parthenopidae							
15. <i>Parthenope</i> sp.	ปูก้ามขาว	-	-	-	-	-	X
Family Portunidae							
16. <i>Thalamita</i> sp.1	ปูหิน	-	-	X	-	-	-
17. <i>Thalamita</i> sp.2	ปูหิน	X	X	X	X	X	X
Family Xanthidae	ปูใบ้						
18. <i>Atergatis intergerrimus</i> Lamarck	ปูใบ้หลังเต่า	-	X	-	-	X	X
19. <i>Atergatis</i> sp.	ปูใบ้	-	X	-	-	-	-
20. <i>Trapezia</i> sp.	ปูใบ้ปะการัง	X	X	X	X	X	X
Family Goneplacidae							
21. <i>Eucrate alcocki</i> Serene	ปูใบ้น้ำลึก	-	-	X	-	-	-




เพรียงหิน, *Balanus* sp.




กุ้งดอกไม้ทะเล, *Periclimenes holthuisi*



กุ้งใส, *Periclimenes tenuipes*



กุ้งใสปะการัง, *Periclimenes* sp.



กุ้งมดแดง, *Rhynchocinetes* sp.



กุ้งรูปลานู, *Alpheus* sp.



ปูเสฉวนขน, *Dardanus lagopodes*



ปูเสฉวนแดง, *Dardanus megistos*

แผ่นภาพที่ 6 อาร์โทรโปดาที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ปูเสฉวน, *Dardanus lagopodes*



ปูตัวแบน, *Galathea* sp.



ปูฟองน้ำ, *Dromia* sp.



ปูตัวแบน, *Zebrida adamsi*



ปูแมงมุม, *Schizophrys aspera*



ปูแมงมุมขน, *Latreilla* sp.



ปูก้ามยาว, *Parthenope* sp.



ปูหิน, *Thalamita* sp.1

แผ่นภาพที่ 6(ต่อ) อาร์โทร โปดาที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปูหิน, *Thalamita* sp.2



ปูใบหลังเต่า, *Atergatis intergerrimus*



ปูใบ้, *Atergatis* sp.



ปูประการัง, *Atergatis intergerrimus*



ปูใบ้น้ำลึก, *Eucrate alcocki*

แผ่นภาพที่ 6(ต่อ) อาร์โทรโปดาที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี

8. **เอคไคโนเดิร์ม (Phylum Echinodermata)** เป็นสัตว์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่พบและมีบทบาทสำคัญในแนวปะการังเช่นกัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ด้วยกันคือ คือ ดาวขนนก (Class Crinoidea) ดาวทะเล (Class Asteroidea) ดาวเปราะ (Class Ophiuroidea) เม่นทะเล เม่นหัวใจ และหรียทุทะเล (Class Echinoidea) และปลิงทะเล (Class Holothurioidea) จากการสำรวจพบเอคไคโนเดิร์มทั้งหมดจำนวน 71 ชนิดจาก 28 วงศ์ ดังแสดงในตารางที่ 7 และแผนภาพที่ 7

จากการศึกษาเอคไคโนเดิร์มที่พบมากที่สุดคือ ปลิงทะเล 23 ชนิด รองลงมาคือ ดาวเปราะ 18 ชนิด เม่นทะเล หรียทุทะเลและเม่นหัวใจ 15 ชนิด และดาวขนนก 2 ชนิดตามลำดับ เอคไคโนเดิร์มที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 37 ชนิด หมู่เกาะล้าน 49 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 49 ชนิด หมู่เกาะรีน 30 ชนิด หมู่เกาะคราม 44 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 43 ชนิด กลุ่มเอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดเด่นและพบทุกจุดสำรวจได้แก่ ดาวขนนก 2 ชนิด ได้แก่ ดาวขนนกสีเขียว, *Lamprometra palmate*; ดาวขนนกสีขาวดำ, *Stephanometra spicata*; ดาวทะเล 4 ชนิด ได้แก่ ดาวแสงอาทิตย์, *Luidia maculata*; ดาวทราย, *Astropecten polyacanthus*; ดาวหมอนปักเข็ม, *Culcita novaeguineae*; ดาวทะเลหนาม, *Asteropsis carinifera*; ดาวเปราะ 7 ชนิด ได้แก่ ดาวเปราะเขียว, *Ophiactis helmitiles*; ดาวเปราะเขียว, *Ophiactis savignyi* ซึ่งพบอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลในทุกจุดสำรวจ; ดาวเปราะหนามใหญ่, *Macrophiothrix longipeda*; ดาวเปราะหนามสั้น, *Ophiothrix (Ophiothrix) exigua* ซึ่งพบอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลในทุกจุดสำรวจ; ดาวเปราะหนามเล็ก, *Ophiothrix (Ophiothrix) plana* ซึ่งดาวเปราะหนามเล็กที่อยู่อย่างอิสระ; ดาวเปราะหนามสั้น, *Ophiarachnella gorgonian*; เม่นทะเล หรียทุทะเลและเม่นหัวใจ 6 ชนิด ได้แก่ เม่นหนามมงกุฏ, *Prionocidaris bispinosa*; เม่นทะเลหนามยาว, *Diadema setosum*; เม่นแต่งตัวสีเขียว, *Salmacis sphaeroides*; เม่นแต่งตัว, *Toxopneustes pileolus*; หรียทุทะเล, *Echinodiscus auritus*; เม่นหัวใจ, *Brissus (Brissus) latecarinatus*; และปลิงทะเล 6 ชนิด ได้แก่ ปลิงทะเลสีดำ, *Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota*; ปลิงสีน้ำตาล, *Holothuria (Stauropora) fuscocinerea*; ปลิงสีเขียว, *Holothuria (Thymiosycia) impatiens*; ปลิงหิน, *Stichopus horrens*; ปลิงสีชมพูเหลือง, *Cercodemus anceps* และปลิงสร้อยไข่มุก, *Synaptula recta* เอคไคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาเหล่านี้เป็นชนิดที่พบมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (สุเมตต์ ปุจฉาการ, 2541) และในเขตน้ำตื้นของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (Clark and Rowe, 1971) เอคไคโนเดิร์มที่พบเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศมากกว่าทางเศรษฐกิจ สังคม ยกเว้นปลิงทะเลบางชนิด ได้แก่ *H. (Halodeima) atra*; ปลิงขาว, *Holothuria (Metriatyla) scabra* และ *Stichopus horrens* ซึ่งสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้ (มัทนา แสงจินดาวัน, 2516). นอกจากนี้เอคไคโนเดิร์มในพวกปลิงทะเลในสกุล *Synaptula* spp. ยังไม่สามารถทำการจำแนกชนิดในระดับชนิดได้ เนื่องจากขาดเอกสารอ้างอิง ลักษณะของสปีชีส์ที่คล้ายคลึงกันมากและแต่ละชนิดมีความผันแปรของสปีชีส์จึงไม่สามารถระบุถึงชนิดของปลิงในสกุลนี้ได้

การแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษารั้วนี้ มีข้อสังเกตว่าเอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ที่มีการแพร่กระจายค่อนข้างจำกัดอยู่เฉพาะถิ่นอาศัยที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังและมักจะไม่ค่อยพบเอคไคโน

เคิร์มที่สามารถแพร่กระจายเข้าไปอยู่ได้ในถิ่นอาศัยย่อยอันหลากหลายระบบนิเวศปะการังมากนัก ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากเอคโคโนเคิร์มมีการปรับตัวและดำรงชีวิตเข้ากับถิ่นอาศัยนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ดาวขนนก, *Stephanometra spicata* และ *Lamprometra palmata* จะพบอยู่เฉพาะในบริเวณแนวปะการัง เนื่องจากมีที่หลบซ่อนตัวอยู่มากมายตามซอกปะการังและจะออกหาอาหารในเวลากลางคืนเพราะว่าศัตรูได้ไปพักผ่อนแล้ว ดาวแสงอาทิตย์, *Luidia maculate* ที่กินเม่นทะเลเป็นอาหารสามารถยื่นกระเพาะอาหาร ออกมาภายนอกได้ทำให้สามารถกินอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่าปากและมีผนังลำตัวที่ยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีจึง สามารถเก็บเปลือกของเหยื่อไว้ในลำตัวได้มาก ดาวเปราะมีการพัฒนาหนามของแขนให้เหมาะสมกับ ถิ่นอาศัย เช่น *Ophiothrix* (*Ophiothrix*) *exigua* มีหนามของแขนอันล่างสุด มีลักษณะเป็นตะขอไว้สำหรับ เกาะผิวฟองน้ำ ส่วนพวกดาวเปราะที่มีหนามของแขนสั้นมักจะเป็นผู้ล่า ได้แก่ *Ophiarachnella gorgonia* พวกเม่นทะเล เม่นหัวใจ เหยี่ยวทะเล ใน Class Echinoidea มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและอวัยวะให้ เหมาะสมกับการอาศัยอยู่ตามระบบนิเวศ ทำให้แพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางตามพื้นทะเล เช่น *Diadema setosum* ที่มีหนามยาวมากขึ้นเพื่อป้องกันตัวและมักจะรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง *Echinothrix calamaris* มักจะพบอยู่เดี่ยวๆ แต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เป็นที่เกรงขามต่อศัตรู พวกเม่นทะเลที่มีหนามสั้น ในพวกเม่นเต่างตัว ได้แก่ *Salmacis sphaeroides* มีเปลือกและหนามที่แข็งแรงมากขึ้นและจะนำเอาเศษ เปลือกหอยมาปกคลุมตัวเพื่อพรางศัตรู *Toxopneustes pileolus* มีอวัยวะจับสัตว์เล็กๆ ที่มีต่อมน้ำพิษเจริญดี เพื่อป้องกันตัว เม่นหัวใจ, *Lovenia elongata* และ *Brissus* (*Brissus*) *latecarinatus* ที่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทะเล จะมีเปลือกด้านหน้าลักษณะกลมมนและมีส่วนลาดเพื่อมุดเข้าไปในพื้นทะเลได้ง่ายและมีหนามที่มีหลายแบบ เพื่อทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น เคลื่อนที่ ลำเลียงตะกอนผ่านลำตัว และขุดดิน เป็นต้น ปลิงทะเลมีหนวครอบ ปากที่แตกต่างกันตามลักษณะการกินอาหารอาหาร เช่น *Cercodemus anceps*, *Colochirus quadrangularis* และ *Stolus buccalis* มีหนวดแบบกิ้งไม้และมีเมือกเหนียวเพื่อจับตะกอนและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ล่องลอยในน้ำ เป็นอาหารและมีผนังลำตัวหนาและเท้าที่แข็งแรงเนื่องจากต้องเกาะอยู่กับที่ *Holothuria* (*Halodeima*) *atra* และ *H. (Mertensiothuria) leucospilota* มีผนังลำตัวที่อ่อนนุ่มสามารถพองและหดตัวได้ดี และมีอวัยวะ ป้องกันตัว (Cuvierian organ) เนื่องจากต้องอาศัยอยู่อย่างอิสระตามพื้นทะเล *H. (Semperothuria) flavomaculata* และ *H. (Thymiosycia) impatiens* จะหลบซ่อนอยู่ตามซอกปะการังและจะยื่นเฉพาะส่วนหัว ออกมาภายนอกเพื่อหาอาหารเท่านั้น

ตารางที่ 7 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ศึกษา: A = หมู่เกาะสีชัง; B = หมู่เกาะล้าน; C = หมู่เกาะไผ่; D = หมู่เกาะรี; E = หมู่เกาะคราม; F = หมู่เกาะแสมสาร

การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM ECHINODERMATA							
Class CRINOIDEA							
<i>Order COMATULIDA</i>							
Family Mariametridae							
1. <i>Lamprometra palmata</i> (J. Müller)	ดาวขนนก						
2. <i>Stephanometra spicata</i> (P.H. Carpenter)	ดาวขนนกสีเขียว	X	X	X	X	X	X
	ดาวขนนกสีขาวดำ	X	X	X	X	X	X
Class ASTEROIDEA							
<i>Order PAXILLOSIDA</i>							
Family Luidiidae							
3. <i>Luidia maculata</i> Müller & Troschel	ดาวทะเล						
4. <i>Luidia hardwicki</i> (Gray)	ดาวแสงอาทิตย์	X	X	X	X	X	X
	ดาวทราย	X	X	-	-	-	-
Family Astropectinidae							
5. <i>Astropecten polyacanthus</i> Müller & Troschel	ดาวทราย	X	X	X	X	X	X
6. <i>Astropecten velitaris</i> von Martens	ดาวทราย	X	X	-	-	X	X
<i>Order VALVATIDA</i>							
Family Oreasteridae							
7. <i>Anthenea pentagonula</i> (Lamarck)	ดาวทะเลสีเหลืองแดง	X	X	-	-	-	-
8. <i>Anthenea regalis</i> Koehler	ดาวทะเลสีน้ำตาล	-	X	-	-	X	-
9. <i>Culcita novaeguineae</i> Müller & Troschel	ดาวหมอนปีกเข็ม	X	X	X	X	X	X
10. <i>Goniodiscaster forficulatus</i> (Perrier)	ดาวทะเล	-	X	-	-	-	-
11. <i>Pentaceraster gracilis</i> (Lütken)	ดาวทะเลปุ่ม	X	-	-	-	X	X
Family Asteropseidae							
12. <i>Asteropsis carinifera</i> (Lamarck)	ดาวทะเลหนาม	X	X	X	X	X	X
Family Acanthasteridae							
13. <i>Acanthaster planci</i> (Linnaeus)	ดาวมงกุฎหนาม	-	X	X	X	X	X
<i>Order VELATIDA</i>							
Family Pterasteridae							
14. <i>Euretaster cribosus</i> (von Martens)	ดาวทะเล	-	-	-	-	-	X

ตารางที่ 7 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
<i>Order SPINULOSIDA</i>							
Family Echinasteridae							
15. <i>Echinaster luzonica</i> (Gray)	ดาวทะเล	-	-	-	X	-	-
Class OPHIUROIDEA	ดาวประ						
<i>Order OPHIURIDA</i>							
Family Amphiuridae							
16. <i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje)	ดาวประ	-	-	X	-	-	X
17. <i>Amphiura</i> (Felleria) <i>heptacantha</i> (Mortensen)	ดาวประ	-	-	-	-	-	X
Family Ophiactidae							
18. <i>Ophiactis helmitiles</i> H.L. Clark	ดาวประเขี้ยว	X	X	X	X	X	X
19. <i>Ophiactis savignyi</i> (Müller & Troschel)	ดาวประเขี้ยว	X	X	X	X	X	X
20. <i>Ophiosphaera insignis</i> Brock	ดาวประสองเพศ	-	X	-	-	-	-
Family Ophitrichidae							
21. <i>Macrophiothrix hirsuta</i> (Müller & Troschel)	ดาวประหนามใหญ่	-	X	-	-	-	-
22. <i>Macrophiothrix longipeda</i> (Lamarck)	ดาวประหนามใหญ่	X	X	X	X	X	X
23. <i>Macrophiothrix variabilis</i> (Duncan)	ดาวประหนามใหญ่	-	-	X	-	-	-
24. <i>Ophiocnemis marmorata</i> (Lamarck)	ดาวประเมงกะพรุน	-	-	-	-	-	X
25. <i>Ophiopterion elegans</i> Ludwig	ดาวประหนามหวี	-	X	X	-	-	-
26. <i>Ophiothela danae</i> Verrill	ดาวประกัลปังหา	-	X	X	-	X	X
27. <i>Ophiothrix</i> (<i>Acanthophiothrix</i>) <i>spinosissima</i> Koehler	ดาวประหนามเล็ก	X	X	X	-	-	-
28. <i>Ophiothrix</i> (<i>Ophiothrix</i>) <i>exigua</i> Lyman	ดาวประหนามเล็ก	X	X	X	X	X	X
29. <i>Ophiothrix</i> (<i>Ophiothrix</i>) <i>plana</i> Lyman	ดาวประหนามเล็ก	X	X	X	X	X	X
Family Ophiocomidae							
30. <i>Ophiomastix sexradiata</i> A.H. Clark	ดาวประ	-	-	-	X	-	-
Family Ophionereididae							
31. <i>Ophionereis porrecta</i> Lyman	ดาวประ	-	-	X	X	-	-
Family Ophiodermatidae							
32. <i>Ophiarachnella gorgonia</i> (Müller & Troschel)	ดาวประหนามสั้น	X	X	X	X	X	X
33. <i>Ophiarachnella infernalis</i> (Müller & Troschel)	ดาวประหนามสั้น	-	-	X	-	-	-

ตารางที่ 7 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Class ECHINOIDEA	เม่นทะเล						
<i>Order CIDAROIDA</i>							
Family Cidaridae							
34. <i>Prionocidaris bispinosa</i> (Lamarck)	เม่นหนามมงกุฏ	X	X	X	X	X	X
<i>Order DIADEMATOIDA</i>							
Family Diadematidae							
35. <i>Diadema setosum</i> (Leske)	เม่นคำหนามขาว	X	X	X	X	X	X
36. <i>Echinothrix calamaris</i> (Pallas)	เม่นคำหนามสั้น	-	X	X	X	X	X
<i>Order TEMNOPLEUROIDA</i>							
Family Temnopleuridae							
37. <i>Salmaciella dussumieri</i> (L. Agassiz)	เม่นแฉ่งตัวสีแดง	X	-	X	-	-	-
38. <i>Salmacis sphaeroides</i> (Linnaeus)	เม่นแฉ่งตัวสีเขียว	X	X	X	X	X	X
39. <i>Salmacis virgulata</i> L. Agassiz	เม่นแฉ่งตัวสีม่วง	-	-	X	-	X	X
40. <i>Temnopleurus toreumaticus</i> (Leske)	เม่นสีน้ำตาล	X	-	X	-	-	-
<i>Order ECHINOIDA</i>							
Family Toxopneustidae							
41. <i>Toxopneustes pileolus</i> (Lamarck)	เม่นแฉ่งตัว	X	X	X	X	X	X
Family Parasaleneiidae							
42. <i>Parasalenia gratiosa</i> A. Agassiz	เม่นทะเลสีดำ	-	X	-	-	X	X
<i>Order CLYPEASTEROIDA</i>	เหรียญทะเล						
Family Arachnoididae							
43. <i>Arachnoides placentra</i> (Linnaeus)	เหรียญทะเล	X	-	-	-	-	X
Family Astriclypeidae							
44. <i>Echinodiscus auritus</i> Leske	เหรียญทะเล	X	X	X	X	X	X
<i>Order SPATANGOIDA</i>	เม่นหัวใจ						
Family Loveniidae							
45. <i>Lovenia elongata</i> (Gray)	เม่นหัวใจ	X	X	X	-	X	X
Family Brissidae							
46. <i>Brissopsis luzonica</i> (Gray)	เม่นหัวใจ	X	X	X	-	X	-
47. <i>Brissus (Brissus) latecarinatus</i> (Leske)	เม่นหัวใจ	X	X	X	X	X	X
48. <i>Metalia sternalis</i> (Lamarck)	เม่นหัวใจ	X	-	X	-	X	-

ตารางที่ 7 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
Class HOLOTHUROIDEA	ปลิงทะเล						
<i>Order ASPIDOCHIROTIDA</i>	ปลิงหนวดจาน						
Family Holothuriidae							
49. <i>Bohadschia vitiensis</i> (Semper)	ปลิงฟักทอง	X	X	X	-	X	X
50. <i>Bohadschia marmorata</i> (Jaeger)	ปลิงสีน้ำตาล	-	-	X	-	X	-
51. <i>Holothuria (Halodeima) atra</i> Jaeger	ปลิงดำ	-	-	-	-	X	X
52. <i>Holothuria (Lessonothuria) verrucosa</i> Selenka	ปลิงน้ำตาลจุดฟ้า	-	X	-	-	X	X
53. <i>Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota</i> (Brandt)	ปลิงดำ	X	X	X	X	X	X
54. <i>Holothuria (Metriatyla) ocellata</i> Jaeger	ปลิงทะเล	-	X	-	-	-	-
55. <i>Holothuria (Metriatyla) scabra</i> Jaeger	ปลิงขาว	-	X	-	-	-	-
56. <i>Holothuria (Platyperona) difficilis</i> Semper	ปลิงทะเลเล็ก	-	-	-	X	X	-
57. <i>Holothuria (Semperothuria) flavomaculata</i> Semper	ปลิงสีม่วง	-	X	X	-	X	-
58. <i>Holothuria (Stauropora) fuscocinerea</i> Jaeger	ปลิงสีน้ำตาล	X	X	X	X	X	X
59. <i>Holothuria (Thymiosycia) impatiens</i> Forskål	ปลิงสีเขียว	X	X	X	X	X	X
Family Stichopodidae							
60. <i>Stichopus hermanni</i> Semper	ปลิงหินสีน้ำตาล	-	X	-	-	-	-
61. <i>Stichopus horrens</i> Selenka	ปลิงหิน	X	X	X	X	X	X
62. <i>Stichopus naso</i> Semper	ปลิงหิน	-	X	X	-	X	-
<i>Order DENDROCHIROTIDA</i>	ปลิงหนวดต้นไม้						
Family Cucumariidae							
63. <i>Cercodemus anceps</i> (Selenka)	ปลิงสีชมพูเหลือง	X	X	X	X	X	X
64. <i>Colochirus quadrangularis</i> Troschel	ปลิงสีเขียว	X	X	X	-	X	X
Family Phyllophoridae							
65. <i>Havelockia versicolor</i> (Semper)	ปลิงสีเขียว	-	X	X	-	-	-
66. <i>Stolus buccalis</i> (Stimpson)	ปลิงสีดำ	-	X	-	-	-	X
67. <i>Thyone okeni</i> Bell	ปลิงสีเหลือง	-	-	X	-	-	-
<i>Order DENDROCHIROTIDA</i>	ปลิงหนวดขนนก						
Family Synaptidae							
68. <i>Synaptula recta</i> (Semper)	ปลิงสร้อยไข่มุก	X	X	X	X	X	X
69. <i>Synaptula</i> aff. <i>virgata</i> (Sluiter)	ปลิงสร้อยไข่มุกสีขาว	-	-	X	-	-	-
70. <i>Synaptula</i> sp.1	ปลิงสร้อยไข่มุก	-	-	X	-	X	X
71. <i>Synaptula</i> sp.2	ปลิงสร้อยไข่มุก	-	-	X	-	-	-



ดาวขนนกสีเขียว, *Lamprometra palmata*




ดาวขนนกสีขาวดำ, *Stephanometra spicata*




ดาวแสงอาทิตย์, *Luidia maculata*



ดาวทราย, *Luidia hardwicki*



ดาวทราย, *Astropecten polyacanthus*



ดาวทราย, *Astropecten velitaris*



ดาวทะเลสีเหลืองแดง, *Anthenea pentagonula*



ดาวทะเลสีน้ำตาล, *Anthenea regalis*

แผ่นภาพที่ 7 เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ดาวหมอนปีกเข้ม, *Culcita novaeguineae*



ดาวทะเล, *Goniodiscaster forficulatus*



ดาวทะเลปุ่ม, *Pentaceraster gracilis*



ดาวทะเลหนาม, *Asteropsis carinifera*



ดาวมงกุฎหนาม, *Acanthaster planci*



ดาวทะเล, *Euretaster criboosus*




ดาวทะเล, *Echinaster luzonica*



ดาวปราง, *Amphipholis squamata*

แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ดาวเปราะ, *Amphiura (Felleria) heptacantha*




ดาวเปราะเขียว, *Ophiactis helmitiles*



ดาวเปราะเขียว, *Ophiactis savignyi*



ดาวเปราะสองเพศ, *Ophiosphaera insignis*




ดาวเปราะหนามใหญ่, *Macrophiothrix hirsuta*



ดาวเปราะหนามใหญ่, *Macrophiothrix longipeda*



ดาวเปราะหนามใหญ่, *Macrophiothrix variabilis*



ดาวเปราะเมงกะพรุน, *Ophiocnemis marmorata*


แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ดาวเปราะหนามหวี, *Ophioplectron elegans*




ดาวเปราะกัลปังหา, *Ophiothela danae*



ดาวเปราะหนามเล็ก, *Ophiothrix (Acanthophiothrix) spinosissima*



ดาวเปราะหนามเล็ก, *Ophiothrix (Ophiothrix) exigua*



ดาวเปราะหนามเล็ก, *Ophiothrix (Ophiothrix) plana*



ดาวเปราะ, *Ophiomastix sexradiata*




ดาวเปราะ, *Ophiomastix porrecta*



ดาวเปราะหนามสั้น, *Ophiarachnella gorgonia*


แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ดาวประหลาดม้วน, *Ophiarachnella infernalis*



เม่นหนามมงกุฏ, *Prionocidaris bispinosa*




เม่นดำหนามขาว, *Diadema setosum*



เม่นดำหนามสั้น, *Echinothrix calamaris*



เม่นแฉ่งตัวสีแดง, *Salmaciella dussumieri*



เม่นแฉ่งตัวสีเขียว, *Salmacis sphaeroides*



เม่นแฉ่งตัวสีม่วง, *Salmacis virgulata*




เม่นสีน้ำตาล, *Temnopleurus toreumaticus*

แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



เม่นแต่งตัว, *Toxopneustes pileolus*



เม่นทะเลสีดำ, *Parasalenia gratiosa*



เหรีษญทะเล, *Arachnoides placentra*



เหรีษญทะเล, *Echinodiscus auritus*



เม่นหัวใจ, *Lovenia elongata*



เม่นหัวใจ, *Brissopsis luzonica*



เม่นหัวใจ, *Brissus (Brissus) latecarinatus*



เม่นหัวใจ, *Metalia sternalis*

แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




ปลิงฟักทอง, *Bohadschia vitiensis*




ปลิงสีน้ำตาล, *Bohadschia marmorata*



ปลิงดำ, *Holothuria (Halodeima) atra*




ปลิงน้ำตาลจุดฟ้า, *Holothuria (Lessonothuria) verrucosa*



ปลิงดำ, *Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota*



ปลิงทะเล, *Holothuria (Metriatyla) ocellata*



ปลิงขาว, *Holothuria (Metriatyla) scabra*



ปลิงทะเล, *Holothuria (Platyperona) difficilis*

แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



ปลิงสีม่วง, *Holothuria (Semperothuria) flavomaculata*



ปลิงสีน้ำตาล, *Holothuria (Stauropora) fuscocinerea*



ปลิงสีเขียว, *Holothuria (Thymiosycia) impatiens*



ปลิงหินสีน้ำตาล, *Stichopus hermanni*




ปลิงหิน, *Stichopus horrens*



ปลิงหิน, *Stichopus naso*



ปลิงสีชมพูเหลือง, *Cercodemas anceps*




ปลิงสีเขียว, *Colochirus quadrangularis*


แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอก โค โน เดิร์ม ที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี



ปลิงสีเขียว, *Havelockia versicolor*



ปลิงสีดำ, *Stolus buccalis*




ปลิงสีเขียว, *Thyone okeni*



ปลิงสร้อยไข่มุก, *Synaptula recta*



ปลิงสร้อยไข่มุกสีขาว, *Synaptula aff. virgata*



ปลิงสร้อยไข่มุก, *Synaptula* sp.1



ปลิงสร้อยไข่มุก, *Synaptula* sp.2

แผ่นภาพที่ 7(ต่อ) เอกโคโนเดิร์มที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี

9. เพรียงหัวหอม (Phylum Chordata, Subphylum Urochordata) เป็นสัตว์ที่อยู่รอบต่อระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากการศึกษาในครั้งนี้พบเพรียงหัวหอมจำนวน 32 ชนิด จาก 6 วงศ์ ดังแสดงในตารางที่ 8 และแผ่นภาพที่ 8 ประกอบด้วย เพรียงหัวหอมกลุ่ม (Suborder Aplousobranchia) จำนวน 13 ชนิด เพรียงหัวหอมเดี่ยวใส (Suborder Phlebobranchia) จำนวน 5 ชนิด เพรียงหัวหอมเดี่ยว (Suborder Stolidobranchia) จำนวน 14 ชนิด เพรียงหัวหอมที่พบมีการแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆดังนี้ บริเวณหมู่เกาะสีชัง 9 ชนิด หมู่เกาะล้าน 16 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 11 ชนิด หมู่เกาะรีน 8 ชนิด หมู่เกาะคราม 14 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 22 ชนิด เพรียงหัวหอมที่พบเป็นชนิดเด่นและมีการแพร่กระจายอยู่ทุกหมู่เกาะจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ เพรียงหัวหอมกลุ่มใส, *Eudistoma* sp., เพรียงหัวหอมกลุ่มสีครีม, *Aplidium* sp., เพรียงหัวหอมกลุ่มสีชมพู, *Didemnum* sp.3, เพรียงหัวหอมกลุ่มสีเขียว, *Lissoclinum* sp., เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีขาว, *Phallusia* sp.1, เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีดำ, *Phallusia* sp.3, เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีน้ำตาล, *Polycarpa* sp.1, และเพรียงหัวหอมเดี่ยวปากเขียว, *Polycarpa* sp.2 เพรียงหัวหอมที่พบส่วนใหญ่ไม่สามารถจำแนกได้ถึงระดับชนิดได้ เนื่องจากขาดเอกสารอ้างอิง อย่างไรก็ตามเพรียงหัวหอมมักจะถูกพบเป็นกลุ่มสัตว์ที่พบเสมอในแนวปะการังแต่ยังมีผู้ทำการศึกษากันน้อยมาก

ตารางที่ 8 รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเพรียงหัวหอมในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ศึกษา: A = หมู่เกาะสีชัง; B = หมู่เกาะล้าน; C = หมู่เกาะไผ่; D = หมู่เกาะรีน; E = หมู่เกาะคราม; F = หมู่เกาะแสมสาร

การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง


ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
PHYLUM CHORDATA							
SUBPHYLUM UROCHORADATA							
Class ASCIDIACEA	เพรียงหัวหอม						
Order ENTEROGONA							
Suborder APLOUSOBRANCHIA	เพรียงหัวหอมกลุ่ม						
Family Polycitoridae							
1. <i>Eudistoma</i> sp.	เพรียงหัวหอมกลุ่มใส	X	X	X	X	X	X
Family Polyclinidae							
2. <i>Aplidium</i> sp.1	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีครีม	X	X	X	X	X	X
Family Didemnidae							
3. <i>Didemnum moseleyi</i> (Herdman)	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีส้ม	-	X	-	-	-	X
4. <i>Didemnum dorotubu</i> Tokioka	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีน้ำตาล	X	-	X	-	X	X
5. <i>Didemnum</i> sp.1	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีเหลือง	-	X	X	-	-	-
6. <i>Didemnum</i> sp.2	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีขาวเขียว	-	-	-	-	-	X
7. <i>Didemnum</i> sp.3	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีชมพู	X	X	X	X	X	X

ตารางที่ 8 (ต่อ) รายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของเพรียงหัวหอมในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ จังหวัดชลบุรี

ชนิดสิ่งมีชีวิต	ชื่อสามัญ	การแพร่กระจาย					
		A	B	C	D	E	F
8. <i>Didemnum</i> sp.4	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีขาว	-	-	-	-	X	-
9. <i>Atrium robustum</i> Kott	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีขาวเขียว	-	-	-	-	-	X
10. <i>Leptoclinides reticulatus</i> Sluiter	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีเทาปากขาว	-	-	-	-	X	-
11. <i>Lissoclinum</i> sp.	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีเขียว	X	X	X	X	X	X
12. Unidentified Aplousobranchia sp.1	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีม่วงปากลาย	-	-	-	-	-	X
13. Unidentified Aplousobranchia sp.2	เพรียงหัวหอมกลุ่มสีน้ำตาล	-	-	-	-	-	X
<i>Suborder PHLEBOBRANCHIA</i>	เพรียงหัวหอมเดี่ยวใส						
Family <i>Asciidiidae</i>							
14. <i>Ascidia</i> sp.	เพรียงหัวหอมเดี่ยวใส	-	X	-	-	-	X
15. <i>Diazona</i> sp.	เพรียงหัวหอมรวมใส	-	-	-	-	-	X
16. <i>Phallusia</i> sp.1	เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีขาว	X	X	X	X	X	X
17. <i>Phallusia</i> sp.2	เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีขาว	-	X	-	-	-	-
18. <i>Phallusia</i> sp.3	เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีดำ	X	X	X	X	X	X
<i>Order PLEUROGONA</i>							
<i>Suborder STOLIDOBRANCHIA</i>	เพรียงหัวหอมเดี่ยว						
Family <i>Styelidae</i>							
19. <i>Botryllus</i> sp.1	เพรียงหัวหอมรวมสีม่วงลายขาว	-	X	-	-	-	-
20. <i>Botryllus</i> sp.2	เพรียงหัวหอมรวมสีส้ม	-	-	-	-	-	X
21. <i>Botryllus</i> sp.3	เพรียงหัวหอมรวมสีขาว	-	-	-	-	-	X
22. <i>Botryllus</i> sp.4	เพรียงหัวหอมรวมสีเทาขาว	-	-	-	-	-	X
23. <i>Botrylloides leachi</i> (Savigny)	เพรียงหัวหอมรวมสีส้มดำ	-	-	-	-	-	X
24. <i>Eusynstyela</i> sp.	เพรียงหัวหอมรวมสีส้ม	-	-	-	-	-	X
25. <i>Symplegma</i> sp.1	เพรียงหัวหอมรวมสีเหลือง	-	-	-	-	-	X
26. <i>Symplegma</i> sp.2	เพรียงหัวหอมรวมสีม่วงแดง	-	-	-	-	X	-
27. <i>Symplegma</i> sp.3	เพรียงหัวหอมรวมสีเทา	-	X	-	-	-	-
28. <i>Polycarpa</i> sp.1	เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีน้ำตาล	X	X	X	X	X	X
29. <i>Polycarpa</i> sp.2	เพรียงหัวหอมเดี่ยวปากเขียว	X	X	X	X	X	X
Family <i>Pyuridae</i>							
30. <i>Pyura</i> sp.1	เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีส้ม	-	-	-	-	X	-
31. <i>Pyura</i> sp.2	เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีส้มปากลาย	-	X	X	-	X	-
32. Unidentified Pyurid sp.1	เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีม่วง	-	X	-	-	-	-



เพรียงหัวหอมกลุ่มใส, *Eudistoma* sp.



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีครีม, *Aplidium* sp.



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีส้ม, *Didemnum moseleyi*




เพรียงหัวหอมกลุ่มสีน้ำตาล, *Didemnum dorotubu*



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีเหลือง, *Didemnum* sp.1



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีขาวเขียว, *Didemnum* sp.2



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีชมพู, *Didemnum* sp.3



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีขาว, *Didemnum* sp.4

แผ่นภาพที่ 8 เพรียงหัวหอมที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีขาวเขียว, *Atrium robustum*



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีเทาปากขาว, *Leptoclinides reticulatus*



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีเขียว, *Lissoclinum* sp.



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีม่วงปากลาย, Unidentified Aplousobranchia sp.1



เพรียงหัวหอมกลุ่มสีน้ำตาล, Unidentified Aplousobranchia sp.1



เพรียงหัวหอมเดี่ยวใส, *Ascidia* sp.1



เพรียงหัวหอมรวมใส, *Diazona* sp.



เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีขาว, *Phallusia* sp.1


แผ่นภาพที่ 8(ต่อ) เพรียงหัวหอมที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี




เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีขาว, *Phallusia* sp.2



เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีดำ, *Phallusia* sp.3



เพรียงหัวหอมรวมสีม่วงลายขาว, *Botryllus* sp.1



เพรียงหัวหอมรวมสีส้ม, *Botryllus* sp.2



เพรียงหัวหอมรวมสีขาว, *Botryllus* sp.3



เพรียงหัวหอมรวมสีเทาขาว, *Botryllus* sp.4



เพรียงหัวหอมรวมสีส้มดำ, *Botrylloides leachi*



เพรียงหัวหอมรวมสีส้ม, *Eusynstyela* sp.


แผ่นภาพที่ 8(ต่อ) เพรียงหัวหอมที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรี



เพรียงหัวหอมรวมสีเหลือง, *Symplegma* sp.1



เพรียงหัวหอมรวมสีม่วงแดง, *Symplegma* sp.2



เพรียงหัวหอมรวมสีเทา, *Symplegma* sp.3



เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีน้ำตาล, *Polycarpa* sp.1



เพรียงหัวหอมเดี่ยวปากเขียว, *Polycarpa* sp.2



เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีส้ม, *Pyura* sp.1



เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีส้มปากลาย, *Pyura* sp.2



เพรียงหัวหอมเดี่ยวสีม่วง, Unidentified Pyurid sp.1

แผ่นภาพที่ 8(ต่อ) เพรียงหัวหอมที่พบจากการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา

จากการสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบริเวณแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลใน จังหวัดชลบุรี รวม 22 เกาะ จำนวน 40 จุดสำรวจ ระหว่างเดือนมกราคม 2540 – เดือนมีนาคม 2545 โดยการสำรวจใช้วิธีการดำน้ำและสุ่มเก็บตัวอย่างตั้งแต่เขตปะการังพื้นราบจนถึงขอบนอกแนวปะการังในบริเวณจุดสำรวจ พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 428 ชนิด จาก 15 ไฟลัม จำแนกออกได้ดังนี้ ฟองน้ำ (Porifera) 54 ชนิด ในดาเรีย (Cnidaria) 151 ชนิด หวีวุ้น (Ctenophora) 1 ชนิด หนอนตัวแบน (Platyhelminth) 8 ชนิด หนอนริบบิ้น (Nemertea) 1 ชนิด หนอนปล้อง (Annelida) 18 ชนิด หนอนถั่ว (Siphuncula) 1 ชนิด หนอนชอน (Echiura) 1 ชนิด หนอนถ้วย (Entoprocta) 1 ชนิด หนอนเอ็กโกมา (Phoronida) 1 ชนิด ไบรโอซัว (Ectoprocta) 3 ชนิด มอลลัสก์ (Mollusca) 63 ชนิด กุ้ง กั้ง ปู (Arthropoda) 21 ชนิด เอคไคโนเดิร์ม (Echinodermata) 71 ชนิด และเพรียงหัวหอม (Chordata, Urochordata) 32 ชนิด

ความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ดังแสดงในตารางที่ 9 พบว่า หมู่เกาะล้านพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมากที่สุดจำนวน 285 ชนิด รองลงมาคือ หมู่เกาะไผ่ 258 ชนิด หมู่เกาะแสมสาร 229 ชนิด หมู่เกาะคราม 218 ชนิด หมู่เกาะสีชัง 170 ชนิด และหมู่เกาะรีน 132 ชนิดตามลำดับ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากว่า หมู่เกาะล้านมีพื้นที่แนวปะการังค่อนข้างมากและแนวปะการังสามารถพัฒนาการได้ดีทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ในขณะที่หมู่เกาะอื่นๆ ทางด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แนวปะการังจะพัฒนาการได้ไม่ค่อยดีนัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงชนิดสัตว์ที่พบ แต่ละหมู่เกาะยังคงมีถิ่นอาศัยย่อยเฉพาะให้กับสัตว์ทะเล ซึ่งพบว่าสัตว์หลายชนิดจะพบเฉพาะที่เท่านั้นไม่มีการแพร่กระจายออกไปตามหมู่เกาะต่างๆ เช่น ฟองน้ำหูช้าง, *Cliona patera*, ปะการังอ่อนต้นวุ้น, *Dendronephthya* sp.3 ที่อาศัยบริเวณพื้นที่ลาดชันมากในบริเวณขอบนอกของแนวปะการัง พบเฉพาะที่หมู่เกาะล้านเท่านั้น ในขณะที่บริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันยังไม่พบฟองน้ำชนิดนี้หรือเพรียงหัวหอมพบว่ามี ความหลากหลายมากที่สุด บริเวณหมู่เกาะแสมสารมักจะพบเป็นเขตน้ำตื้นและมีสาหร่ายทะเลอาศัยอยู่ด้วย หรือบริเวณที่เป็นเกาะขนาดเล็ก เช่น เกาะหินขาวของหมู่เกาะรีน เราจะพบความหลากหลายของกัลปังหาค่อนข้างมาก รวมทั้งพบดาวเปราะ, *Ophiomastix sexradiata* ซึ่งพบเฉพาะหมู่เกาะรีนต้องการพื้นที่ทะเลที่เป็นก้อนกรวดหินมนขนาดใหญ่ ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ ที่เป็นกรวดหินขนาดเล็กลงไปแต่ก็ไม่พบดาวเปราะชนิดนี้เป็นต้น

ในการศึกษครั้งนี้มีข้อสังเกตคือ ถึงแม้ว่าหมู่เกาะแสมสารจะมีพื้นที่แนวปะการังน้อยกว่าหมู่เกาะล้าน หมู่เกาะไผ่ และหมู่เกาะคราม แต่ก็พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังค่อนข้างมาก อันแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศแนวปะการังในบริเวณนี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด และจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบริเวณนี้อาจจะเป็นชุมชนเชื่อมต่อของระบบนิเวศวิทยาทางทะเลระหว่างอ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่มีลักษณะเป็นทะเลเปิด เช่นหมู่เกาะเสม็ด ของจังหวัดระยองและหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราด

ตารางที่ 9 ความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบในแนวปะการังจำแนกตามหมู่เกาะต่างๆในจังหวัด
 ชลบุรี: พื้นที่ศึกษา: A=หมู่เกาะสีชัง; B=หมู่เกาะล้าน; C=หมู่เกาะไผ่; D=หมู่เกาะรี; E=หมู่เกาะคราม; F=หมู่เกาะแสมสาร

ชนิดสิ่งมีชีวิต	หมู่เกาะ					
	สีชัง	ล้าน	ไผ่	รี	คราม	แสมสาร
1. ฟองน้ำทะเล (Phylum Porifera)	26	38	25	20	34	29
2. ไนดาเรีย ((Phylum Cnidaria)	58	111	103	33	69	77
3. หวีวุ่น (Phylum Ctenophora)	1	1	1	1	1	1
4. สัตว์กลุ่มหนอนทะเล (Marine Worms)	6	20	14	4	8	14
5. สัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลต (Lophophorates)	1	1	2	2	1	2
6. หอยและหมีก (Phylum Mollusca)	28	42	40	29	39	32
7. อาร์โทรพอด (Phylum Arthropoda)	3	7	12	4	7	8
8. เอคไคโนเดิร์ม (Phylum Echinodermata)	38	49	50	31	45	44
9. เพรียงหัวหอม (Subphylum Urochordata)	9	16	11	8	14	22
รวม	170	285	258	132	218	229

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบในการศึกษานี้ ส่วนมากเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปในแนวปะการังในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็จะมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดที่พบว่ามี การแพร่กระจายทางทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในอ่าวไทยตอนบนยังคงมีความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ทะเลอยู่มากพอสมควรและน่าจะเป็นเขตชุมชนเชื่อมต่อ (Ecotone) ของทั้งสองมหาสมุทรนี้ นอกจากนี้จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบฟองน้ำบางชนิดที่คาดว่าจะ เป็นฟองน้ำชนิดใหม่ของโลกและบางชนิดอาจจะพบว่าเป็นฟองน้ำที่ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบในบริเวณทะเลจีนใต้ อีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ต้องล่าช้ากว่ากำหนดคือ การขาดเอกสารอ้างอิงและผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาในการจำแนกชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ไม่มีผู้ทำการศึกษา มากนัก คณะผู้วิจัยจึงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อร้องขอเอกสารอ้างอิง เปรียบเทียบตัวอย่าง คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจำแนกชนิด สัตว์ ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำการจำแนกชนิดสัตว์ตัวอย่างที่พบได้ทั้งหมดหรือการจำแนกชนิด อาจจะไม่ได้ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งก็อาจจะเสนอในรายงานไว้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานของระบบนิเวศแนวปะการัง ในจังหวัดชลบุรีและนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆที่สนใจมาทำการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบในแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี ซึ่งพบความหลากหลายจำนวนค่อนข้างมาก แนวทางในการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ความพยายามที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เอาไว้ เช่น การติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานภาพของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสัตว์ ความสัมพันธ์ทั้งภายในประชากรและระหว่างสัตว์ทะเลกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์ชนิดเด่น เช่น ในดาเรีย และเอคไคโนเดิร์ม เป็นต้น รวมทั้งสัตว์ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ฟองน้ำ ทากทะเล ไบรโอซัว เป็นต้น
2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่ทำการสำรวจในช่วงเวลากลางวันเกือบทั้งหมดทำให้การสำรวจไม่ครอบคลุมสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มอาร์โทรพอด เอคไคโนเดิร์ม หอยและหมึก ดังนั้นควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ออกหากินในเวลากลางคืน
3. ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ การขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหาไม่เฉพาะระดับประเทศเท่านั้นแต่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องไปถึงระดับโลก แนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนานักวิชาการให้มีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาสัตว์ทะเลที่มีผู้ทำการศึกษากันน้อย เช่น ในดาเรียในกลุ่มกัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน สัตว์กลุ่มหนอนทะเล สัตว์กลุ่มโลโฟฟอร์เลต อาร์โทรพอดในแนวปะการัง และเพรียงหัวหอม เป็นต้น

บรรณานุกรม

- กิติธร สรรพานิช. 2527. การศึกษาชนิดของหอยตามแนวปะการังบริเวณชายฝั่งบ้านช่องแสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี. ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 77 หน้า.
- กิติธร สรรพานิช. 2538. การศึกษาอนุกรมวิธานของหอยทะเลฝาคู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรีและระยอง). เอกสารงานวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. เลขที่ 62/2538. 57 หน้า.
- โครงการจัดการทรัพยากรปะการัง. 2542. แผนที่แนวปะการังในน่านน้ำไทย เล่มที่ 1 อ่าวไทย. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 284 หน้า.
- ชินวัฒน์ พัทธกาสาลี. 2523. อนุกรมวิธานของปูเสฉวนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 147 หน้า.
- ตรงค์ ยิ่งชล. 2540. ชนิดของปะการังแข็งที่พบบริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2540. มหาวิทยาลัยบูรพา. 32 หน้า.
- ทรงวุฒิ จันทะรัง. 2545. โครงสร้างชุมชนของปะการังแข็ง บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2545. มหาวิทยาลัยบูรพา. 132 หน้า.
- ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์. 2537. สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ณ โรงแรมเมอร์ลิน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 14 หน้า.
- ลักขณา กลินณศักดิ์. 2508. เอกโคโคไนด์บางชนิดที่เก็บรวบรวมได้ในอ่าวไทย. ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 67 หน้า.
- นิจนาจ ชัยธนาวิสุทธ์, ศิริญา กฤษณะพันธุ์, ธรรมศักดิ์ ยี่มิน, สุเมตต์ ปุจฉาการ และ Jane Fromont. 2545. ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดชลบุรี-ตราด). ใน: รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2545, วิสุทธ์ ไบไม้ และรังสิมา ตันตะเลขา (บรรณาธิการ). หน้า 148-155. โครงการ BRT. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ กรุงเทพฯ.
- พะยอม ข่อยงาม. 2525. การศึกษาชนิดของปูน้ำเค็มที่เก็บได้จากท่าเทียบเรือประมงในอ่าวไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 196 หน้า.
- วรุณพร จิรวัฒน์. 2528. การศึกษาอนุกรมวิธานของปะการังชนิดแข็งที่รวบรวมได้จากอ่าวไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 297 หน้า.
- วิญญัติ มั่นทะจิตร. 2537. สภาพทรัพยากรปะการังบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 138 หน้า.

- วิสุทธิ ใบไม้. 2538. สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กรุงเทพฯ. 254 หน้า.
- วัฒนา ไวยนิยา. 2527. การศึกษาชนิดของปลาฉลามบริเวณหน้าอ่าวพัทยาและเกาะช้าง. รายงานวิชาการที่ สจ/26/2 ฝ่ายสถานีวิจัยประมงทะเล กองประมงทะเล กรมประมง. 16 หน้า.
- สมชาย ศรีพงษ์. 2528. การสำรวจชนิดของปูที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ Coelenterates Sponges, Mollusks บางชนิด บริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
- สมพร ศรียากกร. 2513. การศึกษาอนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มที่ได้จากการสำรวจร่วมไทย-เคนมาร์ค ครั้งที่ 5 ทางด้านชีววิทยาทางทะเล บริเวณฝั่งตะวันตกของไทยในมหาสมุทรอินเดีย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 144 หน้า, 42 แผ่นภาพ.
- สมาน ศรีสัญญาและคณะ. 2523. แบบแผนการแพร่กระจายและสถานะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องบางประการของปะการัง เกะถัน จังหวัดชลบุรี. การวิจัยสถานะแวดล้อมในอ่าวไทย และภาคตะวันออก โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 46 หน้า.
- สมาน ศรีสัญญา และคณะ. 2524. เขตแนวปะการังเกาะถัน ชลบุรี. การวิจัยสถานะแวดล้อมในอ่าวไทยและภาคตะวันออก โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 25 หน้า.
- สมาน ศรีสัญญา และคณะ. 2525. การสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง เกาะถัน ชลบุรี. การวิจัยสถานะแวดล้อมในอ่าวไทย และภาคตะวันออก โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 42 หน้า.
- สมศักดิ์ จุลละสร. 2537. ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ณ โรงแรมเมอร์ลิน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, 7 หน้า.
- สรวิศ เผ่าทองสุข และคณะ. 2536. สภาพของแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี. ในประมวลประชุมวิชาการเรื่อง ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำครั้งที่ 3, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 317 - 382.
- สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัยและคณะ. 2527. สภาพปัจจุบันของปะการังของเกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 21หน้า.
- สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัยและคณะ. 2528. สภาพปัจจุบันของปะการังบริเวณเกาะขอม และเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 23หน้า.
- สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย. 2537. สถานการณ์ทรัพยากรแนวปะการังในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก. โครงการศึกษานิเวศวิทยาแนวปะการัง มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสารโรเนียว 12 หน้า.
- สุรินทร์ มัจฉาชีพ. 2522. การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี. การวิจัยสถานะแวดล้อมในอ่าวไทยและภาคตะวันออก,โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 57 หน้า.

- สาริต โกวิทวที. 2531. การศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้ำเค็ม กุ้งกระดาน และกุ้งมังกร บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย. รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 80 หน้า.
- สาริต โกวิทวที. 2534. การศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้งทะเลและกุ้งตักแดนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 141 หน้า.
- สำนักงานจังหวัดชลบุรี. 2538. แนะนำจังหวัดชลบุรี. Publishing House Ltd., Part. กรุงเทพฯ. 133 หน้า.
- สุรินทร์ มัจฉาชีพ. 2523. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 344 หน้า.
- สุเมตต์ ปุจฉาการ. 2541. การศึกษาอนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มบริเวณชายฝั่งตะวันออก. รายงานการวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. 109 หน้า 8 แผ่นภาพ.
- สุเมตต์ ปุจฉาการ อารมณ มุจรินทร์ และพิชัย สนแจ้ง. 2543. ปลิงทะเลในอันดับ Aspidochirotida ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะล้านและหมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี. การเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38. 1-4 กุมภาพันธ์ 2543.
- Abbott, R.T. and S.P. Dance. 2000. Compendium of sea shells. Odyssey Publishing, USA. 411 p.
- Arnold, P.W. and R.A. Birtles. 1985. Soft-Sediment Marine Invertebrates of Southeast Asia and Australia: A Guide to Identification. S.A. English. (eds.). Australian Institute of Marine Science, Townsville, 272 p.
- Bergquist, P.R. 1965. Sponges of the Palua Islands I. *Pacific Science*, 19(2):123-204.
- Cannon, L.R.G. & H. Silver. 1986. Sea cucumber of Northern Australia. Queensland Museum, South Brisbane, Australia : 60 p. 11 figs..
- Chou, L.M., S. Sudara, V. Manthachitra, R. Moredee, A. Snidvongs and T. Yeemin. 1991. Temporal Variation in a Coral Reef Community at Pattaya Bay, Gulf of Thailand. *Environmental Monitoring and Assessment*. 19: 295-307.
- Clark, A.M & F.W.E. Rowe. 1971. Monograph of shallow-water Indo-West Pacific Echinoderms. Trustees of the British Museum (Natural History), London: 238 p., 100 fig., 31 pls..
- Colin, P.L. and C. Arneson. 1995. Tropical pacific invertebrates: A field guide to the marine invertebrate occurring on tropical Pacific coral reefs, seagrass beds and mangroves. Coral Reef Press, USA. 296 p.
- Dance, S.P. 1974. The collector's encyclopedia of shells. McGraw-Hill Book Company, New York, 288 p.
- English, S., C. Wilkinson and V. Baker. 1994. Survey manual for tropical marine resources. Australian Institute of Marine Science, Townsville. 368 p.
- Fautin, D.G. and G.R. Allen. 1992. Field Guide to Anemonefishes and their host sea anemones. Western Australian Museum, Perth. 157 p.

- Fauchald, K. 1977. The polychaete worms: Definition and key of the Orders, Family and Genera. Natural History Museum of Los Angeles County. 188 p.
- George, J.D. and J.J. George. 1979. Marine Life: An illustrated Encyclopedia of invertebrate in the sea. John Wiley & Sons, New York. 288 p.
- Gibson, R. 1997. Chapter 16: Nemertean (Phylum Nemertea). pp. 905-975. In S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.
- Gosliner, T.M., D.W. Behrens and G.C. Williams. 1996. Coral reef animals of the Indo-Pacific: Animal life from Africa to Hawaii exclusive of the Vertebrates. Sea Challengers, Monterey, California. 314 p.
- Guille, A., P. Laboute & J.-L. Menou. 1986. Guide des étoiles de mer, oursins et autres échinodermes du lagon de Nouvelle-Calédonie. *OSTROM*, Paris. 238 p.
- Hoggett, A.K. 1991. The Genus *Macrophiothrix* (Ophiuroidea: Ophiotrichidae) in Australian Waters. *Invertebr. Taxon.* 4: 1077-1146, 36 figs.
- Hooper, J.N.A. 1997. Sponge Guide. Queensland Museum, Australia. 143 p.
- Hooper J.N.A. and J.A. Kenedy. 2000. Annotated checklist of Sponges (Porifera) of the South China Sea Region. *The Raffle Bulletin of Zoology*, Supplement No. 3: 125-207.
- Hooper J.N.A. and R.W.M. Van Soest. 2002. Systema Porifera. Vol. I & II. Kluwer Publisher Company, UK. 1708 p.
- Kelly-Borges, M. & S. Pompani. 1992. The simple fool's guide to sponge taxonomy. Sponge Taxonomy Workshop, Harbor Branch Oceanographic Institution, Inc. 106 p.
- Knudsen, J.W. 1967. *Trapezia* and *Tetralia* (Decapoda, Brachyura, Xanthidae) as Obligate Ectoparasites of Pocilloporid and Acroporid Corals. *Pacific Science*, 22: 51-57.
- Kott, P. 1997. Chapter 23: Tunicates (Sub-Phylum Tunicata). pp. 1092-1255. In S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.
- Monniot, C., F. Monniot and P. Laboute. 1991. Coral Reef Ascidians of New Caledonia. *OSTROM*, Paris. 248 p.
- Ono, A. 1999. Opisthobranchs of Kerama Islands. TBS-Britannica Co., LTD., Japan 183 p.
- Shepherd, S.A. 1997. Chapter 18: Phoronids (Phylum Phoronida). pp. 993-998. In S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.

- Siriratanachai, S., T. Boonphakdee and N. Singkoravat. 1994. An Approach to the Rehabilitation of Coral Reef with Coral Transplantation in the Eastern Coast of Thailand, p. 193. *In* S. Sudara *et. al.* (eds.) Proceeding in ASEAN-Australia Third Symposium on Living Coastal Resources, 16-20 May 1994. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
- Swenne C., R.G. Moolenbeek, N. Ruttanadakul, H. Hobbelink, H. Dekker and S. Hajisamae. 2001. The molluscs of the Southern Gulf of Thailand. *Thai Studies in Biodiversity* 4: 210 p.
- Tokioka, T. 1967. Pacific Tunicata of the United States National Museum. *United States National Museum Bulletin* 251. Smithsonian Press. 247 p.
- Veron, J.E.N. 1986. Corals of Australia and Indo-Pacific. Angus and Robertson Publishing. 644 p.
- Veron, J.E.N. 2000. Corals of the World Vol. I-III. Angus and Robertson Publishing.
- Wasson, K. and S.A. Shepherd. 1997. Chapter 17: Nodding heads (Phylum Kamptozoa Or Entoprocta). pp. 975-992. *In* S.A. Shepherd and M. Davies (eds.), Marine Invertebrates of Southern Australia Part III. South Australia Research and Development Institute, South Australia.
- Wells, F.E. and C.W. Bryce. 1993. Sea slugs and their relatives of Western Australia. Western Australian Museum, Australia. 184 p.
-