



รายงานฉบับเทียบเคียง (ปีที่ 1)

ชื่อโครงการวิจัย

การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่งจากแปลงเลี้ยงใน
จังหวัดชลบุรีและการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพานิชย์

(Epidemiology and treatment of parasitic flatworm infestation in
marketed green mussel (*Perna viridis* Linnaeus) from sea-farms in Chonburi
Province)

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศิริ บาร์เนท

ผู้ร่วมวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กเชนทร เฉลิมวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์

อาจารย์ ดร. อาดุลย์ มีพูล

หน่วยงานที่สังกัด
การแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

16 ส.ค. 2554

29 15 67

ทุนสภာวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553

BK0176739

เริ่มบริการ

18 ต.ค. 2554

บทคัดย่อ

การสำรวจความชุกของหนอนตัวแบนปรสิตและการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่นิเวศเลี้ยงแบบไม่ไผ่ ตามชายฝั่งจังหวัดชลบุรีที่บางทราย อำเภอมือขลุ่ย อ่างศิลา และที่คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ และการเลี้ยงแบบแพแขวนพวงหอยที่ บางพระ ศรีราชา และแหลมท้าวเทวา พบว่า หนอนตัวแบนมีการระบาดจากการเลี้ยงแบบแพมากกว่าแบบไม่ไผ่ ทั้งนี้หนอนจะอาศัยในหอยขนาดใหญ่ที่ยังไม่เก็บขายจากแพและจะแพร่กระจายไปยังพวงหอยรุ่นขนาดเล็ก โดยหอยตัวใหญ่พบหนอนในช่วงเดือนธันวาคม 2552 (ปริมาณหนอนประมาณ 50-400 ตัวต่อหอยแมลงภู่นิเวศ 30 ตัว) และไปก่อการระบาดในหอยรุ่นเล็กในช่วงเดือน มกราคม 2553 (ปริมาณหนอนประมาณ 50-300 ตัวต่อหอยแมลงภู่นิเวศ 30 ตัว) เดือนกุมภาพันธ์ 2553 (ปริมาณหนอนประมาณ 50-700 ตัวต่อหอยแมลงภู่นิเวศ 30 ตัว) เดือน มีนาคม 2553 (ปริมาณหนอนประมาณ 200-1200 ตัวต่อหอยแมลงภู่นิเวศ 30 ตัว) การเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่นิเวศดีที่สุดที่แหลมท้าวเทวาแต่มีการระบาดของหนอนรุนแรงคล้ายกับที่ศรีราชาและบางพระ โดยค่าดัชนีสุขภาพเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อหอยแมลงภู่นิเวศต่อน้ำหนักหอยทั้งหมดมีค่าสูงกว่า 25.0% สอดคล้องกับที่คลองด่าน และ อ่างศิลา และหอยมีการเจริญเติบโตไม่ดีคือที่บางทรายและอำเภอมือขลุ่ย โดยค่าดัชนีสุขภาพเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อหอยแมลงภู่นิเวศต่อน้ำหนักหอยทั้งหมดมีค่าต่ำกว่า 25.0% พบอัตราการตายสูงสุดของหอยตัวเป็นและตัวตายในแต่ละพวงหอยในช่วงเดือนเมษายน 2553 ประมาณ 20-25% ที่แหลมท้าวเทวาและศรีราชา คุณภาพน้ำทะเลทุกค่าส่วนใหญ่ได้มาตรฐานการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่นิเวศทั้ง 7 สถานี

Abstract

We report on the findings from a survey of parasitic flatworms Turbellaria in relation to growth of bamboo stake farmed green mussels at Bang Sai, Muang and Ang Sila in Chonburi Province as well as Klong Dan in Samut Prakarn provinces in conjunction with raft cultured green mussels in Laem Tao Thewa, Bangpra and Sri Racha in Chonburi Province. It is concluded that the parasitic flatworms are more prevalent on the raft culture operations with high flatworm densities found in large mussels that are awaiting harvest. These mussels seem to be the source for infection to smaller mussels. Infection in the large mussels was found in December (2009) at average densities of 50-400/30 mussels, leading to infection of small mussels at average densities of 50-300/30 mussels in January (2010), 50-700/30 mussels in February and 200-1200/30 mussels in March (2010). Growth of mussels is highest at Laem Tao Thewa but high flatworm infections occur similar to farming areas in Sri Racha and Bang Phra. The percentage health to body mass of green mussels was lower than 25% with corresponding mortalities highest in April (2010) at 20-25% at Laem Tao Thewa and Sriracha. Water quality monitored at 7 stations covering the study areas was within national standards set by the Royal Thai government for coastal aquaculture.

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	4
วิธีการทดลอง	6
ผลการทดลอง	9
เอกสารอ้างอิง	18

บทนำ

หอยแมลงภู่เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง และจัดอยู่ในประเภทอาหารทะเลที่รู้จักกันทั่วไปเนื่องจากมีรสชาติดีนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่แห่งหนึ่งของประเทศไทย เช่น เมืองชลบุรี บางทราย บางแสน อ่างศิลา บางพระ ศรีราชา สุรศักดิ์มนตรี และแหลมท้าวเทว บริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีหอยชุมชุมมาก พื้นที่ที่เลี้ยงกันมากและให้ผลผลิตสูง แต่ปัจจุบันได้มีการระบาดของหนอนตัวแบนที่เป็นปรสิตทำให้ผลผลิตหอยแมลงภู่ลดลงอย่างมาก จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย ในจังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่เลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน 833.15 ไร่ รายงานผลผลิตปี 2548 จำนวน 19,201 ตัน เฉลี่ย 24.5 ตัน/ไร่ (ศูนย์สารสนเทศกรมประมง, 2548) ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีหนอนตัวแบนปรสิตที่กินหอยเป็นอาหารระบาดอย่างหนักในแปลงหอยแมลงภู่ การระบาดดังกล่าวมีผลต่อการผลิตหอยโดยตรงละยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปสู่อาชีพข้างเคียง โดยเฉพาะการแกะเนื้อหอยเพื่อการแปรรูป

อุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่างศิลาก่อให้เกิดอาชีพแกะเนื้อหอยแมลงภู่ขายแบบสดและแบบตากแห้ง การแกะเนื้อหอยแมลงภู่ขายแบบสดและแบบตากแห้ง (ภาพที่ 1) นอกจากจะทำให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ยอดแมลงภู่ขายทั้งตัวมีราคาตกต่ำ ในกรณีนี้หากหนอนตัวแบนปรสิตมีการระบาดในช่วงดังกล่าวผู้ประกอบการจะขาดทุนในการแกะเนื้อหอย เพราะหอยจะพอมทำให้สัดส่วนเนื้อหอยต่อเปลือกมีเพียง 1 ใน 3 ส่วน แทนที่จะเป็นเนื้อ 2 ใน 3 ส่วนเมื่อหอยมีสุขภาพแข็งแรงดี และเจริญเติบโตตามปกติ

การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในปัจจุบันเป็นแบบแพด้วยการใช้ทุ่นลอยแตกต่างจากแบบดั้งเดิมคือการปักหลักด้วยไม้ไผ่ซึ่งยังพบได้ที่บริเวณอ่างศิลา และ บางทราย และ ลูกหอยแมลงภู่แบบพวงที่มีการซื้อขายเชิงพาณิชย์ เป็นลูกหอยที่มีขนาดความยาว 3 เซนติเมตร อายุประมาณ 3 เดือน ความยาวพวงหอย 2.5 – 3 เมตร จำนวนลูกหอยพวงละ 2,000 – 2,500 ตัว (ภาพที่ 2 ก และ ข) จะขายกันพวงละ 12 บาท (สอบถามเมื่อ มีนาคม 2551) แหล่งที่มีการขายพวงหอยแบบเชือกเป็นการค้ามีแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือที่อำเภอ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ลูกหอยจากบริเวณนี้มีการส่งขายไปหลายจังหวัดในประเทศไทย ดังนั้นการปนเปื้อนของหนอนตัวแบนปรสิตในลูกหอยแมลงภู่แบบพวงนี้ทำให้แหล่งรับซื้อลูกหอยทั่วประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่ในแหล่งเลี้ยงนั้นได้ และแพร่กระจายในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลแหล่งใหม่ และการระบาดของหนอนปรสิตจะรุนแรงขึ้นเมื่อมีการสะสมของตะกอนดินจากแปลงหอย (จิตพร และคณะ 2004) และก่อผลเชิงลบต่อการพัฒนาเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

สืบเนื่องจากปัญหาการตายของหอยแมลงภู่เลี้ยง และหอยพอมในบางช่วง ทำให้มีผลกระทบสร้างความเสียหายด้านผลผลิต เมื่อปี พ.ศ. 2547 มีการพบหนอนตัวแบนปรสิตระบาดในแปลงหอยแมลงภู่ที่สำรวจที่อำเภออ่างศิลา ศรีราชาและบางละมุง ปริมาณของหนอนที่พบสูงถึง 500 ตัวต่อหอยแมลงภู่ 1 ตัว แต่หนอนตัวแบนปรสิตเหล่านี้จะอ่อนแอและตายในน้ำที่มีความเค็มต่ำ (จิตพร และ

คณะ 2004) และเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2549 สมาคมประมงศรีราชาได้แจ้งให้เทศบาลเมืองศรีราชาทราบ ว่าหอยแมลงภู่มีการตายใน แปลงเลี้ยงแบบแพในอ่าวศรีราชา ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจึงให้ทุนวิจัยแก่นักมหาวิทยาลัยบูรพา หอยแมลงภู่มิ (สำรวจและวิจัยโดย ผศ. ดร. ปภาศิริ บาร์เนท และ ผศ. ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์, 2550) ทำการศึกษาหาสาเหตุการตายของหอย ผลการสำรวจได้พบหนอนตัวแบนปรสิตปริมาณมาก โดยพบว่ามีความสัมพันธ์กับฤดูกาลที่มีผลจากความเค็มน้ำทะเลที่สูงขึ้นในช่วงดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้จัดการอบรมเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่มิในอำเภอศรีราชา จำนวน 60 คน ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่มิในเขตอื่นๆ ของจังหวัดชลบุรีก็ควรได้รับความรู้กัน อย่างทั่วถึง เพื่อให้ทราบวิธีการแก้ปัญหาเมื่อมีการระบาดของหนอนตัวแบนที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่มิลดลง (หอยผอม น้ำหนักลด) ส่วนการป้องกันเบื้องต้นคือหาแหล่งขายลูกหอยที่มีหนอนตัวแบนระบายน้อย เช่น คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น แต่เนื่องจากอ่างศิลา เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหอยแมลงภู่มิและเป็นแหล่งใหญ่ที่การจำหน่ายลูกหอยพวง ทำให้ เป็นแหล่งที่มีการระบาดของรุนแรงของหนอนตัวแบนปรสิต ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะมีการจำลองและทดสอบการกำจัดหนอนตัวแบนที่อาศัยอยู่ตามพวงหอยในห้องปฏิบัติการด้วยการปรับลดความเค็ม น้ำทะเล (O'conner and Newman, 2001) เพื่อประยุกต์ไปใช้จริงในการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่มีการขายเป็นการค้า

การศึกษาผลกระทบการระบาดของหนอนตัวแบนต่อหอยแมลงภู่มิที่เลี้ยงในแปลงเลี้ยงหอยหลายแหล่งตามชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีอย่างจริงจัง สามารถช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางชีววิทยา วงจรชีวิตของหนอนตัวแบน การก่อโรค ชนิดของหนอนในสถานที่ต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนอนปรสิตกับหอยแมลงภู่มิ ช่วงเวลาการระบาด ปัจจัยการเพิ่มและลดปริมาณของหนอนปรสิตในหอยแมลงภู่มิ เป็นต้น ทำให้สามารถจัดแผนการจัดการในแก้ปัญหาการระบาดของหนอนตัวแบนต่อหอยแมลงภู่มิอย่างมีระบบและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ระบบภูมิคุ้มกันของหอยแมลงภู่มิที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ระหว่างที่มีปรสิตเข้าอาศัย เป็นอีกคำถามหนึ่งที่มีความสำคัญ ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในหอยเป็นตัวชี้วัดการไม่สามารถกำจัดหนอน และมีผลต่อทำให้หอยอ่อนแอจนผอม และ ถึงขั้นตายหลุดจากไม้หลักหรือเชือกพวงได้ หรืออย่างไร

การศึกษาระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่มิจากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรี และการกำจัดหนอนดังกล่าวจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์จะช่วยพัฒนาศักยภาพต่อผู้ประกอบการอาชีพประมง ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู่มิ ทั้งยังปกป้องสัตว์น้ำอื่นๆ เนื่องจากวงจรชีวิตหนอนตัวแบนอาศัยในหลายเจ้าบ้าน และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องตามแผนนโยบายเศรษฐกิจในการสร้างมูลค่าผลผลิตทางประมง และ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยคือ

เพื่อหาความชุกและความหนาแน่นของหอยนางรมในลูกหอยแบบพวงและหอยแมลงภู่
ในแหล่งเลี้ยงแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรี



ภาพที่ 1 ผู้ประกอบการแกะเนื้อหอยแมลงภู่ ขายแบบสดและแบบตากแห้ง



ก



ข


ภาพที่ 2 ลูกหอยแมลงภู่แบบพวงถูกย้ายโดยเรือจากแปลงเลี้ยงในทะเลบริเวณอ่างศิลา (ก) เพื่อรอ
ขนส่งทางรถยนต์ (ข)

วิธีการทดลอง

1. รวบรวมข้อมูลฟาร์มและการเลี้ยงหอยแมลงภู่ตามแนวชายฝั่ง ดังนี้

จากการสืบค้นข้อมูลจำนวนฟาร์มและพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่ตามแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2549 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนแปลงและพื้นที่เลี้ยง ประมาณ 2-3 เท่า แสดง
ดังตารางที่ 1

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2552 โดยประมงจังหวัดชลบุรี (ข้อมูลสอบถาม) ในพื้นที่เมืองชลบุรี
และ อ่างศิลา มีจำนวน 275 แปลง และพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน 3178 ไร่ แสดงดังภาพที่ 3 ส่วน
บางพระ ศรีราชา ยังไม่มีการสำรวจพื้นที่เลี้ยงแต่มีสมาชิกรวมกันประมาณ 60 ราย และ แหลมท้าวทวา
มีสมาชิกเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน 32 ราย ในพื้นที่เลี้ยงนอกชายฝั่ง 4 ตารางกิโลเมตร



ภาพที่ 4 แผนที่เก็บจุดตัวอย่างแปลงเลี้ยงหอยตามแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ

3. การสำรวจความชุกชุมและความหนาแน่นของหอนตัวแบนในหอยแมลงภู่ มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

- เก็บหอยแมลงภู่ทั้งพวงจากทะเล ทำการวัดความยาวและชั่งน้ำหนักหอย (รวมและไม่รวมเปลือก) เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ในรอบหนึ่งของการเลี้ยง ทำการนับปริมาณหอนตัวแบนอาศัยอยู่บริเวณเหงือกโดยตรวจจากเหงือกหอยแมลงภู่ สุ่มจากพื้นที่ของเหงือกเท่ากันทุกครั้งทั้งกว้าง X ยาว การวินิจฉัยเพื่อตรวจหอนตัวแบน หาค่าความชุก (prevalence) และค่าความหนาแน่น (intensity of infection) โดยทำการผ่าตัดหอยแมลงภู่โดยใช้เข็มเข็ม และคีมคีบจับเปลือกหอยออก หลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดเหงือกหอยด้านซ้ายบริเวณกึ่งกลางของเหงือก โดยหันด้าน umbo ขึ้นด้านบน ขนาดประมาณ 5 X 5 ตารางมิลลิเมตร ใช้คีมคีบหนีบดึงเอาส่วนของเหงือกออกมา เมื่อได้เนื้อเยื่อบริเวณเหงือกที่ต้องการแล้ว นำมาวางบนสไลด์ แล้วใช้หลอดหยด หยดน้ำทะเลประมาณ 1-2 หยด ที่เหงือก ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ (cover glass) ที่เตรียมไว้ ใช้แรงกดทับเล็กน้อย นำมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยายต่ำ (4X) เพื่อสำรวจหาหอน เมื่อพบหอนจะใช้กำลังขยายที่สูงขึ้น (10X หรือ 40X) เพื่อ ดูสัณฐานวิทยา พร้อมบันทึกภาพ บันทึกค่าเปอร์เซ็นต์ ความชุก และ ค่าความหนาแน่น พร้อมทั้งบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
- สถานที่เก็บข้อมูลและระยะเวลาในการสำรวจความชุกชุมและความหนาแน่นของหอนตัวแบนในหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่ การเก็บข้อมูลทุกๆ เดือน ในระยะ 1.5 ปี จากแหล่งฟาร์มเลี้ยงหอยแมลงภู่ทั้งแบบแพและไม้ไผ่ปัก บริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรี 5 แหล่งคือ เมืองชลบุรี บางแสน อ่างศิลา ศรีราชา และ แหลมหัวเวา และ อีก 1 แหล่งจากบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนสำรวจในลูกหอยพวงเก็บข้อมูลทุก ๆ เดือน นาน 3 เดือน ช่วงที่มีการขายเชิงการค้าจากแหล่งขายบริเวณอ่างศิลา และ คลองด่าน ทั้งนี้จะมีการตรวจคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณที่ทำการเก็บ

ตัวอย่างหอยแมลงภู่น้ำจืดได้แก่ ค่าการละลายของออกซิเจน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเค็ม ความขุ่น อุณหภูมิ

- อัตราการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่น้ำจืดจะแสดงสัดส่วนน้ำหนักรวมเปลือก (กรัม) และความยาว (ซม.) ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน ส่วนการสูญเสียน้ำหนักของหอยจะแสดงสัดส่วนน้ำหนักเนื้อหอยทั้งตัวคำนวณตาม Condition Indices (C.I.) assessment ของ Danvenport and Chen (1987) ระหว่างหอยที่พบหนองแข็งปริมาณ (ตัว) กับที่ไม่พบหนอง
- การแสดงรูปร่างลักษณะของหนองตัวแบนหอยแมลงภู่น้ำจืดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา หนองตัวแบนที่ระบาศในหอยแมลงภู่น้ำจืดจะรวบรวมจากจากแหล่งฟาร์มเลี้ยงหอยแมลงภู่น้ำจืดทั้งแบบแพและไม้ไผ่ปักบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรี 4 แหล่งคือ เมืองชลบุรี อ่างศิลา บางแสน ศรีราชา และ แหลมหัวเวา และบริเวณคลองด้านจังหวัดสมุทรปราการ นำตัวอย่างหนองตัวแบนและไข่หนอง มาส่องสด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา ทำการวัดขนาด ศึกษาโครงสร้างภายใน พร้อมทั้งบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน

ผลการทดลอง

รูปแบบการเลี้ยงหอยแมลงภู่น้ำจืดจาก 7 สถานีตามชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี

1. การเลี้ยงที่อำเภอเมืองชลบุรี

หอยแมลงภู่น้ำจืดแบบพวงมีการใช้ไม้ไผ่ทำแนวแพ ให้หอยแมลงภู่น้ำจืดแบบเชือกแขวนบนไม้ไผ่ ขนาดของแนวมีความกว้าง 5-6 เมตร ยาว 60-80 เมตร ความยาวเชือกหอยแมลงภู่น้ำจืด ความยาวตั้งแต่ 1.5-2.0 เมตร

2. การเลี้ยงที่บางทราย

หอยแมลงภู่น้ำจืดแบบพวงมีการใช้ไม้ไผ่ทำแนวแพ ให้หอยแมลงภู่น้ำจืดแบบเชือกแขวนบนไม้ไผ่ ขนาดของแนวมีความกว้าง 5-6 เมตร ยาว 60-80 เมตร ความยาวเชือกหอยแมลงภู่น้ำจืด ความยาวตั้งแต่ 1.5-2.0 เมตร

3. การเลี้ยงที่อ่างศิลา

หอยแมลงภู่น้ำจืดแบบพวงมีการใช้ไม้ไผ่ทำแนวแพ ให้หอยแมลงภู่น้ำจืดแบบเชือกแขวนบนไม้ไผ่ ขนาดของแนวมีความกว้าง 6-7 เมตร ยาว 70-100 เมตร ความยาวเชือกหอยแมลงภู่น้ำจืด มีความยาวตั้งแต่ 1.5-2.0 เมตร

4. การเลี้ยงที่บางพระ

หอยแมลงภู่น้ำจืดแบบพวงมีการใช้เชือกโพลีโพรพิลีนผูกติดกับถังพลาสติกทำแนวแพ แต่ละถังห่างกัน 2 เมตร แพสามารถลอยบนผิวน้ำ และจมอยู่ในน้ำทะเลตามระดับน้ำขึ้นและน้ำลง ส่วนด้านล่างของแพมีการยึดติดที่ด้านด้วยทุ่นสมอปูน ขนาดของแพมีความกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ความยาวเชือกหอยแมลงภู่น้ำจืด ความยาวตั้งแต่ 1.5-2.5 เมตร

5. การเลี้ยงที่ ศรีราชา

หอยแมลงภู่แบบพวงมีการใช้เชือกโพลีโพรพีลีนผูกติดกับถังพลาสติคทำแนวแพ แต่ละถังห่างกัน 2 เมตร แพสามารถลอยบนผิวน้ำ และจมอยู่ในน้ำทะเลตามระดับน้ำขึ้นและน้ำลง ส่วนด้านล่างของแพมีการยึดติดสี่ด้านด้วยทุ่นสมอปูน ขนาดของแพมีความกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ความยาวเชือกหอยแมลงภู่มี ความยาวตั้งแต่ 1.5-2.5 เมตร

6. การเลี้ยงที่แหลมท้าวเทว

หอยแมลงภู่แบบพวงมีการใช้เชือกโพลีโพรพีลีนผูกติดกับถังพลาสติคทำแนวแพ แต่ละถังห่างกัน 2 เมตร แพสามารถลอยบนผิวน้ำ และจมอยู่ในน้ำทะเลตามระดับน้ำขึ้นและน้ำลง ส่วนด้านล่างของแพมีการยึดติดสี่ด้านด้วยทุ่นสมอปูน ขนาดของแพมีความกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ความยาวเชือกหอยแมลงภู่มี ความยาวตั้งแต่ 1.5-2.5 เมตร

7. การเลี้ยงที่คลองด่าน

แปลงหอยแมลงภู่แบบแนวที่มีความลึกน้ำทะเลปานกลาง แปลงที่เก็บตัวอย่างเป็นแนวยาว 350 เมตร 4500 ต้น กว้าง 5 เมตร ไม่ใ้ความยาว 6 เมตร ลักษณะการปักจะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กและปักถี่กันมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่คลื่นลมแรงมาก ส่วนบริเวณอื่น ๆ ไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างตัวอย่างหอยแมลงภู่ คือแปลงหอยแนวที่มีความลึกมาก จะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กที่มีความยาว 8-10 เมตร ส่วนที่มีความลึกตื้น ไม่ใ้ความยาว 2-3 เมตร

ความชุกและความหนาแน่นของหอนตัวแบนปรสิติในลูกหอยแบบพวงและหอยแมลงภู่ในแหล่งเลี้ยงแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรี

ความชุกและความหนาแน่นของหอนตัวแบนปรสิติและไข่หอนในลูกหอยแบบพวงและหอยแมลงภู่ตัวใหญ่ใน 7 สถานีแยกตามเดือน ช่วง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2553 พบว่า

บางสถานีมีทั้งหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่และลูกหอยแมลงภู่ขนาดเล็กเริ่มเกาะพวงเชือก แสดงภาพหอยแมลงภู่ขนาดต่างๆ กัน ดังภาพที่ 2 ผลความชุกของหอนตัวแบน สรุปได้ดังนี้ และแสดงดังตารางที่ 2 (ช่วงเดือนตุลาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553) และแสดงดังตารางที่ 3 (ช่วงเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2553)

1. ในเดือนตุลาคม 2552 ไม่พบหอนตัวแบนในหอยแมลงภู่ไม่ว่าจะเป็นหอยขนาดใหญ่หรือหอยขนาดเล็ก ทุกสถานี (คลองด่าน บางทรายและอำเภอเมืองชลบุรียังไม่มีหอยแมลงภู่ เนื่องจากอิทธิพลการตายของหอยแมลงภู่จากเดือน กันยายน ปี 2552) สามารถพบไข่หอนในหอยขนาดใหญ่เกือบทุกตัวอย่างของ 30 ตัว แต่พบไข่หอนจำนวนน้อยจากตัวอย่างของหอยขนาดเล็ก

2. ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ไม่พบหอนตัวแบนในหอยขนาดเล็กทั้ง 7 สถานี และในหอยตัวใหญ่ที่อ่างศิลา สามารถพบหอนตัวแบนในหอยตัวใหญ่เท่านั้นจาก 3 สถานี คือ บางพระ ศรีราชา และ แหลมท้าวเทว รวมทั้งสามารถพบไข่หอนจำนวนมากเกือบทุกตัวอย่างหอยแมลงภู่ ส่วนหอยขนาดเล็กพบไข่หอนจำนวนน้อยจากหอยตัวอย่างของทุกสถานี

3. ในเดือนธันวาคม 2552 ไม่มีหอยตัวใหญ่ใน 3 สถานี คือ คลองค่าน บางทราย และ อำเภอเมืองชลบุรี รวมทั้งไม่พบหนอนตัวแบนในหอยตัวเล็ก แต่พบไข่หนอนตัวแบนจากหอยตัวอย่าง ในช่วง หอย 11-16 ตัวของแต่ละจุด (หอย 30 ตัว) ในสถานี บางทราย และ อำเภอเมืองชลบุรี ไม่พบไข่ หนอนจากหอย 30 ตัวอย่างในสถานีคลองค่าน ส่วนอีก 4 สถานี คือ อ่างศิลา บางพระ ศรีราชา และ แหลมท้าวเทว พบเริ่มการระบาดของหนอนตัวแบนในหอยแมลงภู่งูตัวใหญ่ ปริมาณหนอนตัวแบนที่พบมีจำนวนมากในสถานีแหลมท้าวเทว 3 จุด คือ 392, 210 และ 157 จากหอยจุดละ 30 ตัว การระบาดของลงมา คือ สถานีศรีราชา เพียง 1 จุดพบปริมาณหนอนตัวแบนจำนวน 342 ตัว จากหอยจุดละ 30 ตัว และอีก 2 จุด พบหนอนปริมาณเล็กน้อย (หนอน 1 และ 6 ตัวจากหอยจุดละ 30 ตัว) ส่วน สถานีอ่างศิลาและบางพระ พบปริมาณหนอนจำนวนเล็กน้อยถึงปานกลาง (หนอน 0- 43 ตัวจากหอยจุดละ 30 ตัว) ส่วนหอยแมลงภู่งูขนาดเล็ก ของ 4 สถานีนี้ พบปริมาณหนอนจำนวนเล็กน้อย (หนอน 0- 9 ตัวจากหอยจุดละ 30 ตัว) รวมทั้งพบไข่หนอนในตัวอย่างหอยแมลงภู่งูจำนวนเล็กน้อย (หอย 0- 7 ตัว จากหอยจุดละ 30 ตัว)

4. ในเดือนมกราคม 2553 หอยขนาดใหญ่ไม่มีอยู่ในแปลงหอยเลี้ยง แต่ได้เก็บหอยขนาดใหญ่ ที่มีประปรายอยู่ตามแพหอยของสถานีบางพระ และ ศรีราชา สามารถพบได้ทั้งหนอนตัวแบนและไข่ หนอนในหอยแมลงภู่งู สำหรับส่วนใหญ่ของหอยแมลงภู่งูขนาดเล็กจากทั้ง 7 สถานี ไม่พบหนอนตัวแบนใน 4 สถานี คือ คลองค่าน บางทราย อำเภอเมืองชลบุรี และ อ่างศิลา แต่พบไข่หนอนในตัวอย่าง หอยแมลงภู่งูทุกจุดที่เก็บตัวอย่าง ช่วง หอย 15-29 ตัวจากหอยจุดละ 30 ตัว สำหรับหอยขนาดเล็กใน สถานี บางพระ ศรีราชา และ แหลมท้าวเทว พบการระบาดของหนอนตัวแบนในจำนวนปานกลาง ช่วงจำนวนหนอน 18 – 201 ตัว จากหอยจุดละ 30 ตัว รวมทั้งพบไข่หนอนในหอยตัวอย่างในช่วง หอย 10-30 ตัว จากหอยจุดละ 30 ตัว

5. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ได้สุ่มตัวอย่างหอยขนาดใหญ่ 1 จุด ที่เหลือในแปลงเลี้ยงของ สถานีบางพระ พบหนอนตัวแบนจำนวนมาก มีหนอน 1,086 ตัว จากหอย 30 ตัว ส่วนหอยขนาดเล็ก ในแปลงเลี้ยง พบปริมาณหนอนตัวแบนน้อยในสถานีคลองค่าน (พบหนอนเพียง 2 ตัวจากหอย 30 ตัว) และไม่พบหนอนตัวแบนในสถานีบางทราย และ อำเภอเมืองชลบุรี ส่วนสถานีอ่างศิลา พบหนอน ตัวแบนเล็กน้อยจำนวนหนอนช่วง 2-18 ตัว จากหอยจุดละ 30 ตัว สำหรับบางพระ ศรีราชา และ แหลมท้าวเทว พบการระบาดของหนอนตัวแบนจำนวนมาก จำนวนหนอน 39 -720 ตัว จากหอยจุด ละ 30 ตัว รวมทั้งพบไข่หนอนในเกือบทุกตัวอย่างหอยทุกจุด

6. ในเดือนมีนาคม 2553 ได้สุ่มตัวอย่างหอยขนาดใหญ่ทั้ง 7 สถานี หนอนตัวแบนมีการระบาดของรุนแรงมาก สามารถพบจำนวนหนอนตัวแบนที่ สถานีบางพระ จำนวน 705-1154 ตัวต่อ หอยแมลงภู่งูจำนวน 30 ตัว ที่ศรีราชาจำนวน 856-1197 ตัวต่อหอยแมลงภู่งูจำนวน 30 ตัว และ แหลม ท้าวเทว จำนวน 223-989 ตัวต่อหอยแมลงภู่งูจำนวน 30 ตัว รวมทั้งพบไข่หนอนในหอยแมลงภู่งู การระบาดของหนอนตัวแบนน้อยมากที่สถานี อ่างศิลา จำนวน 1-4 ตัว ต่อหอยแมลงภู่งูจำนวน 30 ตัว และ


ไม่พบที่สถานีคลองด่าน บางทราย และอำเภอเมืองชลบุรี ทั้งนี้พบไข่หนอนในหอยแมลงภู่ได้ทุกสถานี

7. ในเดือนเมษายน 2553 ได้สุ่มตัวอย่างหอยขนาดใหญ่ทั้ง 7 สถานี หนอนตัวแบนมีการระบาดน้อยมาก พบได้ที่สถานีบางทราย จำนวนหนอนตัวแบนพบได้จำนวน 4-35 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว สถานีอำเภอเมืองชลบุรีพบได้จำนวน 3-12 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว สถานีอ่างศิลาจำนวน 0-5 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว สถานีแหลมท้าวเทวจำนวน 0-6 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว สถานีศรีราชาพบจำนวน 0-1 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว ส่วน 2 สถานีคือ คลองด่าน และบางพระไม่พบหนอนตัวแบน ทั้งนี้ยังพบไข่หนอนได้เกือบทุกสถานี

8. ในเดือนพฤษภาคม 2553 ได้สุ่มตัวอย่างหอยขนาดใหญ่ทั้ง 7 สถานี ไม่พบการระบาดของหนอนตัวแบนทั้ง 7 สถานี แต่พบไข่หนอน ได้ในปริมาณน้อยใน 6 สถานี ยกเว้นสถานีคลองด่านไม่พบทั้งหนอนตัวแบนและไข่หนอน

9. ในเดือนมิถุนายน 2553 ได้สุ่มตัวอย่างหอยขนาดใหญ่ทั้ง 7 สถานี ไม่พบการระบาดของหนอนตัวแบนทั้ง 7 สถานี แต่พบไข่หนอน ได้ในปริมาณน้อยใน 7 สถานี

การระบาดของหนอนตัวแบนจะรุนแรงใน 3 สถานี คือ บางพระ ศรีราชา และ แหลมท้าวเทว โดยเริ่มพบหนอนตัวแบนในปริมาณเล็กน้อยได้ตั้งเดือนธันวาคม 2552 จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553 การระบาดของหนอนตัวแบนมีความรุนแรงมากในเดือนมีนาคม 2553 สามารถพบจำนวนหนอนตัวแบนที่ สถานีบางพระ จำนวน 705-1154 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว ที่ศรีราชาจำนวน 856-1197 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว และ แหลมท้าวเทว จำนวน 223-989 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว อย่างไรก็ตามที่แหลมท้าวเทวมีการระบาดในเดือนกุมภาพันธ์มาก่อนพบหนอนตัวแบนจำนวน 462-720 ตัวต่อหอยแมลงภู่จำนวน 30 ตัว ซึ่งทั้ง 3 สถานีเป็นการเลี้ยงแบบแพหอยแขวนแบบเชือก ส่วนอีก 4 สถานีคือ คลองด่าน บางทราย อำเภอเมืองชลบุรีและอ่างศิลา เป็นการเลี้ยงหอยแบบไม้ไผ่ปัก ซึ่งพบการระบาดของหนอนตัวแบนน้อยมากและอาจไม่พบการระบาดด้วย ตลอดจนการสำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 แสดงการระบาดของหนอนตัวแบนทั้ง 7 สถานีในช่วง 9 เดือนดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 การระบาดของหนอนตัวแบน 7 สถานีในช่วง เดือนตุลาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553

การเจริญเติบโตของหอยแมลงภู

การเจริญเติบโตของหอยแมลงภูแบบพวง ทำการวัดเพียงน้ำหนักเนื้อรวมเปลือกและไม่รวมเปลือก (ช่วงเริ่มต้นการเจริญเติบโตของหอยแมลงภูมีขนาดเล็ก ไม่สามารถชั่งเนื้อได้) ความยาวและความกว้าง สุ่มเก็บตัวอย่าง 90 ตัว (จุดละ 30 ตัว) และหอยแมลงภูขนาดใหญ่บางสถานีอาจมีไม่ครบ 90 ตัว โดยแยกตามเดือน ช่วง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2553 พบว่าเดือนตุลาคม 2552 การจับขาย จะเริ่มก่อนจากคลองด่านเนื่องจากไม่มีหอยตัวใหญ่เหลือในแหล่งเลี้ยง และลูกหอยตัวเล็กเริ่มลงเกาะขนาด เล็กมากเท่าเม็ดถั่วเขียว ไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้ ในขณะที่อ่างศิลา บางพระ ศรีราชาและแหลมท้าวเทวา ยังมีหอยขนาดใหญ่ จนถึงเดือนธันวาคม 2552 เมื่อเข้าเดือนมกราคม 2553 จึงมีหอยขนาดเล็กลงเกาะ บางพระและแหลมท้าวเทวา หอยมีการเจริญเติบโตดีกว่าสถานีอื่นๆ ในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ 2553 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างการมีหอยและขนาดของหอยในตารางที่ 4 (เดือนตุลาคม 2552 – เดือนกุมภาพันธ์ 2553) แสดงผลการสุ่มตัวอย่างการมีหอย ในตารางที่ 5 (เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2553) และภาพที่ 6 (ก) เป็นขนาดของหอยแมลงภูต่างๆ กัน และหอยแมลงภูขนาดเล็กแบบพวงที่จำหน่ายไปทั่วทั้งประเทศไทย (ภาพที่ 6 ข) แสดงความกว้าง (ช.ม.) ความยาว (ช.ม.) และน้ำหนัก (กรัม) เฉลี่ย แสดงดังตารางที่ 6, 7 และ 8 ตามลำดับ (เดือนตุลาคม 2552 – เดือนกุมภาพันธ์ 2553) แสดงดังตารางที่ 9, 10 และ 11 ตามลำดับ (เดือนตุลาคม 2552 – เดือนกุมภาพันธ์ 2553)



ก




ข

ภาพที่ 6 (ก) หอยแมลงภูขนาดต่างๆ กัน เนื่องจากอายุหอยที่ต่างกัน

(ข) หอยแมลงภูแบบพวงสำหรับจำหน่าย

การเจริญเติบโตของหอยแมลงภูมีขนาดใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2553 ทั้ง 7 สถานี โดย แหลมท้าวเทวาเริ่มมีการจับหอยขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากหอยแมลงภูมีอัตราการตายที่สังเกตได้ หอยแมลงภูที่จับขายยังมีขนาดเล็ก จึงขายในสภาพที่เรียกว่าหอยถึง 1 ถึง จำนวน 20 กิโลกรัม ขายได้ราคาต่ากิโลกรัมละ 14 บาท ความยาวพวงหอย 2.5 เมตร สามารถขายได้พวงละ 100 บาท แต่ถ้าขายหอยขนาดใหญ่จะได้ราคาต่ากิโลกรัม 20 บาท ส่วนอีก 6 สถานีจะเริ่มทยอยจับขายตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป

เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อหอยต่อน้ำหนักหอยทั้งตัวเป็นค่าดัชนีบอกในเชิงสุขภาพความสมบูรณ์พบว่าสถานีแหลมท้าวเทวสามารถวัดค่าดัชนีนี้ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไปเนื่องจากมีการเจริญเติบโตดีที่สุด มีค่า 32.3% เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 6 สถานีที่ยังชั่งน้ำหนักเนื้อหอยไม่ได้ แต่ต่อมามีเปอร์เซ็นต์ลดลงประมาณ 1 เท่าตัว ทั้งในเดือนมีนาคมและเมษายน ทำให้หอยผอมแม้ตัวเปลือกหอยจะมีขนาดใหญ่ก็ตาม ทั้งนี้สอดคล้องกับการระบาดของรุนแรงของหนอนตัวแบน สำหรับสถานีบางทรายและอำเภอเมืองชลบุรีหอยแมลงภู่มิการเจริญเติบโตที่ไม่ดี หอยจึงมีขนาดเล็กและผอม แม้จะไม่มีมีการระบาดของหนอนตัวแบนก็ตาม มีค่าช่วง 18.56-25.78% ส่วนสถานีคลองด่านและอ่างศิลาหอยมีการเจริญเติบโตค่อนข้างสมบูรณ์ มีค่าช่วง 23.97-37.15 % ส่วนสถานีบางพระและศรีราชาหอยมีการเจริญเติบโตค่อนข้างสมบูรณ์แม้จะมีการระบาดของรุนแรงของหนอนตัวแบน มีค่าช่วง 23.02-36.21 % ซึ่งค่าดัชนีน้ำหนักเนื้อหอยต่อน้ำหนักหอยทั้งตัวที่ชี้บอกความสมบูรณ์ของหอยควรมีค่าเกินกว่า 25% แสดงค่าดัชนีบอกในเชิงสุขภาพความสมบูรณ์ของแมลงภู่อังภาพที่ 8





ภาพที่ 8 เปอร์เซนต์น้ำหนักเนื้อหอยต่อน้ำหนักหอยทั้งตัวของหอยแมลงภู่อังจาก 7 สถานี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2553

อัตราการตายของหอยแมลงภู่อัง

หอยแมลงภู่อังขนาดใหญ่ถูกสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2553 จากทั้ง 7 สถานี พบว่า

- สถานีบางทรายและอำเภอเมืองชลบุรี (เลี้ยงทั้งแบบพวงและไม้ไผ่ปัก) ไม่มีการตายในพวง หอยในเดือนมีนาคมและเมษายน 2553 แต่มีการตายต่ำกว่า 5% ในเดือนพฤษภาคมและ มิถุนายน 2553 แสดงดังตารางที่ 12-15 และ ภาพที่ 9
- สถานีคลองด่าน (เลี้ยงแบบไม้ไผ่ปัก) มีอัตราการตายประมาณ 5.2 และ 5.5% ในเดือน มีนาคมและเมษายน 2553 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นเป็น 7.5% และ 12.3% ในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2553 ตามลำดับแสดงดังตารางที่ 12-15 และ ภาพที่ 9
- สถานีอ่างศิลา (เลี้ยงแบบไม้ไผ่ปัก) มีอัตราการตายประมาณ 5 ถึง 10% ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 2553 แสดงดังตารางที่ 12-15 และ ภาพที่ 9
- สถานีบางพระ (เลี้ยงแบบพวง) มีอัตราการตายประมาณ 7.0 และ 7.1% ในเดือนมีนาคมและ เมษายน 2553 ตามลำดับ และ 6.8 ทั้งในเดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2553 แสดงดังตารางที่ 12-15 และ ภาพที่ 9
- สถานีศรีราชา (เลี้ยงแบบพวง) มีอัตราการตายประมาณ 8.0 ในเดือนมีนาคม ตามลำดับ และ เพิ่มขึ้นมีค่าใกล้เคียงกันเป็น 16.4 – 16.7 ในเดือน และเมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน 2553 แสดงดังตารางที่ 12-15 และ ภาพที่ 9
- สถานีแหลมหัวเตว (เลี้ยงแบบพวง) มีอัตราการตายประมาณ 8.0 ในเดือนมีนาคม ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นมีค่าใกล้เคียงกันเป็น 16.4 – 16.7 ในเดือน และเมษายน พฤษภาคมและ มิถุนายน 2553 แสดงดังตารางที่ 12-15 และ ภาพที่ 9



ภาพที่ 9 อัตราการตาย (%) ของสัดส่วนตัวตายของหอยแมลงภู่คือตัวเป็นในการเลี้ยงแบบพวงและไม้ไผ่ ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2553

คุณภาพน้ำทะเลในแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู

คุณภาพน้ำทะเลตามแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู ได้ตรวจวัดที่แปลงเลี้ยงหอยแมลงภู โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ หย่อนได้ผิวน้ำทะเลลึก 1 เมตร และบางค่าใช้จากรายงานการวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แนวโน้มคุณภาพน้ำช่วง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553 พบว่าค่าละลายออกซิเจนอยู่ในช่วง 4.2-8.9 mg/L (ยกเว้นสถานีอำเภอเมืองชลบุรีมีค่า 2.46 mg/L ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553) และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (7.1-8.8) เป็นค่าอยู่ในมาตรฐานมีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงหอยแมลงภูทั้ง 7 สถานี สำหรับค่าอุณหภูมิ น้ำทะเลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยเฉพาะเดือน ธันวาคม 2552 ถึง มกราคม 2553 ที่อุณหภูมิ น้ำค่อนข้างต่ำกว่า 29.0 องศาเซลเซียส ทั้ง 7 สถานี และในบางสถานีในเดือนพฤศจิกายน (บางพระและศรีราชา) ส่วนความเค็มมีความแตกต่างกันกับฤดูกาล คือ ปลายฤดูฝนเดือนตุลาคม ความเค็ม น้ำทะเลต่ำกว่า 25.0 ppt ทั้ง 7 สถานี โดยคลองด่าน บางทราย และอำเภอเมืองชลบุรี มีความเค็มต่ำมาก อยู่ในช่วง 14.0-16.6 ppt ในเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 3 สถานี ค่าความเค็ม น้ำทะเลเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 21.0-24.6 ppt โดยสถานีอ่างศิลา ถึงแหลมท้ายทเวา ค่าความเค็มจะสูงกว่า ส่วนในเดือนอื่น ๆ ของแต่ละ สถานี ค่าความเค็ม น้ำทะเลอยู่ในช่วงใกล้เคียงที่ 30.0 ppt แสดงค่าความเค็มทั้งหมดดังตารางที่ 16




รูปร่างลักษณะและชีววิทยาเบื้องต้นของพยาธินอนตัวแบนเทอเบลลาเรีย Turbellaria

การเข้าทำลายในหอยแมลงภูของของหนอนตัวแบนเทอเบลลาเรีย สามารถมองเห็นตัวด้วยตาเปล่าได้ในบริเวณเหงือกหอย ที่มีจำนวนมาก สามารถเคลื่อนไหวได้ หอยแมลงภูที่พบหนอนจำนวนมาก เนื้อหอยจะมีความบางผิดปกติ เมื่อส่องตัวหนอนภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อมเนื้อเยื่อเหงือกหอย จะพบรูปร่างไม่แน่นอนแตกต่างกันตามช่องว่างที่อาศัยอยู่กล่าวคือ ถ้ามีพื้นที่แคบมากๆ ตัวจะเรียวยาวประมาณ 2 – 7 เท่าของความกว้างลำตัว แต่เมื่อหนอนตัวแบนเทอเบลลาเรียไม่เคลื่อนไหวจะมีรูปร่างค่อนข้างกลมที่ยึดหดตัวไปมาได้อย่างรวดเร็ว หนอนตัวแบนที่ระบาดในเหงือกของหอยแมลงภูมีลักษณะกลมรี คล้ายไข่ มีลำตัวแบนแบบบนล่าง มีหลายขนาดตั้งแต่ 250-1,200 μm ตัวเต็มวัยลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีช่องปากเพื่อใช้กินอาหารจำพวกเมือกของหอยแมลงภู จุดตา (eye spot) สีดำ ภายกล้ายเม็ดตัว 1 คู่ แสดงดังภาพที่ 10 ตัวเต็มวัยจะมีถุงไข่ 1 อันอยู่บริเวณด้านหลังตัว และถุงอาหารเลี้ยงตัวอ่อนกระจายอยู่ทั่วตัวไข่ของหนอนตัวแบน ที่มีลักษณะกลม พบได้หลายขนาดตั้งแต่ 50 – 200 μm ล้อมรอบไข่ของหนอนจะมีลักษณะชั้นของเมือกคลุมรอบไข่ไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของไข่ และสามารถพบระยะวัยอ่อนที่พัฒนาตัวยาวขึ้น แต่ก็ยังไม่เคลื่อนที่ ทั้งไข่และระยะวัยอ่อนของหนอน จะสังเกตมีจุดตาสีดำ 1 คู่ แสดงดังภาพที่ 11 ไข่ของหนอนตัวแบนจะแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนอีก 2-3 ตัวต่อไข่ 1 ใบ แสดงดังภาพที่ 12




ภาพที่ 10 ลักษณะรูปร่างตัวเต็มวัยหนอนตัวแบนเทอเบลลาเรีย

ไข่ไม่เคลื่อนที่



ภาพที่ 11 ไข่ของหนอนตัวแบนด้านซ้ายและระยะวัยอ่อนด้านขวา
ซึ่งสังเกตมีตา 1 คู่ ถ่ายจากการส่องสดในเหงือกหอยแมลงภู่



ภาพที่ 12 ไข่ของหนอนตัวแบน จะแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนอีก 2-3 ตัวต่อไข่ 1 ใบ สังเกตมีตา 1 คู่ ถ่ายจากการ
เลี้ยงหนอนตัวแบนเต็มวัยและวางไข่ในจานหลุม โดยไข่หนอนมีอายุ 2 วันหลังจากการวางไข่

ข้อเสนอแนะการลดการระบาดของหนอนตัวแบนในแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ตามชายฝั่งจังหวัดชลบุรี

1. ให้เก็บหอยขนาดใหญ่ให้หมดในแปลงเลี้ยง ก่อนหอยรุ่นเล็กมีการลงเกาะ
2. เก็บหอยแมลงภู่มากขึ้นเมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนตัวแบน ถ้าหอยมีขนาดใหญ่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อลดความหนาแน่นของหอยในแปลงเลี้ยง
3. แขนงพวงหอยให้มีความหนาแน่นน้อยลง

เอกสารอ้างอิง

- กรมประมง 2527. ผลการทดลองเพาะพันธุ์หอยสองฝาบางชนิด. สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองประมงน้ำกร่อย กรมประมง.
- กรมประมง 2536. การเลี้ยงหอยแมลงภู. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง., กรมประมง.
- ฐิติพร หลาวประเสริฐ นิธิติชัย เพชรสุภา สุปราณี ชินบุตร และ สุดา คัมภวณิช 2004. *Urostoma* sp. (Platyhelminthes: Urostomatidae) เทอเบลลาเรียใน หอยแมลงภู (*Perna viridis* L.). วารสารการประมง. ปีที่ 57(4): 343-347.
- ปภาศิริ บาร์เนท และ ชนวัฒน์ ดันติวรานุรักษ์. 2550. การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อการตายของหอยแมลงภู (*Perna viridis* Linnaeus) จากแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี. รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อเทศบาลศรีราชา จังหวัดชลบุรี 98 หน้า.
- ศูนย์สารสนเทศกรมประมง. 2548. สถิติการประมงแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2548. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เอกสารฉบับที่ 6/2550. 91 หน้า.
- Bataller, E.E., Boghen, A.D., and Burt, M.D.B. 2003. Electron and light microscopic study of Various glands and the secretions released into the environment by the Turbellarian *Urostoma cyprinae*. Journal of Morphology. 258: 307-316.
- Brusa, F., De Leon, R.P. and Damborenea, C. 2006. A new Paravortex (Platyhelminthes, Dalyellioida) Endoparasite of *Messodesma mactroides* (Bivalve, Mesodesmatidae) from Uruguay. Parasitology Research. 99: 566-571.
- Byrnes, J. and Witman, J.D. 2003. Impact assessment of an invasive flatworm, *Convoluta convolute*, in the Southern Gulf of Maine. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 293: 173-191.
- Carballal, M.J., Diaz, S. and Villalba, A. 2005. *Urosporidium* sp. Hyperparasite of the turbellarian Paravortex cardii in the cockle *Cerastoderma edule*. Journal of Invertebrate Pathology 90(2); 104-107.
- Comps, M. and Tige, G. 1999. Procaryotic infections in the mussel *Mytilus galloprovincialis* and in Its parasite the turbellarian *Urostoma cyprinae*. Diseases of Aquatic Organisms. 38: 211-217.
- Crespo-Gonzalez, C. Rodriguez-Dominguez, H., Soto-Bua, M.' Segade, P., Iglesias, R., Arias-Fernandez C., Garcia-Estevez, J.M. 2008. Virus-like particles in *Urostoma cyprinae*, a turbellarian parasite of *Mytilus galloprovincialis*. Diseases of Aquatic Organisms 79(1):83-86.
- Curini-Galletti, M. and Campus, P. 2007. *Boninia neotethydis* sp. Nov. (Platyhelminthes: Polycladida: Cotylea)-the first lessepien flatworm. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 87(2): 435-442.

- Davenport, J. and Chen, X. 1987. A comparison of methods for the assessment of condition in The Mussel (*Mytilus edulis* L.). *Journal of Mollusc Studies*. 53: 293-297.
- O'conner, W.A. and Newman, L.J. 2001. The halotolerance of the oyster predator, *Imogene mcgrathi*, a stylochid flatworm from Port Stephens, New South Wales, Australia. *Hydrobiologia*. 459:157-163
- Robledo, J.A.F., C-Martinez, J., Sluys, R. and Figueras, A. 1994. The parasitic turbellariaian *Urastoma cyprinae* (Platyhelminthes: Urastomidae) from blue mussel *Mytilus galloprovincialis* in Spain: occurrence and pathology. *Diseases of Aquatic Organisms*. 18: 203-210.
- Thompson, R.M., Mouritsen, K.N. and Poulin, R. 2005. Importance of parasites and their life cycle characteristics in determining the structure of a large marine food web. *Journal of Animal Ecology*. 74: 77-85.
- Villalba, A. Mourelle, S.G., Carballal, M.J. and Lopez, C. 1997. Symbionts and diseases of farmed mussels *Mytilus galloprovincialis* throughout the culture process in the Rias of Galicia (NW Spain). *Diseases of Aquatic Animals*. 31(2): 127-139.
- Woods, C.M.C. and Hayden, B.J. 1998. An observation of the turbellarian *Paravortex* sp. In the New Zealand scallop *Pecten novaezelandiae* (Bivalvia: Pectinidae) *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*. 32(4): 551-553.
- Wootton, E.C., E.A. Dyrynda and N.A. Ratcliffe . 2003. Bivalve immunity: Comparisons between the marine mussel (*Mytilus edulis*) , the edible cockle (*Cerastoderma edule*) and the razor-shell (*Ensis siliqua*). *Fish and Shellfish Immunology*. 15: 195-210.

ตารางที่ 2 จำนวนหนอนตัวแบนต่อหอยแมลงภู่ 30 ตัวและจำนวนหอยแมลงภู่ (ในวงเล็บ) ที่พบไข่ของหนอนตัวแบน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553

	ด.ค. 52		พ.ย. 52		ธ.ค. 52		ม.ค. 53		ก.พ. 53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน										
จุดที่ 1	-	-	-	0(0)	-	0(0)	-	0(24)	-	2(30)
จุดที่ 2	-	-	-	0(0)	-	0(0)	-	0(21)	-	0(14)
จุดที่ 3	-	-	-	0(0)	-	0(0)	-	0(15)	-	0(22)
บางทราย										
จุดที่ 1	-	0(10)	-	0(16)	-	0(16)	-	0(19)	-	0(26)
จุดที่ 2	-	0(5)	-	0(19)	-	0(16)	-	0(23)	-	0(7)
จุดที่ 3	-	0(5)	-	0(16)	-	0(16)	-	0(18)	-	0(10)
อำเภอเมือง										
จุดที่ 1	0(5)	-	0(9)	-	-	0(17)	-	0(22)	-	0(6)
จุดที่ 2	-	-	-	-	-	0(13)	-	0(26)	-	0(7)
จุดที่ 3	-	-	-	-	-	0(11)	-	0(26)	-	0(13)
อ่างศิลา										
จุดที่ 1	0(29)	0(14)	0(24)	0(0)	35(30)	0(7)	-	0(25)	-	2(20)
จุดที่ 2	0(30)	0(4)	0(30)	0(0)	0(29)	0(3)	-	0(26)	-	12(25)
จุดที่ 3	0(30)	0(1)	0(19)	0(0)	1(27)	1(5)	-	0(26)	-	8(30)
บางพระ										
จุดที่ 1	0(30)	0(13)	1(30)	0(0)	28(30)	0(2)	12(11)*	22(28)	1,086(30)	153(27)
จุดที่ 2	0(15)	0(4)	2(30)	0(0)	43(30)	0(3)	-	41(13)	-	48(30)
จุดที่ 3	0(30)	0(1)	3(30)	0(0)	3(30)	0(1)	-	18(10)	-	39(27)
ศรีราชา										
จุดที่ 1	0(18)	0(9)	0(30)	0(0)	342(30)	4(1)	149(30)	201(30)	-	91(30)
จุดที่ 2	0(18)	0(4)	1(30)	0(4)	1(30)	9(0)	-	137(30)	-	102(30)
จุดที่ 3	0(24)	0(1)	1(25)	0(0)	6(24)	5(0)	-	85(30)	-	154(30)
แหลมหัวเหว										
จุดที่ 1	0(30)	0(0)	8(13)	0(2)	392(30)	1(0)	-	292(25)	-	462(30)
จุดที่ 2	0(24)	0(1)	5(16)	0(1)	210(30)	0(3)	-	86(28)	-	710(30)
จุดที่ 3	0(23)	0(0)	3(30)	0(0)	157(29)	2(4)	-	166(22)	-	720(29)

หมายเหตุ - หมายถึง ไม่มีตัวอย่าง แต่ละจุดมีตัวอย่าง 30 ตัว * มีหอยแมลงภู่ 19 ตัว

ตารางที่ 3 ค่าจำนวนหนอนตัวแบนต่อหอยแมลงภู่ 30 ตัวและจำนวนหอยแมลงภู่ (ในวงเล็บ) ที่พบไข่ของหนอนตัวแบน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553

	ม.ค.-53		เม.ย.-53		พ.ค.-53		มิ.ย.-53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน								
จุดที่ 1	0(30)	-	0(0)	-	0(0)	-	0(8)	-
จุดที่ 2	0(16)	-	0(5)	-	0(0)	-	0(12)	-
จุดที่ 3	0(21)	-	0(0)	-	0(0)	-	0(13)	-
บางทราย								
จุดที่ 1	0(26)	-	35(16)	-	0(4)	-	0(7)	-
จุดที่ 2	0(7)	-	17(25)	-	0(3)	-	0(9)	-
จุดที่ 3	0(10)	-	4(14)	-	0(1)	-	0(9)	-
อำเภอเมือง								
จุดที่ 1	0(6)	-	12(25)	-	0(2)	-	0(9)	-
จุดที่ 2	0(7)	-	3(19)	-	0(3)	-	0(9)	-
จุดที่ 3	0(13)	-	6(17)	-	0(5)	-	0(13)	-
อ่างศิลา								
จุดที่ 1	1(15)	-	5(23)	-	0(14)	-	0(11)	-
จุดที่ 2	2(25)	-	2(22)	-	0(25)	-	0(15)	-
จุดที่ 3	4(16)	-	0(26)	-	0(30)	-	0(12)	-
บางพระ								
จุดที่ 1	1154(30)	-	0(16)	-	0(6)	-	0(30)	-
จุดที่ 2	882(7)	-	1(14)	-	0(13)	-	0(30)	-
จุดที่ 3	705(26)	-	0(12)	-	0(11)	-	0(30)	-
ศรีราชา								
จุดที่ 1	856(30)	-	0(12)	-	0(8)	-	0(30)	-
จุดที่ 2	1160(24)	-	0(12)	-	0(8)	-	0(30)	-
จุดที่ 3	1197(24)	-	0(9)	-	0(8)	-	0(30)	-
แหลมหัวท้าว								
จุดที่ 1	989(9)	-	6(17)	-	0(4)	-	0(28)	-
จุดที่ 2	862(8)	-	4(20)	-	0(9)	-	0(27)	-
จุดที่ 3	223(30)	-	0(17)	-	0(10)	-	0(27)	-

ตารางที่ 4 ตัวอย่างหอยแมลงภูที่สุ่มเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีช่วง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553

	ต.ค.52		พ.ย. 52		ธ.ค.52		ม.ค.53		ก.พ.53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน										
จุดที่ 1	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√
จุดที่ 2	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√
จุดที่ 3	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√
บางทราย										
จุดที่ 1	-	√	-	√+	-	√	-	√	-	√
จุดที่ 2	-	√	-	√+	-	√	-	√	-	√
จุดที่ 3	-	√	-	√+	-	√	-	√	-	√
อำเภอเมือง										
จุดที่ 1	√+	-	√+	-	-	√	-	√	-	√
จุดที่ 2	-	-	-	-	-	√	-	√	-	√
จุดที่ 3	-	-	-	-	-	√	-	√	-	√
อ่างศิลา										
จุดที่ 1	√+	√	√+	√	√+	√	-	√	-	√
จุดที่ 2	√+	√	√+	√	√+	√	-	√	-	√
จุดที่ 3	√+	√	√+	√	√+	√	-	√	-	√
บางพระ										
จุดที่ 1	√+	√	√+	√	√+	√	√+*	√+	√+	√
จุดที่ 2	√+	√	√+	√	√+	√	-	√+	-	√
จุดที่ 3	√+	√	√+	√	√+	√	-	√+	-	√
ศรีราชา										
จุดที่ 1	√+	√	√+	√	√+	√	√+	√	-	√
จุดที่ 2	√+	√	√+	√	√+	√	-	√	-	√
จุดที่ 3	√+	√	√+	√	√+	√	-	√	-	√
แหลมหัวเตว										
จุดที่ 1	√+	√	√+	√	√+	√	-	√+	-	√+
จุดที่ 2	√+	√	√+	√	√+	√	-	√+	-	√+
จุดที่ 3	√+	√	√+	√	√+	√	-	√+	-	√+

หมายเหตุ √ หมายถึง มีตัวอย่าง - หมายถึง ไม่มีตัวอย่าง + หมายถึง ชั่งน้ำหนักเนื้อหอยได้ แต่ละจุดมีตัวอย่าง 30 ตัว * มีหอยแมลงภู 19 ตัว

ตารางที่ 5 ตัวอย่างหอยแมลงภู่มื้อเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีช่วง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553

	มี.ค.-53		เม.ย.-53		พ.ค.-53		มิ.ย.-53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน								
จุดที่ 1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 2	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 3	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
บางทราย								
จุดที่ 1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 2	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 3	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
อำเภอเมือง								
จุดที่ 1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 2	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 3	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
อ่างศิลา								
จุดที่ 1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 2	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 3	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
บางพระ								
จุดที่ 1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 2	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 3	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
ศรีราชา								
จุดที่ 1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 2	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 3	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
แหลมหัวเตา								
จุดที่ 1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 2	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
จุดที่ 3	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

291567

634.42
ปลา
พ.2

ตารางที่ 6 ขนาดความกว้างเฉลี่ย เซนติเมตร $\pm$ SD ของหอยแมลงภู่มุมเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553

	ต.ค.52		พ.ย. 52		ธ.ค. 52		ม.ค. 53		ก.พ. 53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน										
จุดที่ 1	-	-	-	0.54 $\pm$ 0.09	-	0.86 $\pm$ 0.14	-	1.44 $\pm$ 0.14	-	1.84 $\pm$ 0.25
จุดที่ 2	-	-	-	0.59 $\pm$ 0.24	-	0.85 $\pm$ 0.15	-	1.43 $\pm$ 0.13	-	1.57 $\pm$ 0.24
จุดที่ 3	-	-	-	0.54 $\pm$ 0.13	-	0.89 $\pm$ 0.14	-	1.4 $\pm$ 0.14	-	1.51 $\pm$ 0.18
บางทราย										
จุดที่ 1	-	1.95 $\pm$ 0.18	-	2.06 $\pm$ 0.24	-	1.22 $\pm$ 0.13	-	1.7 $\pm$ 0.24	-	1.6 $\pm$ 0.21
จุดที่ 2	-	1.89 $\pm$ 0.2	-	2.05 $\pm$ 0.28	-	1.22 $\pm$ 0.13	-	1.62 $\pm$ 0.24	-	1.61 $\pm$ 0.22
จุดที่ 3	-	1.77 $\pm$ 0.17	-	1.94 $\pm$ 0.26	-	1.22 $\pm$ 0.13	-	1.65 $\pm$ 0.17	-	1.6 $\pm$ 0.3
อำเภอเมือง										
จุดที่ 1	2.35 $\pm$ 0.27	-	2.55 $\pm$ 0.26	-	-	1.26 $\pm$ 0.15	-	1.7 $\pm$ 0.15	-	1.54 $\pm$ 0.29
จุดที่ 2	-	-	-	-	-	1.25 $\pm$ 0.13	-	1.68 $\pm$ 0.19	-	1.34 $\pm$ 0.22
จุดที่ 3	-	-	-	-	-	1.27 $\pm$ 0.14	-	1.6 $\pm$ 0.17	-	1.42 $\pm$ 0.23
อ่างศิลา										
จุดที่ 1	3.45 $\pm$ 0.28	1.2 $\pm$ 0.24	2.5 $\pm$ 0.53	0.28 $\pm$ 0.06	2.5 $\pm$ 0.53	0.28 $\pm$ 0.06	-	1.31 $\pm$ 0.2	-	1.69 $\pm$ 0.25
จุดที่ 2	3.39 $\pm$ 0.2	1.23 $\pm$ 0.24	3.02 $\pm$ 0.41	0.31 $\pm$ 0.05	3.02 $\pm$ 0.41	0.31 $\pm$ 0.05	-	1.42 $\pm$ 0.16	-	1.65 $\pm$ 0.17
จุดที่ 3	3.32 $\pm$ 0.29	1.13 $\pm$ 0.22	2.84 $\pm$ 0.37	0.21 $\pm$ 0.04	2.8 $\pm$ 0.37	0.21 $\pm$ 0.04	-	1.42 $\pm$ 0.2	-	1.8 $\pm$ 0.17
บางพระ										
จุดที่ 1	3.04 $\pm$ 0.23	1.16 $\pm$ 0.25	2.5 $\pm$ 0.41	0.88 $\pm$ 0.99	3.25 $\pm$ 0.54	1.62 $\pm$ 0.22	3.27 $\pm$ 0.31	1.66 $\pm$ 0.31	3.13 $\pm$ 0.28	1.76 $\pm$ 0.26
จุดที่ 2	3.17 $\pm$ 0.33	1.23 $\pm$ 0.24	2.69 $\pm$ 0.45	0.73 $\pm$ 0.16	3.47 $\pm$ 0.41	1.64 $\pm$ 0.23	-	1.82 $\pm$ 0.15	-	1.95 $\pm$ 0.3
จุดที่ 3	3.07 $\pm$ 0.28	1.18 $\pm$ 0.22	2.67 $\pm$ 0.39	0.83 $\pm$ 0.25	3.34 $\pm$ 0.33	1.41 $\pm$ 0.18	-	1.6 $\pm$ 0.17	-	1.92 $\pm$ 0.29
ศรีราชา										
จุดที่ 1	3.22 $\pm$ 0.35	0.45 $\pm$ 0.1	3.25 $\pm$ 0.33	1.08 $\pm$ 0.26	3.73 $\pm$ 0.37	1.36 $\pm$ 0.35	2.87 $\pm$ 0.6	1.67 $\pm$ 0.18	-	1.72 $\pm$ 0.35
จุดที่ 2	3.04 $\pm$ 0.31	0.43 $\pm$ 0.1	3.1 $\pm$ 0.27	0.72 $\pm$ 0.12	3.54 $\pm$ 0.25	1.33 $\pm$ 0.28	-	1.61 $\pm$ 0.2	-	1.71 $\pm$ 0.23
จุดที่ 3	3.19 $\pm$ 0.29	0.43 $\pm$ 0.1	3.3 $\pm$ 0.3	0.7 $\pm$ 0.18	3.64 $\pm$ 0.42	1.28 $\pm$ 0.25	-	1.73 $\pm$ 0.29	-	1.66 $\pm$ 0.21
แหลมหัวเตา										
จุดที่ 1	3.54 $\pm$ 0.32	0.48 $\pm$ 0.08	3.23 $\pm$ 0.59	0.92 $\pm$ 0.2	3.46 $\pm$ 0.38	1.15 $\pm$ 0.26	-	2.36 $\pm$ 0.26	-	2.18 $\pm$ 0.34
จุดที่ 2	3.17 $\pm$ 0.26	0.47 $\pm$ 0.07	2.64 $\pm$ 0.53	1.0 $\pm$ 0.16	3.36 $\pm$ 0.31	1.19 $\pm$ 0.24	-	2.21 $\pm$ 0.29	-	2.26 $\pm$ 0.25
จุดที่ 3	3.29 $\pm$ 0.32	0.47 $\pm$ 0.07	3.03 $\pm$ 0.51	0.88 $\pm$ 0.16	3.5 $\pm$ 0.37	1.13 $\pm$ 0.27	-	2.2 $\pm$ 0.28	-	2.28 $\pm$ 0.29

หมายเหตุ - ไม่มีตัวอย่าง

ตารางที่ 7 ขนาดความยาวเฉลี่ย เซนติเมตร $\pm$ SD ของหอยแมลงภู่ม้วนเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553

	ด.ค.52		พ.ย. 52		ธ.ค. 52		ม.ค. 53		ก.พ. 53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน										
จุดที่ 1	-	-	-	0.87 $\pm$ 0.12	-	1.5 $\pm$ 0.26	-	3.08 $\pm$ 0.28	-	3.8 $\pm$ 0.59
จุดที่ 2	-	-	-	0.98 $\pm$ 0.44	-	1.54 $\pm$ 0.32	-	3.06 $\pm$ 0.25	-	3.31 $\pm$ 0.51
จุดที่ 3	-	-	-	0.8 $\pm$ 0.18	-	1.8 $\pm$ 0.27	-	2.87 $\pm$ 0.25	-	2.97 $\pm$ 0.36
บางทราย										
จุดที่ 1	-	3.95 $\pm$ 0.18	-	4.17 $\pm$ 0.4	-	2.28 $\pm$ 0.14	-	3.62 $\pm$ 0.38	-	3.32 $\pm$ 0.37
จุดที่ 2	-	3.84 $\pm$ 0.45	-	4.09 $\pm$ 0.33	-	2.27 $\pm$ 0.15	-	3.46 $\pm$ 0.4	-	3.34 $\pm$ 0.44
จุดที่ 3	-	3.6 $\pm$ 0.39	-	3.7 $\pm$ 0.44	-	2.28 $\pm$ 0.14	-	3.5 $\pm$ 0.3	-	3.38 $\pm$ 0.45
อำเภอเมือง										
จุดที่ 1	5.28 $\pm$ 0.73	-	6.01 $\pm$ 0.53	-	-	2.35 $\pm$ 0.12	-	3.25 $\pm$ 0.3	-	3.25 $\pm$ 0.5
จุดที่ 2	-	-	-	-	-	2.37 $\pm$ 0.11	-	3.23 $\pm$ 0.36	-	3.0 $\pm$ 0.39
จุดที่ 3	-	-	-	-	-	2.37 $\pm$ 0.11	-	3.1 $\pm$ 0.34	-	3.1 $\pm$ 0.48
อ่างศิลา										
จุดที่ 1	8.14 $\pm$ 0.72	1.93 $\pm$ 0.43	5.91 $\pm$ 0.95	0.41 $\pm$ 0.06	7.42 $\pm$ 1.27	1.05 $\pm$ 0.25	-	2.44 $\pm$ 0.31	-	3.58 $\pm$ 0.41
จุดที่ 2	8.04 $\pm$ 0.48	1.97 $\pm$ 0.42	6.55 $\pm$ 0.78	0.45 $\pm$ 0.05	7.03 $\pm$ 1.18	0.95 $\pm$ 0.19	-	2.82 $\pm$ 0.35	-	3.58 $\pm$ 0.39
จุดที่ 3	7.76 $\pm$ 0.64	1.76 $\pm$ 0.38	6.92 $\pm$ 0.52	0.35 $\pm$ 0.05	7.22 $\pm$ 1.28	1.03 $\pm$ 0.23	-	2.71 $\pm$ 0.43	-	3.63 $\pm$ 0.28
บางพระ										
จุดที่ 1	7.51 $\pm$ 0.71	1.84 $\pm$ 0.46	6.0 $\pm$ 0.62	1.25 $\pm$ 0.42	7.45 $\pm$ 1.36	2.97 $\pm$ 0.38	7.89 $\pm$ 0.89	3.38 $\pm$ 0.89	6.85 $\pm$ 0.97	4.01 $\pm$ 0.48
จุดที่ 2	8.01 $\pm$ 0.85	1.97 $\pm$ 0.42	6.07 $\pm$ 0.64	1.32 $\pm$ 0.34	7.78 $\pm$ 1.14	3.05 $\pm$ 0.43	-	3.67 $\pm$ 0.35	-	4.07 $\pm$ 0.56
จุดที่ 3	7.19 $\pm$ 0.81	1.90 $\pm$ 0.36	6.15 $\pm$ 0.62	1.44 $\pm$ 0.42	7.43 $\pm$ 0.81	2.5 $\pm$ 0.3	-	3.26 $\pm$ 0.33	-	4.27 $\pm$ 0.49
ศรีราชา										
จุดที่ 1	8.34 $\pm$ 0.9	0.58 $\pm$ 0.08	7.43 $\pm$ 0.8	1.97 $\pm$ 0.43	8.78 $\pm$ 0.94	2.62 $\pm$ 0.67	6.43 $\pm$ 1.53	3.58 $\pm$ 0.52	-	3.72 $\pm$ 0.78
จุดที่ 2	7.52 $\pm$ 0.48	0.57 $\pm$ 0.08	6.93 $\pm$ 0.67	1.26 $\pm$ 0.22	8.69 $\pm$ 0.77	2.72 $\pm$ 0.54	-	3.47 $\pm$ 0.41	-	3.84 $\pm$ 0.44
จุดที่ 3	7.81 $\pm$ 1.04	0.56 $\pm$ 0.1	7.36 $\pm$ 0.68	1.2 $\pm$ 0.32	8.58 $\pm$ 0.94	2.67 $\pm$ 0.53	-	3.75 $\pm$ 0.57	-	3.76 $\pm$ 0.4
แหลมหัวเขา										
จุดที่ 1	8.88 $\pm$ 0.54	0.59 $\pm$ 0.08	8.06 $\pm$ 1.02	0.99 $\pm$ 0.35	8.12 $\pm$ 0.89	2.12 $\pm$ 0.51	-	4.91 $\pm$ 0.64	-	5.35 $\pm$ 0.72
จุดที่ 2	7.97 $\pm$ 0.62	0.58 $\pm$ 0.07	6.68 $\pm$ 0.84	1.72 $\pm$ 0.31	8.26 $\pm$ 0.79	2.11 $\pm$ 0.28	-	4.96 $\pm$ 0.7	-	5.27 $\pm$ 0.68
จุดที่ 3	7.91 $\pm$ 0.08	0.59 $\pm$ 0.07	7.53 $\pm$ 0.96	1.52 $\pm$ 0.26	8.2 $\pm$ 0.65	2.02 $\pm$ 0.4	-	4.81 $\pm$ 0.48	-	5.34 $\pm$ 0.76

หมายเหตุ - ไม่มีตัวอย่าง

ตารางที่ 8 น้ำหนักเฉลี่ย กรัม $\pm$ SD ของหอยแมลงภู่มื้อเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553

	ต.ค.52		พ.ย. 52		ธ.ค. 52		ม.ค. 53		ก.พ. 53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน										
จุดที่ 1	-	-	-	NA	-	0.33 $\pm$ 0.17	-	2.55 $\pm$ 0.71	-	4.12 $\pm$ 1.56
จุดที่ 2	-	-	-	NA	-	0.34 $\pm$ 0.21	-	2.41 $\pm$ 0.75	-	2.91 $\pm$ 1.27
จุดที่ 3	-	-	-	NA	-	0.44 $\pm$ 0.18	-	2.0 $\pm$ 0.57	-	2.15 $\pm$ 0.72
บางทราย										
จุดที่ 1	-	4.99 $\pm$ 1.22	-	5.97 $\pm$ 1.99	-	0.37 $\pm$ 0.13	-	3.38 $\pm$ 1.0	-	2.82 $\pm$ 1.11
จุดที่ 2	-	4.76 $\pm$ 1.29	-	6.8 $\pm$ 2.67	-	0.35 $\pm$ 0.12	-	3.14 $\pm$ 0.77	-	2.89 $\pm$ 0.98
จุดที่ 3	-	3.97 $\pm$ 1.13	-	6.4 $\pm$ 1.94	-	0.37 $\pm$ 0.13	-	3.13 $\pm$ 0.63	-	3.07 $\pm$ 1.07
อำเภอเมือง										
จุดที่ 1	10.2 $\pm$ 3.3	-	14.33 $\pm$ 3.2	-	-	0.51 $\pm$ 0.13	-	2.51 $\pm$ 0.67	-	2.93 $\pm$ 1.35
จุดที่ 2	-	-	-	-	-	0.53 $\pm$ 0.14	-	2.31 $\pm$ 0.69	-	2.2 $\pm$ 0.76
จุดที่ 3	-	-	-	-	-	0.54 $\pm$ 0.14	-	2.14 $\pm$ 0.66	-	2.48 $\pm$ 0.93
อ่างศิลา										
จุดที่ 1	32.5 $\pm$ 7.63	1.03 $\pm$ 0.55	18.0 $\pm$ 6.21	NA	28.17 $\pm$ 12.0	0.1 $\pm$ 0.06	-	1.49 $\pm$ 0.56	-	3.73 $\pm$ 1.26
จุดที่ 2	33.67 $\pm$ 5.56	1.07 $\pm$ 0.53	24.67 $\pm$ 7.19	NA	26.17 $\pm$ 10.72	0.15 $\pm$ 0.12	-	2.29 $\pm$ 0.7	-	3.69 $\pm$ 1.24
จุดที่ 3	30.33 $\pm$ 7.06	0.83 $\pm$ 0.43	27.5 $\pm$ 6.89	NA	28.67 $\pm$ 10.08	0.11 $\pm$ 0.07	-	2.15 $\pm$ 0.8	-	4.05 $\pm$ 1.06
บางพระ										
จุดที่ 1	24.12 $\pm$ 4.93	0.93 $\pm$ 0.56	17.83 $\pm$ 3.87	NA	29.17 $\pm$ 11.84	2.01 $\pm$ 0.73	40.53 $\pm$ 9.26	3.45 $\pm$ 1.11	28.0 $\pm$ 8.26	4.42 $\pm$ 1.28
จุดที่ 2	30.12 $\pm$ 6.89	1.07 $\pm$ 0.53	19.0 $\pm$ 4.98	NA	31.43 $\pm$ 12.98	2.23 $\pm$ 0.86	-	4.18 $\pm$ 1.18	-	5.36 $\pm$ 1.95
จุดที่ 3	24.42 $\pm$ 6.28	0.95 $\pm$ 0.45	19.17 $\pm$ 4.75	NA	18.97 $\pm$ 4.75	1.23 $\pm$ 0.44	-	3.27 $\pm$ 1.11	-	5.72 $\pm$ 1.98
ศรีราชา										
จุดที่ 1	31.78 $\pm$ 7.58	NA	30.0 $\pm$ 9.0	NA	35.33 $\pm$ 8.09	1.54 $\pm$ 1.19	23.67 $\pm$ 12.73	3.02 $\pm$ 1.0	-	4.3 $\pm$ 2.05
จุดที่ 2	26.39 $\pm$ 4.71	NA	27.0 $\pm$ 5.96	NA	34.5 $\pm$ 6.48	1.73 $\pm$ 0.92	-	2.93 $\pm$ 1.03	-	4.06 $\pm$ 1.34
จุดที่ 3	30.22 $\pm$ 8.94	NA	32.0 $\pm$ 6.9	NA	38.33 $\pm$ 7.58	1.73 $\pm$ 0.8	-	3.71 $\pm$ 1.48	-	3.87 $\pm$ 1.11
แหลมหัวเตา										
จุดที่ 1	37.57 $\pm$ 5.83	NA	33.67 $\pm$ 9.55	NA	36.75 $\pm$ 7.74	0.94 $\pm$ 0.62	-	9.14 $\pm$ 3.14	-	10.28 $\pm$ 3.46
จุดที่ 2	29.23 $\pm$ 5.02	NA	24.83 $\pm$ 7.25	NA	32.5 $\pm$ 7.51	0.88 $\pm$ 0.31	-	8.23 $\pm$ 2.49	-	9.01 $\pm$ 3.21
จุดที่ 3	30.56 $\pm$ 7.83	NA	33.0 $\pm$ 7.5	NA	37.67 $\pm$ 6.12	0.99 $\pm$ 0.44	-	8.25 $\pm$ 2.8	-	10.12 $\pm$ 3.73

หมายเหตุ - ไม่มีตัวอย่าง NA หมายถึง หอยขนาดเล็กมากซึ่งน้ำหนักไม่ได้

ตารางที่ 9 ขนาดความกว้างเฉลี่ย เซนติเมตร $\pm$ SD ของหอยแมลงภู่มุมเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553

	มี.ค.-53		เม.ย.-53		พ.ค.-53		มิ.ย.-53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน								
จุดที่ 1	2.06 $\pm$ 0.16	-	1.95 $\pm$ 0.22	-	2.41 $\pm$ 0.16	-	2.57 $\pm$ 0.28	-
จุดที่ 2	2.19 $\pm$ 0.17	-	1.97 $\pm$ 0.21	-	2.50 $\pm$ 0.27	-	2.53 $\pm$ 0.23	-
จุดที่ 3	1.9 $\pm$ 0.15	-	1.87 $\pm$ 0.24	-	2.51 $\pm$ 0.29	-	2.53 $\pm$ 0.34	-
บางทราย								
จุดที่ 1	-	1.22 $\pm$ 0.16	1.73 $\pm$ 0.28	-	2.20 $\pm$ 0.15	-	2.46 $\pm$ 0.26	-
จุดที่ 2	-	1.27 $\pm$ 0.16	1.65 $\pm$ 0.24	-	2.16 $\pm$ 0.20	-	2.26 $\pm$ 0.21	-
จุดที่ 3	-	1.26 $\pm$ 0.15	1.60 $\pm$ 0.15	-	2.09 $\pm$ 0.21	-	2.29 $\pm$ 0.21	-
อำเภอเมือง								
จุดที่ 1	-	1.17 $\pm$ 0.15	1.88 $\pm$ 0.19	-	1.94 $\pm$ 0.20	-	2.09 $\pm$ 0.18	-
จุดที่ 2	-	1.18 $\pm$ 0.13	1.87 $\pm$ 0.28	-	2.07 $\pm$ 0.14	-	2.20 $\pm$ 0.24	-
จุดที่ 3	-	1.24 $\pm$ 0.2	1.96 $\pm$ 0.41	-	2.03 $\pm$ 0.14	-	2.34 $\pm$ 0.20	-
อ่างศิลา								
จุดที่ 1	1.84 $\pm$ 0.26	-	1.96 $\pm$ 0.15	-	2.34 $\pm$ 0.19	-	2.65 $\pm$ 0.29	-
จุดที่ 2	1.93 $\pm$ 0.23	-	2.02 $\pm$ 0.30	-	2.38 $\pm$ 0.18	-	2.67 $\pm$ 0.23	-
จุดที่ 3	1.91 $\pm$ 0.26	-	2.02 $\pm$ 0.25	-	2.23 $\pm$ 0.18	-	2.98 $\pm$ 0.30	-
บางพระ								
จุดที่ 1	2.08 $\pm$ 0.15	-	2.46 $\pm$ 0.32	-	2.72 $\pm$ 0.15	-	2.79 $\pm$ 0.27	-
จุดที่ 2	2.09 $\pm$ 0.20	-	2.17 $\pm$ 0.30	-	2.64 $\pm$ 0.15	-	2.74 $\pm$ 0.24	-
จุดที่ 3	1.96 $\pm$ 0.28	-	2.18 $\pm$ 0.16	-	2.51 $\pm$ 0.17	-	3.6 $\pm$ 0.26	-
ศรีราชา								
จุดที่ 1	2.42 $\pm$ 0.36	-	1.98 $\pm$ 0.25	-	2.51 $\pm$ 0.25	-	2.47 $\pm$ 0.25	-
จุดที่ 2	2.28 $\pm$ 0.26	-	2.25 $\pm$ 0.27	-	2.59 $\pm$ 0.25	-	2.51 $\pm$ 0.17	-
จุดที่ 3	2.14 $\pm$ 0.19	-	1.97 $\pm$ 0.19	-	2.50 $\pm$ 0.31	-	2.65 $\pm$ 0.37	-
แหลมหัวเตา								
จุดที่ 1	2.68 $\pm$ 0.29	-	3.04 $\pm$ 0.40	-	3.05 $\pm$ 0.19	-	3.35 $\pm$ 0.28	-
จุดที่ 2	2.81 $\pm$ 0.22	-	2.98 $\pm$ 0.26	-	3.08 $\pm$ 0.27	-	3.22 $\pm$ 0.30	-
จุดที่ 3	2.71 $\pm$ 0.17	-	2.76 $\pm$ 0.25	-	3.20 $\pm$ 0.19	-	3.03 $\pm$ 0.33	-

ตารางที่ 10 ขนาดความยาวเฉลี่ย เซนติเมตร $\pm$ SD ของหอยแมลงภู่มุมเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553

	มี.ค.-53		เม.ย.-53		พ.ค.-53		มิ.ย.-53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน								
จุดที่ 1	4.45 $\pm$ 0.27	-	4.81 $\pm$ 0.50	-	5.23 $\pm$ 0.57	-	5.54 $\pm$ 0.50	-
จุดที่ 2	4.72 $\pm$ 0.37	-	4.89 $\pm$ 0.40	-	5.13 $\pm$ 0.45	-	5.89 $\pm$ 0.52	-
จุดที่ 3	4.20 $\pm$ 0.30	-	4.56 $\pm$ 0.44	-	5.27 $\pm$ 0.47	-	5.72 $\pm$ 0.61	-
บางทราย								
จุดที่ 1	-	2.89 $\pm$ 0.41	3.55 $\pm$ 0.50	-	4.43 $\pm$ 0.34	-	5.10 $\pm$ 0.46	-
จุดที่ 2	-	3.05 $\pm$ 0.26	3.50 $\pm$ 0.36	-	4.47 $\pm$ 0.40	-	4.84 $\pm$ 0.42	-
จุดที่ 3	-	2.98 $\pm$ 0.20	3.27 $\pm$ 0.35	-	4.41 $\pm$ 0.20	-	5.12 $\pm$ 0.44	-
อำเภอเมือง								
จุดที่ 1	-	3.08 $\pm$ 0.28	3.69 $\pm$ 0.43	-	4.32 $\pm$ 0.34	-	4.71 $\pm$ 0.32	-
จุดที่ 2	-	3.06 $\pm$ 0.33	3.75 $\pm$ 0.46	-	4.35 $\pm$ 0.21	-	4.92 $\pm$ 0.40	-
จุดที่ 3	-	2.98 $\pm$ 0.36	3.58 $\pm$ 0.38	-	4.22 $\pm$ 0.23	-	5.03 $\pm$ 0.29	-
อ่างศิลา								
จุดที่ 1	3.90 $\pm$ 0.48	-	4.29 $\pm$ 0.37	-	5.21 $\pm$ 0.40	-	5.82 $\pm$ 0.67	-
จุดที่ 2	4.01 $\pm$ 0.44	-	4.22 $\pm$ 0.66	-	5.13 $\pm$ 0.47	-	5.79 $\pm$ 0.57	-
จุดที่ 3	3.84 $\pm$ 0.51	-	4.32 $\pm$ 0.43	-	4.97 $\pm$ 0.37	-	6.28 $\pm$ 0.58	-
บางพระ								
จุดที่ 1	4.30 $\pm$ 0.46	-	5.28 $\pm$ 0.54	-	5.21 $\pm$ 0.40	-	6.26 $\pm$ 0.35	-
จุดที่ 2	4.42 $\pm$ 0.59	-	5.00 $\pm$ 0.51	-	5.13 $\pm$ 0.47	-	6.36 $\pm$ 0.51	-
จุดที่ 3	4.29 $\pm$ 0.66	-	5.09 $\pm$ 0.50	-	4.97 $\pm$ 0.37	-	6.20 $\pm$ 0.46	-
ศรีราชา								
จุดที่ 1	5.08 $\pm$ 0.81	-	4.27 $\pm$ 0.54	-	6.00 $\pm$ 0.46	-	5.43 $\pm$ 0.54	-
จุดที่ 2	4.97 $\pm$ 0.57	-	4.89 $\pm$ 0.58	-	6.08 $\pm$ 0.51	-	5.48 $\pm$ 0.38	-
จุดที่ 3	4.49 $\pm$ 0.33	-	4.34 $\pm$ 0.51	-	5.43 $\pm$ 0.63	-	5.75 $\pm$ 0.72	-
แหลมหัวเหว								
จุดที่ 1	6.24 $\pm$ 0.48	-	7.16 $\pm$ 0.79	-	5.51 $\pm$ 0.74	-	7.63 $\pm$ 0.47	-
จุดที่ 2	6.55 $\pm$ 0.42	-	6.96 $\pm$ 0.71	-	5.58 $\pm$ 0.56	-	7.78 $\pm$ 0.66	-
จุดที่ 3	6.24 $\pm$ 0.41	-	6.67 $\pm$ 0.53	-	5.39 $\pm$ 0.85	-	7.3 $\pm$ 0.57	-

ตารางที่ 11 น้ำหนักเฉลี่ย กรัม $\pm$ SD ของหอยแมลงภู่มัดเก็บตัวอย่างจาก 7 สถานีตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553

	มี.ค.-53		เม.ย.-53		พ.ค.-53		มิ.ย.-53	
	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก	หอยตัวใหญ่	หอยตัวเล็ก
คลองด่าน								
จุดที่ 1	6.88 $\pm$ 1.13		7.93 $\pm$ 1.86	-	8.39 $\pm$ 1.66	-	10.98 $\pm$ 2.25	-
จุดที่ 2	7.93 $\pm$ 1.67		8.27 $\pm$ 2.54	-	8.60 $\pm$ 1.19	-	12.47 $\pm$ 2.16	-
จุดที่ 3	6.08 $\pm$ 1.27		6.87 $\pm$ 1.76	-	9.55 $\pm$ 2.26	-	11.84 $\pm$ 2.86	-
บางทราย								
จุดที่ 1	-	2.04 $\pm$ 0.86	3.54 $\pm$ 1.35	-	7.25 $\pm$ 1.58	-	6.47 $\pm$ 1.68	-
จุดที่ 2	-	2.47 $\pm$ 0.59	3.28 $\pm$ 0.81	-	8.09 $\pm$ 1.62	-	8.02 $\pm$ 2.00	-
จุดที่ 3	-	2.20 $\pm$ 0.50	2.64 $\pm$ 0.85	-	7.79 $\pm$ 1.63	-	12.45 $\pm$ 1.34	-
อำเภอเมือง								
จุดที่ 1	-	2.51 $\pm$ 0.57	3.95 $\pm$ 0.99	-	6.67 $\pm$ 1.43	-	7.21 $\pm$ 1.87	-
จุดที่ 2	-	2.38 $\pm$ 0.68	4.30 $\pm$ 1.47	-	6.83 $\pm$ 1.20	-	8.16 $\pm$ 1.65	-
จุดที่ 3	-	2.43 $\pm$ 0.59	3.81 $\pm$ 1.10	-	6.35 $\pm$ 0.78	-	8.15 $\pm$ 1.28	-
อ่างศิลา								
จุดที่ 1	4.61 $\pm$ 1.48	-	5.80 $\pm$ 1.47	-	9.57 $\pm$ 2.01	-	11.13 $\pm$ 3.46	-
จุดที่ 2	4.85 $\pm$ 1.82	-	6.81 $\pm$ 5.16	-	8.67 $\pm$ 2.03	-	9.86 $\pm$ 3.05	-
จุดที่ 3	4.75 $\pm$ 1.91	-	5.95 $\pm$ 2.11	-	7.68 $\pm$ 1.85	-	12.15 $\pm$ 3.39	-
บางพระ								
จุดที่ 1	5.45 $\pm$ 1.48	-	9.85 $\pm$ 2.24	-	10.56 $\pm$ 2.09	-	16.42 $\pm$ 2.63	-
จุดที่ 2	5.23 $\pm$ 1.81	-	8.97 $\pm$ 2.30	-	11.13 $\pm$ 2.36	-	14.65 $\pm$ 3.67	-
จุดที่ 3	5.20 $\pm$ 2.66	-	11.61 $\pm$ 3.36	-	8.21 $\pm$ 2.05	-	13.62 $\pm$ 2.40	-
ศรีราชา								
จุดที่ 1	9.22 $\pm$ 4.15	-	6.03 $\pm$ 2.51	-	8.47 $\pm$ 3.67	-	8.76 $\pm$ 1.95	-
จุดที่ 2	7.85 $\pm$ 2.92	-	9.31 $\pm$ 2.32	-	9.94 $\pm$ 3.10	-	9.54 $\pm$ 1.57	-
จุดที่ 3	6.47 $\pm$ 1.83	-	6.23 $\pm$ 2.24	-	9.15 $\pm$ 3.66	-	12.57 $\pm$ 4.18	-
แหลมหัวเตว								
จุดที่ 1	16.06 $\pm$ 4.28	-	24.84 $\pm$ 7.79	-	15.12 $\pm$ 2.37	-	28.15 $\pm$ 5.41	-
จุดที่ 2	18.19 $\pm$ 2.96	-	21.45 $\pm$ 5.49	-	16.84 $\pm$ 4.85	-	28.85 $\pm$ 6.16	-
จุดที่ 3	16.39 $\pm$ 3.09	-	19.79 $\pm$ 4.31	-	21.11 $\pm$ 2.95	-	25.81 $\pm$ 4.98	-

ตารางที่ 12 อัตราการตายของหอยแมลงภู่น้ำจืด มีนาคม 2553

สถานี	จำนวน(ตัว)		อัตราการตาย (%)
	ตัวเป็น	ตัวตาย	
คลองด่าน	420	23	5.5
บางทราย	ไม่ได้นับ	ไม่ได้นับ	0
อำเภอเมือง	ไม่ได้นับ	ไม่ได้นับ	0
อ่างศิลา	554	25	4.5
บางพระ	570	40	7.0
ศรีราชา	553	44	8.0
แหลมท้ายท่าว	644	68	10.6

ตารางที่ 13 อัตราการตายของหอยแมลงภู่น้ำจืด เมษายน 2553

สถานี	จำนวน(ตัว)		อัตราการตาย (%)
	ตัวเป็น	ตัวตาย	
คลองด่าน	367	19	5.2
บางทราย	ไม่ได้นับ	ไม่ได้นับ	0
อำเภอเมือง	ไม่ได้นับ	ไม่ได้นับ	0
อ่างศิลา	223	13	5.8
บางพระ	566	40	7.1
ศรีราชา	686	113	16.5
แหลมท้ายท่าว	405	93	23.0

ตารางที่ 14 อัตราการตายของหอยแมลงภู่น้ำเค็ม พฤษภาคม 2553

สถานี	จำนวน(ตัว)		อัตราการตาย (%)
	ตัวเป็น	ตัวตาย	
คลองด่าน	439	33	7.5
บางทราย	1133	28	2.5
อำเภอเมือง	1234	29	2.4
อ่างศิลา	173	16	9.2
บางพระ	517	35	6.8
ศรีราชา	245	41	16.7
แหลมหัวเตา	128	5	3.9

ตารางที่ 15 อัตราการตายของหอยแมลงภู่น้ำเค็ม มิถุนายน 2553

สถานี	จำนวน(ตัว)		อัตราการตาย (%)
	ตัวเป็น	ตัวตาย	
คลองด่าน	154	19	12.3
บางทราย	583	32	5.5
อำเภอเมือง	587	29	4.9
อ่างศิลา	127	12	9.4
บางพระ	718	49	6.8
ศรีราชา	365	60	16.4
แหลมหัวเตา	113	8	7.7

ตารางที่ 16 คุณภาพน้ำทะเลตามแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่งจาก 7 สถานีช่วงเดือนตุลาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553

เดือน	สถานี	Parameter			
		DO (mg/L)	Temperature (°C)	Salinity(ppt)	pH
ตุลาคม 2552	คลองด่าน	5.51	31.3	16.6	8.74
	บางทราย	6.06	32.9	9.6	8.4
	อำเภอเมือง	7.09	32.3	14	8.52
	อ่างศิลา	4.95	31.2	21.5	8.45
	บางพระ	6.39	31.1	24.6	8.5
	ศรีราชา	7.65	31	24.4	8.48
	แหลมหัวเตว	5.58	30.7	24	8.49
พฤศจิกายน 2552	คลองด่าน	4.8	29.6	24.58	7.97
	บางทราย	6.9	31.9	21	8.2
	อำเภอเมือง	6.46	32.2	21.8	8.21
	อ่างศิลา	5.91	31.3	24.7	8.21
	บางพระ	5.97	27.3	30.2	8.2
	ศรีราชา	6.07	26.9	30.1	8.06
	แหลมหัวเตว	6	29.6	28.8	8.07
ธันวาคม 2552	คลองด่าน	6.49	27.6	30.1	8.42
	บางทราย	4.8	29	27	7.7
	อำเภอเมือง	4.38	29	28.9	7.93
	อ่างศิลา	6.12	28.2	29.9	7.92
	บางพระ	4.7	29	30	8.4
	ศรีราชา	2.9	29	30	8
	แหลมหัวเตว	5.31	27.4	30.6	8.22
มกราคม 2553	คลองด่าน	7.14	29.6	29.7	8.24
	บางทราย	6.6	25	30	8.2
	อำเภอเมือง	2.53	27.2	23.3	7.7
	อ่างศิลา	5.68	26.8	30.5	7.5
	บางพระ	6.7	27	31	8.6
	ศรีราชา	5	27	30	8.5
	แหลมหัวเตว	4.51	29	30.8	8.1
กุมภาพันธ์ 2553	คลองด่าน	8.91	31.7	24	8.8
	บางทราย	4.2	30	30	7.9
	อำเภอเมือง	2.46	32	24.9	7.64
	อ่างศิลา	4.3	30.8	28.4	7.8
	บางพระ	5.6	30	31	8.3
	ศรีราชา	5.5	30	26	8
	แหลมหัวเตว	4.53	31.2	28.8	7.1
มีนาคม 2553	คลองด่าน	6.39	30.5	26.8	8.2
	บางทราย	4.2	30	30	7.9
	อำเภอเมือง	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	อ่างศิลา	6.61	30.7	29.6	7.51
	บางพระ	6.2	30.1	31	8

	ศรีราชา	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	แหลมท้ายทิว	6.3	30.1	31.2	8
เมษายน 2553	คลองด่าน	5.2	31	26.7	8.11
	บางทราย	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	อำเภอเมือง	2.4	31	29	7.9
	อ่างศิลา	6.34	30.3	29.5	8.2
	บางพระ	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	เกาะลอย				
	แหลมท้ายทิว	6.06	31.5	30.8	7.93
พฤษภาคม 2553	คลองด่าน	6.15	32.3	26.7	8.12
	บางทราย	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	อำเภอเมือง	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	อ่างศิลา	6.51	31.4	29.6	8
	บางพระ	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	ศรีราชา	5.4	33	31	8
	แหลมท้ายทิว	6.21	31.4	30.2	7.74
มิถุนายน 2553	คลองด่าน	6.2	30.3	26.1	8.1
	บางทราย	น้ำลงเลยไม่สามารถวัดคุณภาพน้ำได้			
	อำเภอเมือง	0.2	34	26	8.8
	อ่างศิลา	6.34	32.1	27.5	8.1
	บางพระ	5.1	32	28	8.8
	ศรีราชา	4.8	32	30	8.7
	แหลมท้ายทิว	6.12	31.9	30.4	7.5