

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอเป็นลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวของผู้ป่วยเด็ก

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็กและประเภทของความเจ็บป่วย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวของผู้ป่วยเด็ก

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเด็ก

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน เป็นผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราชบุรี โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเด็กวัยทารกร้อยละ 50 และผู้ป่วยวัยเด็กตอนต้นร้อยละ 50 ซึ่งผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62 การวินิจฉัยโรคที่พบมากที่สุดคือโรคปอดอักเสบ คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ และโรคหลอดลมอักเสบ คิดเป็นร้อยละ 17 และ 12 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับการรักษา 1-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69 โดยมีประเภทของความเจ็บป่วยชนิดเฉียบพลัน ร้อยละ 50 และชนิดเรื้อรัง ร้อยละ 50 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเด็ก ($N=100$)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
วัยของผู้ป่วยเด็ก		
วัยทารก (แรกเกิด-2 ปี)	50	50
วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)	50	50
อายุต่ำสุด = 1 เดือน อายุมากที่สุด = 6 ปี	อายุเฉลี่ย = 2 ปี 5 เดือน ($S.D. = 21.05$)	
เพศ		
ชาย	62	62
หญิง	38	38
การวินิจฉัยโรค		
ปอดอักเสบ	21	21
หลอดลมอักเสบ	12	12
โรคหอบ	10	10
ต่อมทอนซิลอักเสบ	5	5
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน	1	1
กระเพาะและลำไส้อักเสบ	17	17
ท้องเสีย	10	10
ชักจากไข้สูง	2	2
ธาตุเหล็กเกิน	2	2
โลหิตจาง	1	1
เชื้อหุ้มสมองอักเสบ	2	2
ผนังกันหัวใจห้องบนขวาปิดไม่สนิท	1	1
ไข้เลือดออก	1	1
สมองฝ่อ	2	1
การตอบสนองช้า	1	1
ลำไส้อุดตัน	1	1
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	1	1
คาวานชินโครม	3	3
อาเจียน	1	1

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ตับแข็ง	1	1
ฮีโมฟีเลีย เอ	1	1
แพ้ยา	1	1
กลุ่มอาการโรคไต	1	1
หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน	1	1
โรคหัวใจโต	1	1
ความถี่ในการมารับการรักษา		
1-3 ครั้ง	69	69
4-6 ครั้ง	15	15
มากกว่า 6 ครั้ง	16	16
ความถี่ต่ำสุด = 1 ครั้ง ความถี่สูงสุด = 48 ครั้ง	ความถี่เฉลี่ย = 4.86 ครั้ง	(S.D. = 8.33)
ประเภทของความเจ็บป่วย		
เฉียบพลัน (1-7 วัน)	50	50
เรื้อรัง (มากกว่า 7 วัน)	50	50
จำนวนวันต่ำสุด = 2 วัน จำนวนวันสูงสุด = 30 วัน	จำนวนวันเฉลี่ย = 7.91 วัน	(S.D. = 5.99)

2. ครอบครัวของผู้ป่วยเด็ก

สมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่เป็นมารดามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือ บิดา และญาติ คิดเป็นร้อยละ 20 และ 12 ตามลำดับ มีอายุที่อยู่ในช่วง 31 ปีถึง 39 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือมีอายุอยู่ในช่วง 31 ปี ถึง 40 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 และ 15 ตามลำดับ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ปวส. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ ประถมศึกษา และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 28 และ 18 ตามลำดับ ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคืออาชีพค้าขาย และแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 23 และ 16 ตามลำดับ มีรายได้ของครอบครัวอยู่ในช่วง 3,001 บาทถึง 7,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือมีรายได้ของครอบครัวมากกว่า 12,000 และมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23 และ 22 ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ($N = 100$)

ข้อมูลส่วนบุคคลของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย		
บิดา	20	20
มารดา	68	68
ญาติ	12	12
อายุ		
20-29 ปี	9	9
30-39 ปี	41	41
40-49 ปี	35	35
มากกว่า 49 ปี	15	15
อายุต่ำสุด = 20 ปี อายุสูงสุด = 71 ปี	อายุเฉลี่ย = 32 ปี	($S.D. = 9.74$)
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้รับการศึกษา	7	7
ประถมศึกษา	28	28
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. ปวส.	45	45
ปริญญาตรี	18	18
สูงกว่าปริญญาตรี	2	2
อาชีพ		
แม่บ้าน	16	16
เกษตรกร	8	8
รับจ้าง	41	41
ข้าราชการ	12	12
ค้าขาย	23	23
รายได้ของครอบครัว		
น้อยกว่า 3,000 บาท	22	22
3,001- 6,000 บาท	34	34
6,001- 9,000 บาท	11	11
9,001-12,000 บาท	10	10
มากกว่า 12,000 บาท	23	23
รายได้ต่ำสุด = 0 บาท รายได้สูงสุด = 70,000 บาท	รายได้เฉลี่ย = 13,636.95 บาท	($S.D. = 13636.95$)

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

1. ระดับความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม

ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก พบว่า ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.11$) เมื่อ จำแนกเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็กอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการให้ข้อมูล ($\bar{X} = 4.16$) ด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว ($\bar{X} = 4.08$) ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล ($\bar{X} = 4.08$) และการสนับสนุนครอบครัว ($\bar{X} = 3.98$) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โดยจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว	4.08	0.81	มาก
ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล	4.08	0.81	มาก
ด้านการให้ข้อมูล	4.16	0.60	มาก
การสนับสนุนครอบครัว	3.98	0.71	มาก
รวม	4.11	0.87	มาก

2. ระดับความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

2.1 ด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว

ในด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติกับครอบครัวของผู้ป่วยด้วยความสุภาพ มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด คือ 4.20 รองลงมาคือบุคลากรของโรงพยาบาลพูดคุยสมาชิกในครอบครัวด้วยวาจาไพเราะ สุภาพ และบุคลากรของโรงพยาบาลบอกหรือขออนุญาตกับสมาชิกครอบครัวก่อนให้การพยาบาล แก่ผู้ป่วย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 และ 4.11 ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความต้องการการดูแลโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว

ด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว		$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1	บุคลากรของโรงพยาบาลกล่าวคำทักทายหรือแสดงสีหน้ายิ้มแย้มเมื่อพบท่าน	4.02	0.87	มาก
2	บุคลากรของโรงพยาบาลใช้คำสรรพนามเรียกนำหน้า เช่น คุณลุง คุณป้า และคุณ.....นำหน้าชื่อของท่าน เป็นต้น	3.92	0.82	มาก
3	บุคลากรของโรงพยาบาลบอกหรือขออนุญาตท่านหรือสมาชิกครอบครัวก่อนให้การพยาบาลแก่บุตรของท่าน	4.11	0.84	มาก
4	บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติกับท่านและครอบครัวของท่านด้วยความสุภาพ	4.20	0.71	มาก
5	บุคลากรของโรงพยาบาลพูดคุยกับท่านและครอบครัวของท่านด้วยวาจาไพเราะ สุภาพ	4.15	0.83	มาก
รวม		4.08	0.81	มาก

2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล

ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลให้คำแนะนำ สอน สาธิตกิจกรรม การดูแลเด็กแก่ครอบครัวตามที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.31 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวได้ไปส่งเด็กเพื่อตรวจพิเศษ เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล และ สมาชิกในครอบครัวได้ช่วยเหลือเด็กในระหว่างที่เด็กได้รับการทำกิจกรรมการพยาบาล เช่น การวัดปรอท การวัดความดันโลหิต เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และ 4.19 ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความต้องการการดูแลโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล

ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล		$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1	ครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกับบุคลากรของ โรงพยาบาลเกี่ยวกับการตรวจพิเศษ เช่น การเอ็กซเรย์ การตรวจอัลตราซาวด์และการรักษาที่บุตรได้รับ	4.15	0.86	มาก
2	ครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมการ ดูแลเด็กตามความเหมาะสมเช่น การให้ยาทางปาก การดูดเสมหะเป็นต้น	4.10	0.79	มาก
3	ครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือในการดูแลระหว่างที่บุตร ได้รับการตรวจรักษาพยาบาล เช่นการเจาะเลือด การให้สารน้ำทางหลอดเลือด	4.03	0.98	มาก
4	ครอบครัวไปส่งเด็กเพื่อตรวจพิเศษพร้อมกับบุคลากร ของโรงพยาบาล เช่น การตรวจ อัลตราซาวด์ และ การตรวจอื่น ๆ	4.22	0.73	มาก
5	ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลเด็ก ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล	4.17	0.77	มาก
6	บุคลากรของโรงพยาบาลให้คำแนะนำ สอน สาธิต กิจกรรม การดูแลเด็กแก่ครอบครัวตามที่ต้องการ เช่น การเช็ดตัวลดไข้ การดูดเสมหะ การให้นม เป็นต้น	4.31	0.74	มาก
7	ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลเด็ก ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล	4.17	0.77	มาก
8	ครอบครัวช่วยเหลือเด็กในระหว่างที่เด็กได้รับการทำ กิจกรรมการพยาบาล เช่น การวัดปรอท การวัด ความดันโลหิตเป็นต้น	4.19	0.80	มาก
รวม		4.08	0.81	มาก

2.3 ด้านการให้ข้อมูล

ในด้านการให้ข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของบุตรและการรักษาพยาบาลของบุตรกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.40 รองลงมาคือ บุคลากรของโรงพยาบาลเหตุผลการตรวจรักษาต่าง ๆ เช่น ผลการตรวจเลือด การเอ็กซเรย์ปอด และบุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลต่าง ๆ กับครอบครัวด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 และ 4.31 ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในด้านการให้ข้อมูล

	ด้านการให้ข้อมูล	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลต่าง ๆ กับครอบครัวด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	4.31	0.69	มาก
2	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลกับครอบครัวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วย เช่น ที่เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ห้องน้ำ เป็นต้น	3.96	0.81	มาก
3	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลกับครอบครัวเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในหอผู้ป่วยที่ครอบครัวควรปฏิบัติ	3.99	0.78	มาก
4	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลกับครอบครัวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็ก	4.00	0.85	มาก
5	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลกับครอบครัวเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือได้ เมื่อมีปัญหาค่ารักษาพยาบาล การส่งต่อบุตร และสถานที่พยาบาล เป็นต้น	4.08	0.96	มาก
6	บุคลากรของโรงพยาบาลแนะนำท่านพูดคุยกับครอบครัวอื่นที่มีเด็กเจ็บป่วยคล้ายกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์	3.78	1.06	มาก

ตารางที่ 6 (ต่อ)

	ด้านการให้ข้อมูล	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
7	บุคลากรของโรงพยาบาลบอกครอบครัวเกี่ยวกับโรค สาเหตุ อาการ การรักษา ผลของการรักษาและผลกระทบ ของโรคที่มีต่อเด็กด้านต่าง ๆ เช่น การเจริญเติบโต พัฒนาการ สติปัญญา เป็นต้น	4.26	0.81	มาก
8	บุคลากรของโรงพยาบาลอธิบายเหตุผลการตรวจรักษา ต่าง ๆ เช่น ผลการตรวจเลือด การเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น	4.32	0.79	มาก
9	บุคลากรของโรงพยาบาลแจ้งให้ครอบครัวทราบแผนการ รักษาพยาบาลและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา ของบุตร	4.28	0.71	มาก
10	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติการ พยาบาลและขณะปฏิบัติการพยาบาลต่อบุตรกับครอบครัว ทุกครั้ง	4.25	0.71	มาก
11	บุคลากรของโรงพยาบาลตอบคำถามหรืออธิบายให้ ครอบครัวได้เข้าใจเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ	4.30	0.75	มาก
12	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับ ความเจ็บป่วยของบุตรและ การรักษาพยาบาลของบุตรกับ ครอบครัว	4.40	0.71	มาก
13	บุคลากรของโรงพยาบาลอธิบายให้ครอบครัวได้ทราบ เกี่ยวกับเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับเด็ก	4.20	0.81	มาก
	รวม	4.16	0.60	มาก

2.4 ด้านการสนับสนุนครอบครัว

ในด้านการสนับสนุนครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความสนใจใส่ใจดูแลเด็กเป็นอย่างดีทำให้ครอบครัวมั่นใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.46 ลำดับรองลงมาคือบุคลากรของโรงพยาบาลยืดหยุ่นเวลาในการเข้าเยี่ยม เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมบุตรตรงกับเวลาที่ครอบครัวสะดวก และจัดสถานที่ส่วนตัว ให้ครอบครัวพูดคุยปรึกษากับบุคลากรของโรงพยาบาล โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 และ 3.90 ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความต้องการการดูแลโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในด้านการสนับสนุนครอบครัว

ด้านการสนับสนุนครอบครัว		$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1	บุคลากรของโรงพยาบาลถามทุกข์สุขและเป็น ผู้ปลอบใจให้กำลังใจครอบครัว	3.88	0.95	มาก
2	บุคลากรของโรงพยาบาลกระตุ้นให้ครอบครัวพูด ระบายความรู้สึก รับฟังและปลอบใจ	3.69	1.09	มาก
3	บุคลากรของโรงพยาบาลให้ความเอาใจใส่ใจดูแล เด็กเป็นอย่างดีทำให้ครอบครัวมั่นใจ	4.46	0.64	มาก
4	บุคลากรของโรงพยาบาลอนุญาตให้ครอบครัวปฏิบัติ ตามความเชื่อทางศาสนาได้หากไม่ขัดต่อการ รักษาพยาบาล	3.87	1.04	มาก
5	บุคลากรของโรงพยาบาลยืดหยุ่นเวลาในการเข้าเยี่ยม เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมบุตรตรงกับเวลา ที่ครอบครัวสะดวก	4.29	0.86	มาก
6	จัดสถานที่ส่วนตัวให้ครอบครัวพูดคุยปรึกษากับ บุคลากรของโรงพยาบาล	3.90	1.06	มาก
7	จัดสถานที่ส่วนตัวให้ท่านพูดคุยปรึกษากับครอบครัว ของท่าน	3.80	1.06	มาก
รวม		3.98	0.71	มาก

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของ
ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็กและประเภทของความเจ็บป่วย

1. ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก

1.1 ด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ความเคารพแก่
ครอบครัว จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า
ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .08 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า

ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองวัย มีความต้องการการดูแลด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก

ความต้องการการดูแลด้านการให้ ความเคารพแก่ครอบครัว	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
วัยทารก (แรกเกิด-2 ปี)	50	4.19	.73	1.757	98.00	.08
วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)	50	3.96	.57			

1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .34 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองวัย มีความต้องการการดูแลด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก

ความต้องการการดูแลด้านการมี ส่วนร่วมในการดูแล	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
วัยทารก (แรกเกิด-2 ปี)	50	4.22	.70	.953	88.7	.343
วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)	50	4.10	.50			

1.3 ด้านการให้ข้อมูล

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูล จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .33 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองวัย มีความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูลไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูล จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก

ความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูล	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
วัยทารก (แรกเกิด-2 ปี)	50	4.22	.66	.975	98	.332
วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)	50	4.10	.54			

1.4 ด้านการสนับสนุนครอบครัว

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการสนับสนุนครอบครัว จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .41 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองวัย มีความต้องการการดูแลด้านการสนับสนุนครอบครัวไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการสนับสนุนครอบครัว จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก

ความต้องการการดูแลด้านการสนับสนุนครอบครัว	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
วัยทารก (แรกเกิด-2 ปี)	50	4.04	.76	.816	98	.416
วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)	50	3.92	.66			

1.5 ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .24 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองวัย มีความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกตามวัยของผู้ป่วยเด็ก

ความต้องการการดูแลโดยเน้น ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
วัยทารก (แรกเกิด-2 ปี)	50	4.18	.64	1.180	98	.241
วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)	50	4.04	.49			

2. ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วยผู้ป่วยเด็ก

2.1 ด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .06 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองประเภท มีความต้องการการดูแลด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัวไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ความเคารพแก่ครอบครัว
จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย

ความต้องการการดูแลด้านการให้ ความเคารพแก่ครอบครัว	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
ประเภทเฉียบพลัน	50	4.20	.69	1.882	98	.063
ประเภทเรื้อรัง	50	3.95	.62			

2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .34 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองประเภท มีความต้องการการดูแลด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย

ความต้องการการดูแลด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
ประเภทเฉียบพลัน	50	4.22	.70	.953	88.7	.343
ประเภทเรื้อรัง	50	4.10	.50			

2.3 ด้านการให้ข้อมูล

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูลจำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .99 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองประเภท มีความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูลไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูล จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย

ความต้องการการดูแลด้านการให้ข้อมูล	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
ประเภทเฉียบพลัน	50	4.16	.63	-.013	98	.990
ประเภทเรื้อรัง	50	4.16	.58			

2.4 ด้านการสนับสนุนครอบครัว

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการสนับสนุนครอบครัว จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .64 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองประเภท มีความต้องการการดูแลด้านการสนับสนุนครอบครัวไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 16

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านการสนับสนุนครอบครัว จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย

ความต้องการการดูแล ด้านการสนับสนุนครอบครัว	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
ประเภทเฉียบพลัน	50	3.95	.74	-.457	98	.649
ประเภทเรื้อรัง	50	4.01	.69			

2.5 ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยรวม

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับนัยสำคัญที่ได้จากการคำนวณ .24 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กทั้งสองประเภท มีความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำแนกตามประเภทของความเจ็บป่วย โดยรวม

ความต้องการการดูแลโดยเน้น ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	df	p
วัยทารก (แรกเกิด-2 ปี)	50	4.13	.59	.427	98	.670
วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)	50	4.03	.56			