



## รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรดไขมันตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต  
ของลูกกุ้งการ์ตูน (*Hymenocera picta*, Dana 1852) เปรียบเทียบกับไข่กุ้งการ์ตูน  
ลูกกุ้งการ์ตูนแรกฟักและกุ้งการ์ตูนวัยรุ่นจากธรรมชาติ

Characterisation of the changing fatty acids composition across the larval stages  
of Harlequin shrimp (*Hymenocera picta*, Dana 1852) using eggs,  
wild newly hatched and juvenile shrimp as standards

ดร. จารุพันธ์ ประทุมยศ  
นางณิชา สิรินนท์ธนา

178653

A80110651

14 ส.ค. 2558

356759

มีนาคม 2556

ไม่บริการ

27 ส.ย. 2559

## รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรดไขมันตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต  
ของลูกกุ้งก้ามกราม (*Hymenocera picta*, Dana 1852) เปรียบเทียบกับไขกุ้งก้ามกราม  
ลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักและกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นจากธรรมชาติ

Characterisation of the changing fatty acids composition across the larval stages  
of Harlequin shrimp (*Hymenocera picta*, Dana 1852) using eggs,  
wild newly hatched and juvenile shrimp as standards

ดร. จารุพันธ์ ประถมยศ  
นางณิชา สิรินนท์ธนา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ. เมือง จ. ชลบุรี

สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา  
และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ  
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา



## กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ  
สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษางบประมาณปี พ.ศ. 2555 จากสำนักคณะกรรมการการ  
อุดมศึกษา (สกอ) ในการนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างมากมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณ  
นางสาววิรัช เจริญดี ที่อนุเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำและขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันวิทยาศาสตร์  
ทางทะเลท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

## คำอธิบายคำย่อ

ARA = กรดไขมันอาราชิโดนิก (Arachidonic acid, C20:4n-6)

DHA = กรดไขมันโดโคซะเฮกซะอีโนอิก (Docosahexaenoic acid, C22:6n-3)

EPA = กรดไขมันไอโคซะเพนตะอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid, C20:5n-3)

LNA = กรดไขมันลิโนลินิก (Linolenic acid, C18:3n-3)

HUFA = กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนโซ่ยาวทั้งหมด

MUFA = กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด

PUFA = กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด

SFA = กรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรดไขมันตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต  
ของลูกกึ่งการทูน (*Hymenocera picta*, Dana 1852) เปรียบเทียบกับไขกึ่งการทูน  
ลูกกึ่งการทูนแรกฟักและกึ่งการทูนวัยรุ่นจากธรรมชาติ

จารุพันธ์ ประทุมยศ และ ณิชชา สิรินนท์ธนา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

บทคัดย่อ

กึ่งการทูน (*Hymenocera picta*, Dana 1852) เป็นกึ่งทะเลสวยงามที่มีมูลค่าในการซื้อขายสูง การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการกรดไขมันของลูกกึ่งการทูนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเพาะเลี้ยงลูกกึ่งการทูนประสบปัญหาการรอดตายต่ำ ความแตกต่างระหว่างกรดไขมันในกึ่งการทูนจากธรรมชาติ (ไขกึ่งการทูน ลูกกึ่งการทูนแรกฟักและกึ่งการทูนวัยรุ่น) และลูกกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงในระยะพัฒนาการต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงกึ่งการทูนโดยวิธีการเสริมอาหารในการอนุบาลลูกกึ่งการทูนครั้งนี้ให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหารลูกกึ่งการทูนและใส่เตตราเซลมิส คีโตเชอโรสและไอโซโคเลซิสอัตรารส่วน 1:0.5:0.5 ลงในถังอนุบาลเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำและเป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์เหล่านี้

ผลการทดลองพบว่าปริมาณไขมันในไขกึ่งและลูกกึ่งแรกฟักมีมากที่สุดและในกึ่งการทูนวัยรุ่นมีน้อยที่สุด ซึ่งปริมาณไขมันในลูกกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงลดลงตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต แสดงว่าไขมันถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อการเจริญเติบโต กึ่งการทูนจากธรรมชาติมีกรดไขมันอิ่มตัว (SFA) มากที่สุด รองลงมาคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) ซึ่งตรงกันข้ามกับลูกกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA) มากที่สุดรองลงมาคือกรดไขมันอิ่มตัว (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) ความแตกต่างของกรดไขมันในกึ่งการทูนจากธรรมชาติและกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงแสดงถึงความไม่เหมาะสมของกรดไขมันในอาหารลูกกึ่งการทูนในการศึกษาครั้งนี้กึ่งการทูนจากธรรมชาติและกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) กรดไขมันสเตียริก (C18:0) กรดไขมันปาล์มิติลิติก (C16:1 n-7) และกรดไขมันโอลิติก (C18:1 n-9) เป็นองค์ประกอบกรดไขมันหลักแต่ลูกกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันไมริสติก (C14:0) กรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) และกรดไขมันปาล์มิติลิติก (C16:1 n-7) ลดลงตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตแสดงถึงความสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานของของกรดไขมันสองชนิดนี้มากกว่ากรดไขมันสเตียริก (C18:0) และ กรดไขมันโอลิติก (C18:1 n-9) นอกจากนี้กึ่งการทูนวัยรุ่นจากธรรมชาติยังมีกรดไขมันอีพีเอเป็นองค์ประกอบสูงถึง 19 เปอร์เซนต์ ในขณะที่ลูกกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ต่ำแสดงถึงความสำคัญของกรดไขมันชนิดนี้ในการเป็นองค์ประกอบเซลล์เนื้อเยื่อในการเจริญเติบโตและลูกกึ่งการทูนจากการเพาะเลี้ยงสะสมกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกกึ่งการทูนแรกเกิดและกึ่ง



การกักตุนไขมันมีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ลูกกักตุนจากการเพาะเลี้ยงระยะลงเกาะมีการสะสมกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ปริมาณสูงถึง 17 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นลูกกักตุนจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันดีเอชเอมากเพียงพอสำหรับการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโต ในกักตุนธรรมชาติไม่พบกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) แต่ในลูกกักตุนจากการเพาะเลี้ยงพบกรดไขมันชนิดนี้ในปริมาณเล็กน้อยอาจเป็นไปได้ว่ากักตุนต้องการกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 6 น้อย กักตุนธรรมชาติมีปริมาณกรดไขมันลิโนลิค (C18:3n-3) น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์แต่ไม่พบกรดไขมันชนิดนี้ในลูกกักตุนจากการเพาะเลี้ยง ประกอบกับกรดไขมันอีพีเอ มีปริมาณลดลงและยังพบกรดไขมันตัวกลางของกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันโซยาวกลุ่มโอเมกา 3 แสดงว่ากรดไขมันลิโนลิค (C18:3n-3) อาจถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานและสังเคราะห์กรดไขมันอีพีเอ (C18:3n-3) กักตุนวัยรุ่นมีอัตราส่วนกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3)/กรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ประมาณ 0.3 และมีอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3/โอเมกา 6 ประมาณ 44 แสดงถึงความสำคัญของกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกกักตุน

จากการศึกษาี้สรุปว่าการอนุบาลลูกกักตุนด้วยวิธีการใส่สาหร่ายผสม 3 ชนิดในถังเลี้ยงนั้น ลูกกักตุนสามารถพัฒนาจนกว่าตัวลงเกาะได้แต่อัตราส่วนแพลงก์ตอนพืชที่ใช้ในการทดลองนี้ไม่เหมาะสมกับความต้องการกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา 3 ของลูกกักตุนโดยเฉพาะกรดไขมันอีพีเอ ดังนั้น การเสริมคุณค่าอาหารในอาหารลูกกักตุนควรเลือกใช้แพลงก์ตอนพืชที่มีกรดไขมันอีพีเอสูงและปรับอัตราส่วนแพลงก์ตอนพืชที่ใช้ให้มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับกรดไขมันในกักตุนธรรมชาติหรืออาจเสริมกรดไขมันอีพีเอในอาร์ทีเมียโดยตรง

คำสำคัญ: กักตุน *Hymenocera picta* กรดไขมัน ดีเอชเอ อีพีเอ เออาร์เอ

**Characterisation of the changing fatty acid composition across the larval stages  
of harlequin shrimp (*Hymenocera picta*) using eggs, wild newly hatched  
and juvenile shrimp as standards**

Jarunan Pratoomyot and Nisa Siranonthana

Institute of Marine Science, Burapha University, Chonburi, THAILAND 20131

**Abstract**

The colourful harlequin shrimp, *Hymenocera picta*, Dana 1852, is a valuable and attractive marine ornamental species. Low survival, however, remains a bottleneck to their sustainable and successful culture. Little, for example, is known regarding their fatty acid requirements. By determining the fatty acid profiles and the requirements of different stages of wild shrimp (*i.e.* in eggs, newly hatched and juvenile shrimp) and then by comparing those to the fatty acid profiles in larval cultured shrimp could facilitate the development of appropriate enriched diets and culture techniques. The fatty acid composition in the wild harlequin shrimp and 13 larval stages (12 zoeal and the settling stage) of cultured *H. picta* were compared. In the present study, rotifers and newly hatched *Artemia* were used as feed items. In addition, a 1:0.5:0.5 mix of *Tetraselmis* sp., *Chaetoceros calcitrans* and *Isochrysis galbana* was added to the shrimp rearing tanks to sustain the zooplankton and to improve water quality.

Of the wild shrimp samples, the eggs and the newly hatched stage had the highest lipid content whilst the juvenile shrimp had the lowest. The lipid content of the cultured larval shrimp was observed to decrease as the shrimp developed indicating that lipid was used as an energy source for growth. The rank order of the fatty acid composition of the wild shrimp was saturated fatty acids > monounsaturated fatty acids > polyunsaturated fatty acids, whilst the rank order of that determined in the cultured shrimp was monounsaturated fatty acids > saturated fatty acids > polyunsaturated fatty acids. This observed difference in the fatty acid composition between the two sample groups of shrimp indicated an imbalance in the fatty acids provided in the feed items that were used in this study. Palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0), palmitoleic acid (C16:1n-7) and oleic acid (C18:1n-9) were the main fatty acids found in both collections of shrimp. The myristic acid (C14:0) palmitic acid (C16:0) and



palmitoleic acid (C16:1n-7) content of the cultured shrimp, however, was observed to drop with larval development signifying that these fatty acids were catabolised as an energy source at a higher rate than stearic acid (C18:0) and oleic acid (C18:1n-9). In addition, the wild juvenile shrimp were found to contain up to 19% eicosapentaenoic acid (EPA) (C20:5n-3), an essential component in the formation of cell membranes. The EPA content of the cultured shrimp, by comparison, was only 4% indicating an insufficient accumulation of EPA. Both the newly hatched and juvenile wild shrimp had approximately 6% docosahexaenoic acid (DHA) (C22:6n-3), whilst the cultured shrimp had up to 17% DHA suggesting they had sufficient levels for growth. The wild shrimp were found no detectable arachidonic acid, ARA (20:4n-6) whilst the ARA was found in small amounts in the cultured shrimp samples, possibly the shrimp favour less n-6 HUFA. The wild shrimp were also found to contain less than 1% linolenic acid (LNA) (C18:3n-3), however, this fatty acid was not found in the cultured larval shrimp. In the later developmental stages, the intermediate substrates for n-3 fatty acid biosynthesis C18:4n-3, C20:3n-3 and C20:4n-3 were found in association with decreased levels of EPA. This latter finding suggests that LNA was probably used as an energy source and as a substrate for fatty acid biosynthesis. The ratios of DHA:EPA and that of n-3 PUFA:n-6 PUFA in wild juvenile shrimp were determined to be 0.3 and 44 respectively, highlight the importance of n-3 HUFA for good growth and the survival of harlequin shrimp. These findings suggest that the low ratio of DHA:EPA and the high ratio of n-3 PUFA:n-6 PUFA in the shrimp diet should be considered and addressed as a strategic component of a progressive programme of culture practice.

From this study, it can be concluded that the harlequin shrimp cultured in green water allowed the larvae to develop to the post-larval stage but the composition of phytoplankton that was used did not meet the n-3 PUFA requirements of the harlequin shrimp, most notably EPA. Enrichment of the shrimp diet through the addition of commercial EPA source into the diet or an appropriate mix of EPA-rich phytoplankton species, so that it closely mirrors the n-3 PUFA of wild shrimp, should be considered.

Key words: Harlequin *Hymenocera picta* fatty acid DHA EPA ARA



# สารบัญ

## หน้า

### เรื่อง

ชื่อเรื่องการวิจัย

กิตติกรรมประกาศ

คำอธิบายคำย่อ

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

สารบัญ

i

สารบัญภาพ

ii

สารบัญตาราง

v

บทนำ

1

วิธีดำเนินการวิจัย

6

ผลการวิจัย

15

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

43

ข้อเสนอแนะ

53

ผลผลิต

54

บรรณานุกรม

55

ภาคผนวก ก การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

68

ภาคผนวก ข รายงานสรุปการเงิน

120

ภาคผนวก ค ประวัตินักวิจัย

122

# สารบัญภาพ

| ภาพที่                                                                                                                                                                                                                                               | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ภาพที่ 1 พ่อแม่พันธุ์กึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> )                                                                                                                                                                                                  | 8    |
| ภาพที่ 2 การอนุบาลลูกกึ่งการตูนถึงไฟเบอร์กลาส                                                                                                                                                                                                        | 10   |
| ภาพที่ 3 พัฒนาการกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> ) ระยะชูเอียะ 1 ถึงระยะชูเอียะ 2                                                                                                                                                                       | 16   |
| ภาพที่ 4 พัฒนาการส่วนหางของลูกกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> )                                                                                                                                                                                         | 17   |
| ภาพที่ 5 พัฒนาการส่วนกรีของลูกกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> )                                                                                                                                                                                         | 18   |
| ภาพที่ 6 พัฒนาการระยะขาว่ายน้ำของลูกกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> )                                                                                                                                                                                   | 19   |
| ภาพที่ 7 ลูกกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> ) ระยะลงเกาะ                                                                                                                                                                                                | 20   |
| ภาพที่ 8 โปรโตซัวชูโอแทมเนียมเกาะบนลูกกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> )                                                                                                                                                                                 | 20   |
| ภาพที่ 9 ปริมาณไขมันในลูกกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> ) แข็งแรงและลูกกึ่งการตูนอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยง                                                                                                                                                | 22   |
| ภาพที่ 10 แสดงกรดไขมันในไขกึ่งการตูน ( <i>H. picta</i> ) ลูกกึ่งการตูนแรกฟักและกึ่งการตูนวัยรุ่น                                                                                                                                                     | 27   |
| ภาพที่ 11 แสดงกรดไขมันไมริสติก (C14:0) และปาล์มิติก (C16:0) ในลูกกึ่งการตูนจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกึ่งการตูนแข็งแรงและลูกกึ่งการตูนอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกรดไขมันในกึ่งการตูนจากธรรมชาติ (ไขกึ่งการตูน ลูกกึ่งการตูนแรกฟักและกึ่งการตูนวัยรุ่น)        | 31   |
| ภาพที่ 12 แสดงกรดไขมันสเตียริก (C18:0) และกรดไขมันอะราซิดิก (C20:0) ในลูกกึ่งการตูนจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกึ่งการตูนแข็งแรงและลูกกึ่งการตูนอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกึ่งการตูนจากธรรมชาติ (ไขกึ่งการตูน ลูกกึ่งการตูนแรกฟักและกึ่งการตูนวัยรุ่น)          | 32   |
| ภาพที่ 13 แสดงกรดไขมัน behenic (C22:0) และกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) ในลูกกึ่งการตูนจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกึ่งการตูนแข็งแรงและลูกกึ่งการตูนอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกึ่งการตูนการตูนจากธรรมชาติ (ไขกึ่งการตูน ลูกกึ่งการตูนแรกฟักและกึ่งการตูนวัยรุ่น) | 33   |

- ภาพที่ 14 แสดงกรดไขมันปาล์มมีโตลิค (C16:1n-7) และโอลิค (C18:1n-9) ในลูกกุ้งการันจาก การเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น) 34
- ภาพที่ 15 แสดงกรดไขมัน C20:1 (n7-n9) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในลูกกุ้งการันจาก การเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น) 35
- ภาพที่ 16 แสดงกรดไขมันลิโนลิค (C18:2n-6) และกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในลูกกุ้งการันจาก การเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น) 36
- ภาพที่ 17 แสดงกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา3 และโอเมกา6 ในลูกกุ้งการันจาก การเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น) 37
- ภาพที่ 18 แสดงกรดไขมันลิโนลิค C18:3n-3 และ C18:4n-3 ในลูกกุ้งการันจาก การเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น) 38
- ภาพที่ 19 แสดงกรดไขมัน C20:3n-3 และ C20:4n-3 ในลูกกุ้งการันจาก การเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น) 39
- ภาพที่ 20 แสดงกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) ในลูกกุ้งการันจาก การเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น) 40



ภาพที่ 21 แสดงกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (n-3,n-6 PUFA)และกรดไขมันไม่อิ่มตัว  
 เชิงซ้อนโซ่ยาว (n-3, n-6 HUFA) ในลูกกุ้งการังจากการเพาะเลี้ยง  
 (ลูกกุ้งการังแข็งแรงและลูกกุ้งการังอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับลูกกุ้งการัง  
 จากธรรมชาติ(ไข่กุ้งการังการัง ลูกกุ้งการังแรกฟักและกุ้งการังวัยรุ่น)

41

ภาพที่ 22 แสดงอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน n-3 PUFA / n-6 PUFA  
 และกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) และอีพีเอ (C20:5n-3) ในลูกกุ้งการัง  
 จากการเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการังแข็งแรงและลูกกุ้งการังอ่อนแอ) เปรียบเทียบ  
 กับกุ้งการังการังจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการังการัง ลูกกุ้งการังแรกฟัก  
 และกุ้งการังวัยรุ่น)

42

# สารบัญตาราง

## ตารางที่

## หน้า

|                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ตารางที่ 1 ปริมาณไขมัน (%น้ำหนักสด) ในกึ่งการตุนจากธรรมชาติ (ไข่กึ่งการตุน<br>ลูกกึ่งการตุนแรกฟัก และกึ่งการตุนวัยรุ่น) และในลูกกึ่งการตุนจากการ<br>เพาะเลี้ยง (ระยะชูเอี้ยงะจนถึงระยะลงเกาะ) | 21 |
| ตารางที่ 2 กรดไขมันในอาร์ทีเมียที่กินแพลงก์ตอนพืชผสมระหว่างเตตราเซลมิส<br>คีโตเซอรัส และไอโซโครซิส ในอัตราส่วน 1:0.5:0.5 เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง                                              | 23 |
| ตารางที่ 3 องค์ประกอบกรดไขมันในกึ่งการตุน ( <i>H. picta</i> ) จากธรรมชาติ (ไข่กึ่งการตุน<br>ลูกกึ่งการตุนแรกฟัก กึ่งการตุนวัยรุ่น) และ ลูกกึ่งการตุนจากการเพาะเลี้ยง                          | 28 |

## บทนำ

### ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ความต้องการสัตว์ทะเลสวยงามในการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อธุรกิจการค้าขายสัตว์น้ำส่งผลกระทบต่อประชากรสัตว์น้ำทะเลสวยงามรวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มกั้ง กุ้ง ปู (Decapods) ในธรรมชาติอย่างมาก (Calado *et al.*, 2003a; Calado *et al.*, 2009; Wabnitz, *et al.*, 2003) กุ้งการ์ตูนหรือกุ้งตัวตลก (*Hymenocera picta*, Dana 1852) เป็นกุ้งทะเลสวยงามชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามและมีราคาซื้อขายสูง (Calado, 2008) นอกจากนี้ ความต้องการกุ้งสวยงามทะเลชนิดนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนกั้งในธรรมชาติลดลง การวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทดแทนการจับกุ้งการ์ตูนจากธรรมชาติโดยการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังสามารถสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนให้เป็นอาชีพได้

เทคนิคในการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักและยังต้องมีการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จระดับเชิงพาณิชย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้พยายามพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนเพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมากและมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เชิงการค้าระดับเชิงพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ลูกกุ้งการ์ตูนมีการรอดตายต่ำ และจากรายงานการวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ พบว่าการรอดตายของสัตว์น้ำวัยอ่อนเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราความหนาแน่นของลูกกุ้งที่เลี้ยง (Calado *et al.*, 2005a) ชนิดของอาหารและขนาดอาหารที่เหมาะสม (Zhang *et al.*, 1998; Rhyne, 2002) พฤติกรรมการกินอาหาร (Sewell, 2007) ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตจนกระทั่งลงเกาะที่ยาวนาน (Lin *et al.*, 2001) และปัจจัยด้านคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม (Raabe & Raabe, 2007; Lin & Zhang 2001; Rueda & Martinez 2001, Lin & Shi 2002; Calado, 2008)

องค์ประกอบกรดไขมันในแพลงก์ตอนสัตว์ที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำในธรรมชาติอาจจะเป็นกรดไขมันที่ใกล้เคียงกับกรดไขมันที่สัตว์น้ำต้องการ (Hamre *et al.*, 2008) และใกล้เคียงกับกรดไขมันที่ได้รับจากอาหารและที่สะสมในสัตว์น้ำด้วย (Fernandez-Reiriz *et al.*, 2011; Leonardo & Lucas, 2000) ซึ่งปริมาณกรดไขมันที่วิเคราะห์จากเนื้อเยื่อสัตว์น้ำจากธรรมชาติสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการกรดไขมันของสัตว์น้ำ (D'Abrahamo & sheen, 1993) ส่วนองค์ประกอบกรดไขมันในไข่หรือในลูกกุ้งแรกเกิดจากธรรมชาติอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสารอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้งในระยะต่อไปได้ Izquierdo & Fernandez-Palacios (1997) แบ่งวิธีการศึกษาความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การศึกษาองค์ประกอบสารอาหารในไข่เปรียบเทียบกับสารอาหารในสัตว์น้ำวัยอ่อน การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบสารอาหารในสัตว์น้ำอายุเดียวกันที่อดอาหารและกินอาหาร และการศึกษาทดลองอาหารที่ควบคุมระดับสารอาหารที่ต้องการศึกษา



ในการวิจัยครั้งนี้ทำการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) แรกฟักจนกระทั่งลูกกุ้งก้ามกรามตัวตัวลงเกาะและให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร นอกจากนี้ในการอนุบาลใส่แพลงก์ตอนพืชผสมระหว่างเตตราเซลมิส:คีโตเซออส:ไอโซโคลซิส อัตราส่วน 1:0.5:0.5 ในถังอนุบาล (การเลี้ยงแบบ green water) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำและเป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ และเปรียบเทียบองค์ประกอบกรดไขมันในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงตลอดระยะพัฒนาการจนกว่าตัวลงเกาะกับกรดไขมันในกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติ (ไขกุ้งก้ามกราม ลูกกุ้งก้ามกรามแรกเกิดและกุ้งก้ามกรามวัยรุ่น)

### วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 2.1 ศึกษาถึงชนิดและปริมาณกรดไขมันในจากธรรมชาติ (ไขกุ้งก้ามกราม ลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟัก กุ้งก้ามกรามวัยรุ่น)
- 2.2 ศึกษาถึงชนิดและปริมาณกรดไขมันในลูกกุ้งก้ามกรามระยะพัฒนาการต่างๆตลอดระยะพัฒนาการจนกระทั่งลูกกุ้งก้ามกรามตัวตัวลงเกาะ
- 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของกรดไขมันระหว่างลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงและกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติ

### ขอบเขตของการวิจัย

อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) แรกเกิดจนกระทั่งตัวตัวลงเกาะ ในขณะเดียวกัน ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรดไขมันในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงในระยะพัฒนาการเจริญเติบโตต่างๆและเปรียบเทียบกับกรดไขมันในกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติ (ไขกุ้งก้ามกราม ลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟัก กุ้งก้ามกรามวัยรุ่น)

### หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กรมประมง และ สถาบันวิจัยต่างๆ เป็นต้น
2. สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ใช้องค์ความรู้ประกอบการเรียน การสอน ฯลฯ ในระดับวิชาชีพ หรืออุดมศึกษา
3. บริษัทเอกชน/เกษตรกรผู้สนใจหรือผู้มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์สวยงามทะเล



## ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย

ในการเพาะเลี้ยงกุ้งการกักตุนยังขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการสารอาหารของลูกกุ้ง การกักตุน ดังนั้น จึงควรศึกษาความต้องการสารอาหารของลูกกุ้งการกักตุนเพื่อเป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนี้ สัตว์น้ำวัยอ่อนแต่ละชนิดในแต่ละระยะพัฒนาการเจริญเติบโตต้องการกรดไขมันในอาหารแตกต่างกัน Calado *et al.*, (2005b) ในสัตว์น้ำกลุ่มกุ้งกั้งและปูที่ได้รับชนิดและสัดส่วนกรดไขมันในอาหารไม่เหมาะสมมีผลมีการเจริญเติบโตและการลอกคราบช้าลงและมีการรอดตายต่ำ (Naessens *et al.* 1997; Wouters *et al.* 1999; Harlioglu *et al.*, 2012; Suprayudi *et al.*, 2002ab; Supraudi, Takeuchi & Hamasaki, 2004; Calado *et al.*, 2005b) ถึงแม้ว่าสัตว์น้ำเหล่านี้สามารถสังเคราะห์กรดไขมันโซยาวได้จากกรดไขมันที่มีโซสั้นโดยการเพิ่มพันธะคู่ (desaturation) และการเพิ่มความยาวของไฮโดรคาร์บอน (elongation) แต่อย่างไรก็ตาม สัตว์น้ำเหล่านี้โดยเฉพาะสัตว์ทะเลไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันที่จำเป็นแก่ร่างกายได้และสัตว์น้ำจะได้รับกรดไขมันที่จำเป็นเหล่านี้โดยการกินอาหารเท่านั้น (Kanasawa *et al.*, 1979; Sargent *et al.*, 1999; Bell & Sargent 2003) และกรดไขมันที่จำเป็นได้แก่ กรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา 3 คือ กรดไขมันลิโนลิค (C18:3n-3) กรดไขมันไอโคซะเพนตะอีโนอิก (อีพีเอ, C20:5n-3) กรดไขมันโดโคซะเฮกซะอีโนอิก (ดีเอชเอ, C22:6n-3) และ กรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา 6 คือ กรดไขมันลิโนลิค (C18:2n-6) กรดไขมันอาราคิโดนิก (เออาร์เอ, C20:4n-6) ซึ่งกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) อีพีเอ (C20:5n-3) และ ดีเอชเอ (C22:6n-3) นอกจากเป็นองค์ประกอบหลักของฟอสโฟลิปิดที่เป็นของโครงสร้างเซลล์เมมเบรนแล้ว กรดไขมันเหล่านี้ก็เป็นแหล่งพลังงานของสัตว์น้ำระยะวัยอ่อนที่มีพัฒนาการในการเจริญเติบโตสูงด้วย (Sargent *et al.*, 2002) ลูกกุ้งการกักตุนมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบซึ่งต้องใช้พลังงานในการลอกคราบมากในแต่ละครั้งประกอบกับลูกกุ้งการกักตุนมีพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลามากกว่า 1 เดือนก่อนที่จะคว่ำตัวลงเกาะ ดังนั้น การที่ลูกกุ้งการกักตุนมีอัตราการรอดตายต่ำจึงอาจจะเกี่ยวข้องกับปริมาณกรดไขมันแต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเซลล์อาจจะไม่เพียงพอมีผลให้ลูกกุ้งตาย ดังนั้น การทราบถึงองค์ประกอบกรดไขมันในกุ้งการกักตุนจากธรรมชาติ (ไขกุ้งการกักตุน ลูกกุ้งการกักตุนแรกเกิดและกุ้งการกักตุนวัยรุ่น) และเปรียบเทียบกับองค์ประกอบกรดไขมันในลูกกุ้งการกักตุนจากการเพาะเลี้ยงตลอดระยะพัฒนาการจนคว่ำตัวลงเกาะ ซึ่งความแตกต่างของกรดไขมันระหว่างกุ้งการกักตุนธรรมชาติและกุ้งการกักตุนจากการเพาะเลี้ยงทำให้ทราบถึงความต้องการกรดไขมันของลูกกุ้งการกักตุนเพื่อการเจริญเติบโตและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกกุ้งการกักตุนโดยการเสริมกรดไขมันในอาหารให้ตรงตามความต้องการของลูกกุ้งการกักตุน

## การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

กุ้งการ์ตูนจัดอยู่ใน Kingdom: Animalia; Phylum: Arthropoda; Subphylum: Crustacea; Class: Malacostraca; Subclass: Eumalacostrata; Order: Decapoda; Suborder: Pleocyemata; Infraorder: Caridea; Superfamily: Palaemonoidea (Brusca & Brusca, 1990; Holthuis, 1955 อ้างโดย Fiedler, 2000; Calado, 2008) Family: Hymenoceridae; Genus: *Hymenocera*; Species: *picta* (Dana, 1852) (Martin & David, 2001 อ้างโดย Calado, 2008) กุ้งการ์ตูน (*Hymenocera picta*, Dana, 1852) มีลำตัวสีขาวและมีลวดลายสวยงามแตกต่างกันในแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัย พบได้ในบริเวณที่มีระดับน้ำลึก 1-30 เมตร (Fielder, 2002) กุ้งการ์ตูนอาศัยในมหาสมุทร Indo-Western Pacific มีพื้นลำตัวสีขาว มีลายจุดแต้มโทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินบริเวณขอบด้านนอก ส่วนกุ้งการ์ตูนที่อาศัยในมหาสมุทร Central-Eastern Pacific มีพื้นลำตัวสีขาว มีลายจุดแต้มโทนสีม่วงหรือสีม่วงอมแดง และกุ้งการ์ตูนจากทั้งสองบริเวณมีสีเหลือง สีเหลืองอมส้มหรือสีน้ำตาลอยู่ภายในลายจุดแต้มและมีลวดลายสีน้ำเงิน สีขาว สีเหลือง สีน้ำตาลที่ก้ามและบริเวณส่วนหัว กุ้งการ์ตูนมีลำตัวสั้นและกว้าง ส่วนหัวประกอบด้วย carapace มีกรีเล็กและยื่นไปไม่ยาวกว่าตา มี antennules antennae maxillipeds ซึ่งเป็นอวัยวะช่วยในการรับรู้สัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีขาเดิน (pereiopods) ทั้งหมด 5 คู่ ขาเดิน 2 คู่แรกเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เป็นอวัยวะสำหรับจับกินอาหารหรือตะล่อมอาหาร โดยกุ้งการ์ตูนใช้ขาเดินคู่ที่ 1 เกาะผิวผนังชั้นนอกของดาวทะเลโดยการเกาะที่ละน้อยจนกระทั่งเป็นรอยแผลเปิดขนาดใหญ่ จากนั้นกุ้งการ์ตูนจะเปลี่ยนมาใช้ขาเดินคู่ที่ 2 ซึ่งบริเวณปลายขามีลักษณะคล้ายกำมปู (claws) สำหรับตัดหรือคีบอาหาร นอกจากนี้ ขาเดินคู่ที่ 2 ยังสามารถใช้เป็นอาวุธสำหรับต่อสู้ป้องกันตัวเองด้วย ส่วนขาเดินที่เหลือจำนวน 3 คู่ ซึ่งมีความยาวประมาณ 2-3 นิ้ว สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ ในกุ้งการ์ตูนเพศเมียบริเวณท้องใต้ขาว่ายน้ำมีอวัยวะสำหรับให้ไข่มาเกาะติด (Calado, 2008) กุ้งการ์ตูนมีพฤติกรรมหวนถิ่นที่อยู่อาศัยและในประเทศไทยพบกุ้งการ์ตูนอาศัยอยู่ตามโพรงหิน โพรงปะการัง หรือซอกหินที่ค่อนข้างมืดบริเวณแนวปะการังในทะเลอันดามัน แถบจังหวัดกระบี่ พังงา และ ภูเก็ต เป็นต้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 2552, อูราณี 2552)

รายงานการศึกษาวิจัยในกุ้งการ์ตูนยังมีไม่แพร่หลายมากนัก จากรายงานการวิจัยเหล่านี้พบว่ากุ้งการ์ตูนเพศเมียวางไข่ครั้งละ 100-5,000 ฟอง ทุกๆ 18-26 วัน ลูกกุ้งการ์ตูนมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตทั้งหมด 13 ระยะ (ระยะชูเอี้ยงะ 1-12 และระยะคว่ำตัวลงเกาะ) และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาการจนกระทั่งลงเกาะประมาณ 5-6 สัปดาห์ (Fielder, 1994) หรือ 34-57 วัน และจำนวนลูกกุ้งการ์ตูนลงเกาะมากที่สุดเมื่ออายุประมาณ 40-44 วัน (Sean, 2010) ลูกกุ้งการ์ตูนที่เพิ่งลงเกาะมีลำตัวใส สีเหลืองถึงสีชมพู และยังไม่กินอาหารหลังจากลงเกาะประมาณ 3-4 วัน หลังจากลูกกุ้งลอกคราบประมาณ 1-2 ครั้ง สีบนลำตัวของลูกกุ้งการ์ตูนเริ่มปรากฏให้เห็นเหมือนสีของกุ้งการ์ตูนตัวเต็มวัย (Fiedler, 1994; Sean, 2010)



ลูกกุ้งการ์ตูนเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ อัตราการเจริญเติบโตของลูกกุ้งการ์ตูนโดยการลอกคราบขึ้นอยู่กับสุขภาพกุ้งและอาหารที่ได้รับ (Raabe and Raabe, 2007) และอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ก็มีผลต่อผลผลิตลูกกุ้งการ์ตูน (Calado et al, 2009) จากรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุบาลลูกกุ้งสวยงามทะเลชนิดอื่นๆในแนวปะการังบางชนิด เช่น กุ้งสวยงามในสกุล *Lysmata* และ *Stenopus* ที่เลี้ยงในระบบปิด พบว่าลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายสูงขึ้น และ ลูกกุ้งมีพัฒนาการการเจริญเติบโตดี (Calado et. al., 2003b) การศึกษาอัตราความหนาแน่นในการอนุบาลก็มีผลต่อพัฒนาการของลูกกุ้ง ลูกกุ้ง *Lysmata seticaudata* ที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่นสูงที่ 40 ตัวต่อลิตรพบว่าตัวลงเกาะช้ากว่ากุ้งชนิดเดียวกันที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 10 และ 20 ตัวต่อลิตร Calado et. al. (2005a) การอนุบาลลูกกุ้งสวยงามทะเล *Lysmata* sp. (Zhang et al., 1998; Rhyne (2002) และสกุล *Stenopus* (Zhang et al., 1997) ด้วยอาหารมีชีวิต เช่น โรติเฟอร์ และ อาร์ทีเมียแรกฟัก ลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายและมีระยะพัฒนาการเจริญเติบโตดีกว่าการอนุบาลด้วยอาหารมีชีวิตร่วมกับอาหารสำเร็จรูป (Rhyne, 2002) ลูกกุ้งที่ให้กินอาร์ทีเมียแรกฟักมีอัตราการรอดตายสูงกว่าลูกกุ้งที่ให้กินโรติเฟอร์ (Zhang et al., 1997) ซึ่งการทดลองนี้ขัดแย้งกับ รินปวีร์และคณะ (2555) ที่อนุบาลลูกกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ด้วยการใช้อาหารมีชีวิตร่วมกับอาหารลูกกุ้งสำเร็จรูปซึ่งพบว่าลูกกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ที่กินอาหารมีชีวิต (อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์) ร่วมกับอาหารเม็ดมีอัตราการรอดตายสูงที่สุดคือ 19 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุเฉลี่ยของลูกกุ้งตัวแรกและตัวสุดท้ายในการลงเกาะ 41-51 วัน ในขณะที่ลูกกุ้งการ์ตูนที่กินอาร์ทีเมียแรกฟักร่วมกับอาหารเม็ดและลูกกุ้งการ์ตูนที่กินโรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทีเมียมีการรอดตาย 14 เปอร์เซ็นต์ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับและมีอายุเฉลี่ยของลูกกุ้งตัวแรกและตัวสุดท้ายในการลงเกาะ 41-51 วัน และ 48-58 วัน ตามลำดับ

มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับความสำคัญและบทบาทของกรดไขมันต่อการรอดตายและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เช่น ลูกกุ้งมังกร, *Panulirus homarus* (Radhakrishnan, & Vijayakumaran, 1993; ลูกกุ้งขาว *Penaeus vannamei* (Naessens et al. 1997; Wouters et al. 1999), ลูกกุ้ง crayfish, *Astacus leptodactylus* (Harlioglu et al., 2012) ลูกปูทะเล *Scylla serrata* (Suprayudi et al., 2002ab; Supraudi, Takeuchi & Hamasaki, 2004); Hamasaki, Suprayudi & Takeuchi, 2002) ลูกปูม้า *Portunus trituberculatus* (Takeuchi et al., 1999b) ลูกปู Chinese mitten crab, *Eriocheir sinensis* (Sui et al., 2007; Wu et al., 2007a) และในลูกกุ้งทะเลสวยงาม *Lysmata seticaudata* (Calado et al, 2005b.) ซึ่งโดยสรุปแล้วสัตว์น้ำเหล่านี้มีความต้องการกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 เช่น กรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) และกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) มากกว่ากรดไขมันกลุ่มโอเมกา 6 เช่น กรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ) ซึ่งนอกจากปริมาณกรดไขมันแต่ละชนิดที่มีผลต่อการรอดตายและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันเหล่านี้ก็มีผลต่อการรอดตายของสัตว์น้ำเช่นกัน (Sargent et al, 2002)



# วิธีดำเนินการวิจัย

## 1 สารเคมีและอุปกรณ์

### 1.1 สารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์กรดไขมัน

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| เมทานอล (Methanol, AR grade)                                         | BDH, อังกฤษ                         |
| คลอโรฟอร์ม (Chloroform, AR grade)                                    | BDH, อังกฤษ                         |
| เฮกเซน (n-hexane, AR grade)                                          | Merck, เยอรมัน                      |
| กรดซัลฟริก (Sulfuric acid, AR grade)                                 | Merck, เยอรมัน                      |
| Butylated hydroxytoluene (BHT), AR grade                             | Sigma, อเมริกา                      |
| โปแตสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride, AR grade)                     | Merck, เยอรมัน                      |
| โปแตสเซียมไบคาร์บอเนต<br>(Potassium hydrogen carbonate, AR grade)    | Fluka<br>Fluka, สวิตเซอร์แลนด์      |
| โซเดียมซัลเฟต (Sodium sulfate anhydrous, AR grade)                   | Merck, เยอรมัน                      |
| สารมาตรฐานกรดไขมัน (PUFA No. 3, menhaden oil)<br>(external standard) | Supelco, อเมริกา                    |
| กรดไขมัน C17:0 free fatty acid (internal standard)                   | Sigma, อเมริกา                      |
| กรดไขมัน C20:0 methyl ester (external standard)                      | Fluka                               |
| กรดไขมัน C22:0 methyl ester (external standard)                      | Fluka                               |
| แก๊สฮีเลียม                                                          | RTG                                 |
| แก๊สไฮโดรเจน                                                         | RTG                                 |
| แก๊สไนโตรเจน                                                         | RTG                                 |
| ออกซิเจน                                                             | RTG                                 |
| Gas Chromatograph                                                    | Agilent Technologies 7820A          |
| เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง                                                | Satorius, เยอรมัน                   |
| เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)                                      | Yamato, ญี่ปุ่น                     |
| ตู้อบ (Hot air oven)                                                 | Yamato, ญี่ปุ่น                     |
| เครื่องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูง (Sonicator)                    |                                     |
| ที่บดต่อมได้สมองปลา (Hand homogenizer)                               |                                     |
| หลอดสำหรับปั่นเหวี่ยง (Nalgene Centrifuge tube)                      | Thermo Fisher Scientific, UK        |
| คอลัมน์กรดไขมัน                                                      | HP-Innowax Agilent J&W              |
| บีกเกอร์ 50 มิลลิลิตร                                                | Pyrex                               |
| กระดาษกรอง Whatman no.1                                              | Schleicher & Schuell, Maidstone, UK |
| ตู้แช่แข็ง Freezer -40°C                                             | Legaci refrigeration system, USA    |
| ปากคืบ ปิเปต หลอดแก้ว กรวยแก้ว เป็นต้น                               |                                     |

1.2 สารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

|                                                                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| แพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด<br>( <i>Chaetoceros calsitrans</i> , <i>Isochrysis galbana</i> ,<br><i>Tetraselmis</i> sp.) | ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช<br>สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล |
| โรติเฟอร์ ( <i>Brachionus rotundiformis</i> )                                                                   | ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนสัตว์                           |
| ไซอาร์ทีเมีย (INVE, Belgium)                                                                                    | ร้านขายอาหารสัตว์น้ำ                                   |
| แร่ธาตุ                                                                                                         | มารีนลีดเดอร์                                          |
| TRIVIT-B (วิตะมิน)                                                                                              | ร้านขายอาหารสัตว์น้ำ                                   |
| ไวต้าซูโอพลัส (ฆ่าซูโอแทมเนียม)                                                                                 | ร้านขายอาหารสัตว์น้ำ                                   |
| สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5 นอร์มัล                                                                                | Ajax, New Zealand                                      |
| โซเดียมไฮดรอกไซด์                                                                                               | Ajax, New Zealand                                      |
| โซเดียมไฮโอซัลเฟต                                                                                               | Ajax, New Zealand                                      |
| Orthotolidine solution 10%                                                                                      |                                                        |
| น้ำทะเล                                                                                                         |                                                        |
| เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ                                                                                   | Mettler Toledo                                         |
| เครื่องวัดพีเอชในน้ำ                                                                                            | HACH, Sension 6                                        |
| เครื่องวัดความเค็มน้ำทะเล                                                                                       | Hand Refractometer, ATAGO                              |
| ตู้กระจกขนาด 30 ลิตร                                                                                            |                                                        |
| ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 500 ลิตร                                                                                     |                                                        |
| ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 100 ลิตร และโหลแก้ว 10 ลิตร                                                                  |                                                        |
| ถังพลาสติก                                                                                                      |                                                        |
| ถุงผ้าสักหลาดกรองน้ำขนาดความถี่ผ้ากรองประมาณ 1 ไมครอน                                                           |                                                        |
| เครื่องปั๊มอากาศ หัวทราย สายยาง คลอรีน เป็นต้น                                                                  |                                                        |

2 วิธีการดำเนินการทดลอง

2.1 สัตว์ทดลอง

2.1.1 พ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (*Hymenocera picta*)

พ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (*H. picta*) ที่ใช้ในการทดลองเป็นพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติได้มาจากร้านจำหน่ายสัตว์ทะเลสวยงาม จตุจักร กรุงเทพมหานคร ทำการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เป็นคู่ในตู้กระจกขนาด 30 ลิตร ที่บรรจุน้ำทะเลความเค็มประมาณ 32-34 พีพีที อุณหภูมิประมาณ 28-29 องศาเซลเซียส อัลคาลินิตี้ประมาณ 90-110 มิลลิกรัม/ลิตร แม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามออกไข่หลังจากเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในโรงเรือนสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ประมาณ 3 เดือน





ภาพที่ 1 พ่อแม่พันธุ์กิ้งก่าตุ่น (*H. picta*)

#### 2.1.2 กิ้งก่าตุ่นจากธรรมชาติ (ไขกิ้งก่าตุ่น ลูกกิ้งก่าตุ่นแรกฟักและกิ้งก่าตุ่นวัยรุ่น)

- ไขกิ้งก่าตุ่นได้มาจากแม่พันธุ์กิ้งก่าตุ่นที่อ่อนแอและตาย ทำการแยกไข่และเก็บรักษา อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสจนกระทั่งทำการวิเคราะห์กรดไขมัน
- ลูกกิ้งก่าตุ่นแรกฟัก ได้มาจากแม่พันธุ์กิ้งก่าตุ่นจำนวน 3 ตัว เก็บตัวอย่างลูกกิ้งก่าตุ่นแรกฟักและเก็บรักษาในอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสจนกระทั่งทำการวิเคราะห์กรดไขมัน
- กิ้งก่าตุ่นวัยรุ่นจำนวน 3 ตัว ได้มาจากร้านจำหน่ายสัตว์ทะเลสวยงาม จตุจักร กรุงเทพมหานคร น้ำหนักประมาณ 0.2 กรัม ความยาวประมาณ 2.10 เซนติเมตร เก็บรักษาในอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสจนกระทั่งทำการวิเคราะห์กรดไขมัน

#### 2.1.3 ลูกกิ้งก่าตุ่นสำหรับอนุบาล เป็นลูกกิ้งก่าตุ่นจากแม่พันธุ์กิ้งก่าตุ่นจำนวน 3 ตัว และเป็นลูกกิ้งก่าตุ่นชุดเดียวกับลูกกิ้งก่าตุ่นแรกฟัก (ข้อ 2.1.2)



## 2.2 อาหารสัตว์ทดลอง

### 2.2.1 อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (*H. picta*)

ให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามกินดาวแดง (*Linckia multiflora*) ซึ่งเป็นอาหารของกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติ ได้มาจากร้านจำหน่ายสัตว์ทะเลสวยงาม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

### 2.2.2 อาหารลูกกุ้งก้ามกราม (*H. picta*)

ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามครั้งนี้ อาหารที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งก้ามกรามมี 2 ชนิด ได้แก่ โรติเฟอร์ (*Brachionus rotundiformis*) และอาร์ทีเมียแรกฟัก (Newly hatched *Artemia*) โรติเฟอร์ที่ใช้ในการทดลองเป็นโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืชชนิดเตตราเซลมิส (*Tetraselmis* sp.) ได้มาจากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาร์ทีเมียแรกฟักที่ใช้ในการทดลองได้มาจากการเพาะฟักไข่อาร์ทีเมียเป็นระยะเวลา 20-22 ชั่วโมง ในถังไฟเบอร์ขนาด 100 ลิตร บรรจุน้ำทะเลความเค็ม 30-32 พีพีทีและให้อากาศตลอดเวลา ทำการแยกอาร์ทีเมียแรกฟักออกจากเปลือกไข่อย่างน้อยจำนวน 2 ครั้งก่อนนำไปเลี้ยงลูกกุ้งก้ามกราม

### 2.2.3 อาหารโรติเฟอร์ (*B. rotundiformis*) และอาร์ทีเมียแรกฟัก (newly hatched *Artemia*)

ใส่แพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ได้แก่ เตตราเซลมิส (*Tetraselmis* sp.) คีโตเซอโรส (*Chaetoceros calcitrans*) และไอโซโคริซิส (*Isochrysis galbana*) ลงในถังอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามตลอดระยะเวลาการทดลองเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ และ เป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์สองชนิดนี้ แพลงก์ตอนพืชที่ใช้ได้รับจากห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชที่เพาะขยายในห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นระยะเวลา 4 วัน อัตราส่วนที่ใช้เตตราเซลมิส: คีโตเซอโรส: ไอโซโคริซิส เท่ากับ 1:0.5:0.5 ปริมาตรที่ใช้ 6 ลิตร/วันถึงอนุบาล โดยแบ่งให้ครั้งละ 3 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง/วัน ความหนาแน่นเซลล์เฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชผสมทั้ง 3 ชนิดในถังเลี้ยงประมาณ 20,000-40,000 เซลล์/มล

## 2.3 การเตรียมน้ำทะเลสำหรับการอนุบาล

กรองน้ำทะเลผ่านถุงผ้าสักหลาดขนาดความถี่ผ้ากรองประมาณ 1 ไมครอน ลงในถังพักน้ำขนาด 500 ลิตร ใส่หัวทรายเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยคลอรีนความเข้มข้น 5 พีพีเอ็มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจเช็คปริมาณคลอรีนตกค้างในน้ำด้วย Orthotolidine solution 10% หลังจากนั้นปรับน้ำทะเลให้มีความเค็มประมาณ 28-30 พีพีทีและปรับพีเอชให้มีความระหว่าง 7.5-7.8 ด้วยกรดไฮโดรคลอริก 5 นอร์มัล ตลอดการทดลองปิดฝาดังพักน้ำด้วยตาข่ายกรอกแสงสีดำ

## 2.4 การอนุบาลลูกกุ้งการุ้ง (H. picta)

2.4.1 ย้ายแม่กุ้งการุ้งจำนวน 3 ตัวที่มีไข่ได้ท้องสีน้ำตาลเข้มมองเห็นตาลูกกุ้งการุ้งสีเงิน ซึ่งเป็นระยะลูกกุ้งการุ้งใกล้ฟักเป็นตัวมาใส่ตู้กระจกขนาด 30 ลิตร ความเต็มน้ำทะเลประมาณ 32-33 พีพีที ใส่หัวทรายเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำตลอดเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวนลูกกุ้งการุ้งแรกฟักเฉลี่ย 4,616 ตัว/แม่กุ้ง

2.4.2 ย้ายลูกกุ้งการุ้งแรกฟักระยะชูเอี้ยง 1 มาอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 500 ลิตร บรรจุน้ำทะเลปริมาตร 300 ลิตร อนุบาลลูกกุ้งการุ้งในอัตราความหนาแน่นเริ่มต้น 15-20 ตัว/ลิตร

2.4.3 ใส่แพลงก์ตอนพืชผสม 3 ชนิดในถังอนุบาลอัตราส่วนการใช้ตามข้อ 2.2.3

2.4.4 ลูกกุ้งการุ้งอายุ 1-14 วัน ให้ลูกกุ้งการุ้งกินโรติเฟอร์จำนวน 10 ตัว/มลและให้กินอาร์ทีเมียแรกฟักจำนวน 2-4 ตัว/มล วันละ 1 ครั้ง ลูกกุ้งการุ้งอายุตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้ลูกกุ้งการุ้งกินอาร์ทีเมียแรกฟักจำนวน 5-7 ตัว/มล วันละ 2 ครั้ง



ภาพที่ 2 การอนุบาลลูกกุ้งการุ้งถึงไฟเบอร์กลาส



2.4.5 การเปลี่ยนถ่ายน้ำและทำความสะอาดถึงอนุบาล การอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนครั้งนี้เป็นการอนุบาลโดยวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดการทดลอง ลูกกุ้งการ์ตูนอายุ 1 สัปดาห์แรก อนุบาลในน้ำทะเลปริมาตร 300 ลิตร ในระยะ 2 วันแรกของการอนุบาลไม่ทำความสะอาดพื้นถังและไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำ ลูกกุ้งการ์ตูนอายุ 3 วันถึง 7 วัน ทำความสะอาดพื้นถังทุก 2 วัน โดยการไซฟอนตะกอนลงในถังน้ำพลาสติกที่เจาะข้างถึงน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมและติดด้วยผ้ากรองเพื่อกันลูกกุ้งการ์ตูนไว้ในถังและปล่อยให้ตะกอนหลุดออกไปและทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 10 % หลังจากนั้นเติมน้ำทะเลโดยการไซฟอนน้ำทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนลงในถังเลี้ยงให้มีปริมาตรน้ำเท่าเดิม ลูกกุ้งการ์ตูนอายุ 2-4 สัปดาห์ ทำความสะอาดถึงทุกวันและเปลี่ยนถ่ายน้ำประมาณ 20-30 % และเพิ่มปริมาตรน้ำทะเลเป็น 400 ลิตร นอกจากนี้ ทุก 7-10 วันทำการย้ายลูกกุ้งการ์ตูนทั้งหมดไปเลี้ยงในถังใหม่ที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งการ์ตูนโดยการจุ่มในคลอรีนความเข้มข้น 20 พีพีเอ็มและตากให้แห้ง

## 2.5 การเก็บตัวอย่างลูกกุ้งการ์ตูน (ลูกกุ้งการ์ตูนแข็งแรงและลูกกุ้งการ์ตูนอ่อนแอ)

ตัวอย่างลูกกุ้งการ์ตูนแข็งแรง ทำการตรวจเช็คพัฒนาการของลูกกุ้งการ์ตูนแต่ละระยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้ภาพประกอบจากวิทยานิพนธ์ของ Fiedler (1994) เก็บตัวอย่างลูกกุ้งการ์ตูนแต่ละระยะหลังจากพบว่าลูกกุ้งการ์ตูนพัฒนาการเข้าสู่ระยะถัดไป 2 วัน (ระยะพัฒนาการแต่ละระยะประมาณ 2-4 วัน) จำนวนลูกกุ้งการ์ตูนที่เก็บสำหรับวิเคราะห์กรดไขมันมีดังนี้ ลูกกุ้งการ์ตูนแรกเกิดจำนวนประมาณ 100 ตัว/ชุดการทดลอง ลูกกุ้งการ์ตูนระยะ zoeal 2-6 จำนวน 40 ตัว/ชุดการทดลอง ลูกกุ้งการ์ตูนระยะ zoeal 7-12 จำนวน 30 ตัว/ชุดการทดลอง ลูกกุ้งการ์ตูนระยะลงเกาะจำนวน 5 ตัว/ชุดการทดลอง เก็บรักษาตัวอย่างลูกกุ้งการ์ตูนในอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนกระทั่งทำการวิเคราะห์กรดไขมัน

ตัวอย่างลูกกุ้งการ์ตูนอ่อนแอ ลูกกุ้งการ์ตูนอ่อนแอที่อยู่บริเวณพื้นกันถึงอนุบาลและถูกไซฟอนออกมาปะปนกับตะกอนในขณะที่ทำความสะอาดกันถึงอนุบาล ตรวจเช็คระยะพัฒนาการและเก็บรักษาตัวอย่างลูกกุ้งการ์ตูนในอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนกระทั่งทำการวิเคราะห์กรดไขมัน

## 2.6 การวิเคราะห์กรดไขมัน

วิเคราะห์กรดไขมันในตัวอย่างกุ้งการ์ตูนตามวิธีของ Folch (1957) และตรวจวัดชนิดและปริมาณกรดไขมันด้วยเครื่อง gas liquid chromatography (Christie, 1993)



### 2.6.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง

ตัวอย่างขนาดใหญ่ (กึ่งการตุ๋นวัยรุ่น) ซึ่งนำหนักกึ่งการตุ๋นวัยรุ่นที่ปั่นละเอียดประมาณ 1 กรัม ลงในบีเกอร์ขนาด 100 มล ใส่สารละลายคลอโรฟอร์ม:เมทานอล (2:1) ที่มีสารกันหืน (BHT) 0.01% (สัดส่วนสารละลาย:ตัวอย่างประมาณ 20:1) และแช่ไว้ในน้ำแข็งจนกระทั่งทำการสกัดไขมัน

ตัวอย่างขนาดเล็ก (ไขกึ่งการตุ๋นและลูกกึ่งการตุ๋น) ซึ่งนำหนักไขกึ่งการตุ๋นและลูกกึ่งการตุ๋นประมาณ 0.3-0.5 กรัม ลงในที่บดต่อมได้สมองปลา (hand homogenizer) ใส่สารละลายคลอโรฟอร์ม:เมทานอล (2:1) ที่มีสารกันหืน (BHT) 0.01% และแช่ไว้ในน้ำแข็งจนกระทั่งทำการสกัดไขมัน

### 2.6.2 ขั้นตอนการสกัดไขมันในตัวอย่าง

- ตัวอย่างขนาดใหญ่ นำตัวอย่างกึ่งการตุ๋นวัยรุ่นที่เตรียมไว้ในข้อ 2.6.1 แช่ในน้ำแข็งและปั่นละเอียดด้วยเครื่อง homogeniser ประมาณ 5 นาที และแช่ตัวอย่างไว้ในน้ำแข็งประมาณ 1 ชั่วโมง

- ตัวอย่างขนาดเล็ก นำตัวอย่างที่เตรียมไว้ในข้อ 2.6.1 แช่ในน้ำแข็งและบดละเอียดด้วยที่บดต่อมได้สมองปลา (hand homogeniser) หลังจากนั้น ถ่ายสารละลายที่มีตัวอย่างบดละเอียดลงในบีเกอร์ขนาด 50 มล ก่อนนำไปใส่ในเครื่องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูง (sonicator) ที่มีอุณหภูมิ 18-20 °C ประมาณ 15 นาที และแช่ตัวอย่างไว้ในน้ำแข็งประมาณ 1 ชั่วโมง

- ตัวอย่างทั้งหมด ถ่ายสารละลายทั้งหมดลงในหลอดสำหรับปั่นเหวี่ยง (centrifuge tubes) ใส่สารละลายโปแตสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.88% ปริมาตร 1/4 ส่วนของปริมาตรสารละลายลงในตัวอย่าง เขย่าและตั้งไว้ให้แยกชั้นในน้ำแข็งประมาณ 5 นาที

- นำตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1500 rpm ประมาณ 5 นาที ปิเปิดสารละลายชั้นบนออกทิ้ง

- กรองสารละลายส่วนล่างผ่านกระดาษกรอง Whatman no. 1 ลงในหลอดแก้วที่ทราบน้ำหนักแล้ว ระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน และนำไปใส่โหลดูดความชื้นประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาณไขมันทั้งหมด

- ละลายไขมันด้วยสารละลายคลอโรฟอร์ม:เมทานอล (2:1) ที่มีสารกันหืน (BHT) 0.01% ให้มีความเข้มข้น 10 มก/มล (10,000 พีพีเอ็ม) ถ่ายสารละลายลงในขวดแก้วสีน้ำตาลขนาด 2 มล และเก็บไว้ในอุณหภูมิ -20°C

### 2.6.3 ขั้นตอนการทำ transesterification

- นำตัวอย่างไขมันปริมาตร 0.1 มล (ความเข้มข้น 1000 พีพีเอ็ม) ใส่ในหลอดทดลองที่มีฝาเกลียวขนาด 15 มล และระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน เติมสารละลาย 1% กรดซัลฟูริกในเมทานอล ปริมาตร 10 มล (methylation reagent) และเติม internal standard (C17:0 free fatty acid)

ปริมาตร 1 มล (ความเข้มข้น 1000 พีพีเอ็ม) เขย่าให้เข้ากัน และนำไปใส่ตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง

- นำตัวอย่างออกจากตู้อบ ตั้งทิ้งให้เย็นก่อนถ่ายใส่กรวยแก้วสำหรับสกัดและแยกสาร ชะสารที่ตกค้างในหลอดทดลองด้วย 5% โซเดียมคลอไรด์ปริมาตร 5 มล และเทลงในกรวยแก้ว เดิมเฮกเซน ปริมาตร 5 มล ทำการเขย่าประมาณ 1 นาทีและตั้งไว้ให้แยกชั้น เก็บชั้นเฮกเซน ทำการสกัดซ้ำอีกครั้งและรวมส่วนของชั้นเฮกเซนไว้ด้วยกัน

- เดิมสารละลาย 2% โปตัสเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ปริมาตร 40 มล เขย่าประมาณ 1 นาทีและตั้งไว้ให้แยกชั้น เก็บส่วนของเฮกเซน (ชั้นบน) โดยการกรองผ่านกรวยกรองที่บรรจุโซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ำ (sodium sulfate anhydrous) นำสารที่ได้ไประเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจนละลายด้วยเฮกเซนปริมาตร 1 มล และบรรจุลงในขวดแก้วสีน้ำตาล ขนาด 2 มล หลังจากนั้น นำไปฉีดเข้าเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดไขมันหรือเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ -20 °C เพื่อรอการนำไปฉีดเข้าเครื่อง gas liquid chromatography โดยสภาวะที่ใช้ในการการจำแนกและการตรวจวัดชนิดและปริมาณกรดไขมันมีดังนี้

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC Agilent Technologies 7820A)

คอลัมน์

Column HP-Innowax Agilent J&W

ขนาด 30 m. x 0.25 mm. x 0.25  $\mu$ m. (length x id x film thickness)

แก๊สเคลื่อนที่

แก๊สฮีเลียม อัตราการไหล 1.2 มล/นาที

อุณหภูมิเดาอบ

150 °C 0.5 min

150 °C  $\longrightarrow$  170 °C (10 min, 5 °C/min)

170 °C  $\longrightarrow$  190 °C (28 min, 3 °C/min)

อุณหภูมิช่องฉีดสาร

230 °C

อุณหภูมิเครื่องตรวจวัด

250 °C

เครื่องตรวจวัด

ชนิด Flame Ionisation Detector (FID)

ชนิดการฉีด

split 5:1

ปริมาตรที่ฉีด

2  $\mu$ l

การจำแนกและตรวจวัดชนิดกรดไขมันโดยการเปรียบเทียบเวลาของพีคสารตัวอย่างถูกชะออกจากคอลัมน์กับเวลาของพีคสารมาตรฐานกรดไขมันชนิดเดี่ยวๆที่ทราบชนิดแล้วและเปรียบเทียบกับเวลาของพีคสารมาตรฐานกรดไขมันแต่ละชนิด (external standard, PUFA No. 3, menhaden oil, Supelco, USA) ก่อนนำไปคำนวณหาปริมาณของกรดไขมันแต่ละชนิด โดยการเปรียบเทียบพื้นที่ใต้พีคของตัวอย่างกับพื้นที่ทั้งหมด

$$\% \text{กรดไขมัน} = 100 \times \frac{\text{พื้นที่ใต้พีคของกรดไขมัน}}{A}$$

$$A = \text{พื้นที่ใต้พีคกรดไขมันทั้งหมด} - (\text{พื้นที่ใต้พีคเฮกเซน} + \text{พื้นที่ใต้พีคBHT} + \text{พื้นที่ใต้พีค internal std})$$

### 3

### การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลไขมันและกรดไขมันระหว่างลูกกึ่งการดูนจากธรรมชาติและลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ  $p < 0.05$  (Zar, 1999) และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี S-N-K สำหรับการเปรียบเทียบไขมันและกรดไขมันระหว่างลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงที่แข็งแรงและอ่อนแอ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Independent-samples t-test การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS version 17

### 4 สถานที่ทำการทดลอง

โรงเรียนสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา







# ผลการดำเนินการทดลอง

## 1 การเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกราม (*H. picta*)

ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามครั้งนี้ ลูกกุ้งก้ามกรามมีอัตราการรอดตายต่ำมาก ลูกกุ้งก้ามกรามมีระยะพัฒนาการเจริญเติบโตในระยะซุเอียะทั้งหมด 12 ระยะ ก่อนคำว่าตัวลงเกาะ (postlarvae) และระยะเวลาที่ลูกกุ้งก้ามกรามตัวแรกและตัวสุดท้ายลงเกาะคือ 32-45 วัน ลักษณะเด่นที่ใช้ในการจำแนกรูปร่างลักษณะของลูกกุ้งก้ามกรามในแต่ละระยะพัฒนาการเจริญเติบโตโดยการเปรียบเทียบกับภาพระยะพัฒนาการของลูกกุ้งก้ามกรามจากงานวิจัยของ Fiedler (1994) มีลักษณะดังนี้ ลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกลูกกุ้งก้ามกรามระยะซุเอียะ 1-ระยะซุเอียะ 2 คือส่วนของตา (ภาพที่ 3) ลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกลูกกุ้งก้ามกรามระยะซุเอียะ 3-ระยะซุเอียะ 4 คือส่วนของหาง (ภาพที่ 4) ลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกลูกกุ้งก้ามกรามระยะซุเอียะ 5-ระยะซุเอียะ 12 คือพัฒนาการส่วนของหาง กรีและขาว่ายน้ำ (ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6) ลูกกุ้งก้ามกรามระยะลงเกาะมีลำตัวใส สืบนลลำตัวลูกกุ้งก้ามกรามเริ่มปรากฏหลังจากลูกกุ้งก้ามกรามกินดางทะเลเป็นอาหารและพัฒนารูปร่างจนมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ในระยะต่อมา (ภาพที่ 7) ในระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามมีปัญหาการเกิดโปรโตซัวซุโอแทมเนียมเกาะบนลูกกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งก้ามกรามด้วย (ภาพที่ 8)

## 2 ปริมาณไขมันในกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติ (ไขกุ้งก้ามกราม ลูกกุ้งก้ามกรามลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักและกุ้งก้ามกรามวัยรุ่น) และในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง (ระยะซุเอียะและระยะลงเกาะ)


ปริมาณไขมันในกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติ (ไขกุ้งก้ามกราม ลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟัก และกุ้งก้ามกรามวัยรุ่น) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) และปริมาณไขมันในไขกุ้งก้ามกรามและในลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักมีมากกว่าในกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นจากธรรมชาติประมาณ 2 เท่า (ตารางที่ 1) ลูกกุ้งก้ามกรามแข็งแรงจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 2-ระยะซุเอียะ 7 มีปริมาณไขมันมากกว่าลูกกุ้งก้ามกรามแข็งแรงระยะซุเอียะ 8 ขึ้นไปจนถึงระยะลงเกาะและมากกว่ากุ้งก้ามกรามวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) อย่างไรก็ตาม ปริมาณในลูกกุ้งก้ามกรามแข็งแรงจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 2-ระยะซุเอียะ 7 ไม่แตกต่างจากปริมาณไขมันในไขกุ้งก้ามกรามและลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟัก ( $p < 0.05$ ) นอกจากนี้ ปริมาณไขมันในลูกกุ้งก้ามกรามแข็งแรงจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 8 ขึ้นไปจนถึงระยะลงเกาะไม่แตกต่างจากไขมันในกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) แต่ลูกกุ้งก้ามกรามแข็งแรงจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 8 ขึ้นไปจนถึงระยะลงเกาะมีปริมาณไขมันน้อยกว่าในไขกุ้งก้ามกรามและลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักประมาณ 1 เท่า (ตารางที่ 1)




ภาพที่ 3 พัฒนาการกึ่งการตัว (H. picta) ระยะชูเอียะ 1 ถึงระยะชูเอียะ 2

ระยะชูเอียะ 1 ตาติดส่วนหัว หาง (telson) มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีหนามบริเวณปลายหาง  
 ระยะชูเอียะ 2 มีก้านตา หาง (telson) มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีหนามบริเวณปลายหาง  
 และเห็นแพนหาง (exopods) อยู่ภายใน







ระยะชูเอี้ยะ 3




ระยะชูเอี้ยะ 4



ระยะชูเอี้ยะ 5



ระยะชูเอี้ยะ 6



ระยะชูเอี้ยะ 7

#### ภาพที่ 4 พัฒนาการส่วนหางของลูกกุ้งการ์ตูน (*H. picta*)

ระยะชูเอี้ยะ 3 แพนหาง exopods มีความยาวหนึ่งเท่าของ uropods แต่สั้นกว่าหาง (telson)

ระยะชูเอี้ยะ 4 แพนหาง uropods มีความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของ exopods แต่สั้นกว่าหาง (telson)


ระยะชูเอี้ยะ 5 แพนหาง exopods และ endopods ยาวกว่าส่วนหาง

ระยะชูเอี้ยะ 6-12 หาง (telson) และแพนหาง (exopods uropods) พัฒนายาวเร็วขึ้น







ระยะชูเอี้ยะ 5



ระยะชูเอี้ยะ 7



ระยะชูเอี้ยะ 9



ระยะชูเอี้ยะ 10



ระยะชูเอี้ยะ 10




ระยะชูเอี้ยะ 12

### ภาพที่ 5 พัฒนาการส่วนกริของลูกกึ่งการตูน (*H. picta*)


ระยะชูเอี้ยะ 2 มีกริโค้งและจำนวนพินบนกริเพิ่มขึ้นเมื่อลูกกึ่งการตูนพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้น

ระยะชูเอี้ยะ 5-7 กริมิพินขนาดเล็ก 1 อัน ระยะชูเอี้ยะ 9 มีพินบนกริ 2 อัน


ระยะชูเอี้ยะ 10 มีพินบนกริ 3 อัน ระยะชูเอี้ยะ 12 มีพินบนกริ 4 อัน




ระยะชูเอี้ยงะ 9



ระยะชูเอี้ยงะ 10



ระยะชูเอี้ยงะ 11



ระยะชูเอี้ยงะ 12

ภาพที่ 6 พัฒนาการระยางค์ขาว่ายน้ำของลูกกึ่งการตูน (*H. picta*)

ระยะชูเอี้ยงะ 8 ตุ่มระยางค์ขาว่ายน้ำเริ่มปรากฏ ระยะชูเอี้ยงะ 9-10 ระยางค์ขาว่ายน้ำงอกเพิ่มเป็น 2 อัน (biramous)

ระยะชูเอี้ยงะ 11 ระยางค์ขาว่ายน้ำเพิ่มเป็น 3 อัน (ปรากฏ appendix internae)

ระยะชูเอี้ยงะ 12 ขาว่ายน้ำปรากฏขนอ่อน (plumose seta)






ภาพที่ 7 ลูกกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ระยะลงเกาะ

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ภาพจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
(Scanning electron microscope, SEM)



ภาพที่ 8 โปรโตซัวซูโอแทมเนียมเกาะบนลูกกุ้งการ์ตูน (*H. picta*)  
ภาพจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)




ปริมาณไขมันในลูกกุ้งการังตุนแข็งแรงและลูกกุ้งการังตุนอ่อนแอมีปริมาณลดลงเมื่อลูกกุ้งการังตุนมีพัฒนาการการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและปริมาณไขมันลดลงมากในลูกกุ้งการังตุนระยะชูเอี้ยงะ 8 ขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณไขมันในลูกกุ้งการังตุนอ่อนแอมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณไขมัน (%น้ำหนักสด) ในกุ้งการังตุนจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการังตุน ลูกกุ้งการังตุนแรกฟัก และกุ้งการังตุนวัยรุ่น) และในลูกกุ้งการังตุนจากการเพาะเลี้ยง (ระยะชูเอี้ยงะจนถึงระยะลงเกาะ)

| ระยะพัฒนาการ                                        | ลูกกุ้งการังตุนแข็งแรง        | ลูกกุ้งการังตุนอ่อนแอ  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ไข่กุ้งการังตุน (ชุดควบคุม)                         | 4.0 ± 0.1 <sup>a</sup>        | -                      |
| ลูกกุ้งการังตุนแรกฟัก<br>ระยะชูเอี้ยงะ1 (ชุดควบคุม) | 4.8 ± 0.7 <sup>a</sup> (28%)* | -                      |
| ระยะชูเอี้ยงะ2                                      | 4.8 ± 0.3 <sup>a</sup>        | -                      |
| ระยะชูเอี้ยงะ3                                      | 4.8 ± 0.9 <sup>a</sup>        | 3.0 ± 0.5 <sup>a</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ4                                      | 3.6 ± 0.8 <sup>a</sup>        | 1.1 ± 0.1 <sup>c</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ5                                      | 3.9 ± 0.9 <sup>a</sup>        | 4.1 ± 0.7 <sup>a</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ6                                      | 3.2 ± 0.3 <sup>a</sup>        | -                      |
| ระยะชูเอี้ยงะ7                                      | 3.4 ± 0.9 <sup>a</sup>        | 1.4 ± 0.3 <sup>c</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ 8                                     | 1.7 ± 0.5 <sup>b</sup>        | 3.4 ± 0.1 <sup>a</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ 9                                     | 1.8 ± 0.6 <sup>b</sup>        | 1.0 ± 0.3 <sup>c</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ 10                                    | 2.2 ± 0.2 <sup>b</sup>        | 3.1 ± 0.2 <sup>a</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ11                                     | 2.0 ± 0.6 <sup>b</sup>        | 2.1 ± 0.2 <sup>b</sup> |
| ระยะชูเอี้ยงะ12                                     | 1.8 ± 0.5 <sup>b</sup>        | 1.3 ± 0.4 <sup>c</sup> |
| ระยะลงเกาะ                                          | 1.8 ± 0.2 <sup>b</sup>        | 1.0 ± 0.2 <sup>c</sup> |
| กุ้งการังตุนวัยรุ่น (ชุดควบคุม)                     | 1.3 ± 0.0 <sup>b</sup>        | -                      |

ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± SD, n=3 \* ปริมาณไขมัน (%/น้ำหนักแห้ง)



ภาพที่ 9 ปริมาณไขมันในลูกกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) แข็งแรงและลูกกุ้งก้ามกรามอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยง

ตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง พบว่าลูกกุ้งก้ามกรามแข็งแรงมีการสะสมไขมันมากกว่าลูกกุ้งก้ามกรามอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ภาพที่ 9) ยกเว้นลูกกุ้งก้ามกรามอ่อนแอระยะชูลัยยะ 8 และระยะชูลัยยะ 10 มีปริมาณไขมันมากกว่าลูกกุ้งก้ามกรามแข็งแรงที่มีระยะพัฒนาการเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

### 3 กรดไขมันในอาร์ทีเมียแรกฟักที่กิน เตตราเซลมิส คีโตเซอโรส และไอโซโคลซิส

อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหารหลักที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งก้ามกรามตลอดระยะการอนุบาล ดังนั้นจึงเลือกวิเคราะห์กรดไขมันในอาร์ทีเมียที่ให้กินเตตราเซลมิส คีโตเซอโรส และไอโซโคลซิสเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าอาร์ทีเมียแรกฟักมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (Monounsaturated fatty acid, MUFA) เป็นองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมาคือกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (Saturated fatty acid, SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (n-3, n-6 polyunsaturated fatty acid, PUFA) ในกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 polyunsaturated fatty acid, n-3 PUFA) ใกล้เคียงกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 polyunsaturated fatty acid, n-6 PUFA) โดยอาร์ทีเมียแรกฟักมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) เป็นองค์ประกอบมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) ประมาณ 4 เท่า และมีกรดไขมันปาล์มติก (C16:0), กรดไขมันสเตียริก (C18:0), โอเลอิก (C18:1-9) และ กรดไอโคซีโนอิก (C20:1-9) เป็นองค์ประกอบหลักของกรดไขมันสองกลุ่มนี้



นอกจากนี้ อาร์ทีเมียแรกพักมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) และ โอเมกา 6 (n-6 PUFA) ประมาณ 7 เปอร์เซนต์ และมีกรดไขมันลิโนลิค (C18:2n-6) ประมาณ 5 เปอร์เซนต์ ซึ่งมากกว่ากรดไขมันอะราซิดโนติก (Arachidonic acid, ARA, C20:4 n-6) ประมาณ 2 เท่า และมีกรดไขมันโดโคซะเฮกซะอีโนอิก (Docosahexaenoic acid, DHA, C22:6 n-3) ประมาณ 3 เปอร์เซนต์ ซึ่งมากกว่ากรดไขมันไอโคซะเพนตะอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid, EPA, C20:5n-3) ประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ยังพบกรดไขมัน 18:3n-3, 18:4n-3, 20:3n-3 และ 20:4n-3 ในปริมาณน้อยกว่า 1 เปอร์เซนต์ และมีอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3/กลุ่มโอเมกา 6 (n3/n6) ต่ำกว่า 1 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 กรดไขมันในอาร์ทีเมียที่กินแพลงก์ตอนพืชผสมระหว่างเตตราเซลมิส คีโตเซอโรส และไอโซโครซิส ในอัตราส่วน 1:0.5:0.5 เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

| ชนิดกรดไขมัน                                    | อาร์ทีเมียกิน<br>คีโตเซอโรส /ไอโซโครซิส/เตตราเซลมิส |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C14:0                                           | 0.6                                                 |
| C16:0                                           | 9.1                                                 |
| C18:0                                           | 4.7                                                 |
| C20:0                                           | 0.2                                                 |
| C22:0                                           | 0.3                                                 |
| Total saturated fatty acid (SFA)                | 15.0                                                |
| C16:1n-7                                        | 4.2                                                 |
| C18:1 n-9                                       | 28.3                                                |
| C 20:1                                          | 29.5                                                |
| Total monounsaturated fatty acid MUFA)          | 62.1                                                |
| C18:2n-6                                        | 4.8                                                 |
| C20:4n-6                                        | 2.5                                                 |
| Total n-6 polyunsaturated fatty acid (n-6 PUFA) | 7.2                                                 |
| C18:3n-3                                        | 0.4                                                 |
| C18:4n-3                                        | 0.3                                                 |
| C20:3n-3                                        | 0.4                                                 |
| C20:4n-3                                        | 0.8                                                 |
| C20:5n-3                                        | 0.9                                                 |
| C22:6n-3                                        | 3.4                                                 |
| Total n-3 polyunsaturated fatty acid (n-3 PUFA) | 6.3                                                 |
| Total n-3,n-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA) | 13.5                                                |
| n-3/n-6                                         | 0.9                                                 |

#### 4 กรดไขมันในกึ่งการดูนจากธรรมชาติ (ไขกึ่งการดูน ลูกกึ่งการดูนแรกพักและกึ่งการดูน วัยรุ่น) เปรียบเทียบกับลูกกึ่งการดูนแข็งแรงจากการเพาะเลี้ยง

กึ่งการดูนจากธรรมชาติมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) มากที่สุด รองลงมาคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) และ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) ซึ่งในกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) มากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 10) ในทางตรงกันข้าม ลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงมีองค์ประกอบกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) มากที่สุด รองลงมาคือกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และมีกรดไขมันกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) มากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) (ตารางที่ 3)

ไขกึ่งการดูนและลูกกึ่งการดูนแรกพักมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) มากกว่ากึ่งการดูนวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 10) กึ่งการดูนจากธรรมชาติทุกกลุ่มมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) มากกว่าลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยง ในทางตรงกันข้าม กึ่งการดูนจากธรรมชาติมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) น้อยกว่าลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณกรดไขมันสองกลุ่มนี้ในลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต และปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ลดลงมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) (ตารางที่ 3)

กึ่งการดูนจากธรรมชาติและลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) กรดไขมันสเตียริก (C18:0) และกรดไขมันโอลิอิก (C18:1n-9) เป็นองค์ประกอบหลักในกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ตามลำดับ (ตารางที่ 3) ไขกึ่งการดูนและลูกกึ่งการดูนแรกพักมีปริมาณกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) และ กรดไขมันปาล์มิโดลิอิก (C16:1n-7) มากกว่ากึ่งการดูนวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ตารางที่ 3) ไขกึ่งการดูนและลูกกึ่งการดูนแรกพักมีปริมาณกรดไขมันไมริสติก (C14:0) มากกว่าลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการ นอกจากนี้ ไขกึ่งการดูนมีปริมาณกรดไขมันไมริสติก (C14:0) กรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) และกรดไขมันปาล์มิโดลิอิก (C16:1n-7) มากกว่าลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการ ในขณะที่ลูกกึ่งการดูนแรกพักมีปริมาณกรดไขมันไมริสติก (C14:0) กรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) มากกว่าลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 3 ขึ้นไปจนกระทั่งลงเกาะ และมีกรดไขมันปาล์มิโดลิอิก (C16:1n-7) มากกว่าลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ ) สำหรับกึ่งการดูนวัยรุ่นจากธรรมชาติ กึ่งการดูนวัยรุ่นมีปริมาณกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) และ กรดไขมันปาล์มิโดลิอิก (C16:1n-7) น้อยกว่าลูกกึ่งการดูนแรกเกิดอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ ) กึ่งการดูนทุกกลุ่มมีกรดไขมันสเตียริก (C18:0) ไม่แตกต่างกันอย่างมี



นัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) นอกจากนี้ กุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติทุกกลุ่มและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะทุกระยะมีการดไขมันโอเลอิก (C18:1n-9) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) แต่ปริมาณกรดไขมันโอเลอิก (C18:1n-9) แตกต่างจากลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงระยะลงเกาะที่มีการดไขมันโอเลอิก (C18:1) ต่ำที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการมีการดไขมันกรดโอโคซีโนอิก (C20:1) มากกว่ากุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติทุกกลุ่ม (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณกรดไขมันไมริสติก (C14:0) กรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) และกรดไขมันปาล์มิโตลิก (C16:1n-7) ลดลงตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต แต่อย่างไรก็ตาม ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีการดไขมันสเตียริก (C18:0) กรดไขมันโอเลอิก (C18:1n-9) และกรดไขมันโอโคซีโนอิก (C20:1) ค่อนข้างคงที่ตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต (ตารางที่ 3)

ไข่กุ้งก้ามกรามมีการดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) น้อยที่สุดและกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นมีการดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) มากที่สุดและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) นอกจากนี้ไข่กุ้งก้ามกรามมีการดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) น้อยกว่าลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 10) และกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นมีการดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) มากกว่าลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 2-ระยะซุเอียะ 10 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 10) นอกจากนี้ ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 2-ระยะซุเอียะ 10 มีการดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) น้อยกว่าลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 11-ระยะซุเอียะ 12 และลูกกุ้งก้ามกรามระยะลงเกาะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักมีการดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) น้อยกว่าลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงตั้งแต่ระยะซุเอียะ 9 ขึ้นไปถึงระยะลงเกาะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ซึ่งลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันกลุ่มนี้ตลอดระยะพัฒนาการและการเพิ่มขึ้นนี้มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) มากกว่าการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) (ตารางที่ 3)

กุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติทั้งหมดมีการดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) และมีการดไขมันลิโนลิก (C18:2n-6) เป็นกรดไขมันหลักแต่ไม่พบกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) กุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยกว่าในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ ) (ตารางที่ 3) ถึงแม้ว่าลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงในระยะพัฒนาการแรกๆของการเจริญเติบโตมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณกรดไขมันกลุ่มนี้ค่อนข้างคงที่ในระยะพัฒนาการต่อมา การเพิ่มขึ้นของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันลิโนลิก (C18:2n-6) (ตารางที่ 3)




เช่นเดียวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) ไข่กึ่งการันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) น้อยที่สุดและแตกต่างจากลูกกึ่งการันแรกพักและลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ ) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 10) ในขณะที่กึ่งการันวัยรุ่นมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา (n-3 PUFA) มากที่สุดและแตกต่างจากลูกกึ่งการันแรกพักและลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงระยะชูเอี้ยงทุกระยะอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ ) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 10) แต่ไม่แตกต่างจากลูกกึ่งการันระยะลงเกาะ (ตารางที่ 3.3) ลูกกึ่งการันระยะแรกพักและลูกกึ่งการันระยะชูเอี้ยงทุกระยะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (n-3 PUFA) น้อยกว่าลูกกึ่งการันระยะลงเกาะอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ ) (ตารางที่ 3) กึ่งการันวัยรุ่นมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา (n-3 PUFA) มากกว่าลูกกึ่งการันแรกพักและไข่กึ่งการันประมาณ 1.7 และ 4 เท่า ตามลำดับ (ตารางที่ 3) ลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) เพิ่มขึ้นตลอดการเจริญเติบโต (ตารางที่ 3)

การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) เนื่องมาจากปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) ที่เป็นองค์ประกอบหลักของกรดไขมันกลุ่มนี้ กึ่งการันจากธรรมชาติมีกรดไขมันอีพีเอ (C20:5 n-3) มากกว่ากรดไขมันดีเอชเอ (C22:6 n-3) และมีกรดไขมันลิโนลินิก (C18:3n-3) น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3, ภาพที่ 10) กึ่งการันวัยรุ่นมีปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5 n-3) สูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์มากกว่าในไข่กึ่งการัน ในลูกกึ่งการันแรกพักและในลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ ) (ตารางที่ 3) ไข่กึ่งการันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอีพีเอ (C20:5 n-3) น้อยกว่าลูกกึ่งการันแรกพัก ลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงระยะชูเอี้ยง 2 -ระยะชูเอี้ยง 5 และลูกกึ่งการันระยะลงเกาะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p <0.05$ ) ลูกกึ่งการันแรกพักมีปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5 n-3) มากกว่าลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะพัฒนาการ (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ ปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ในลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงไม่เพิ่มขึ้นตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต (ตารางที่ 3)

กึ่งการันวัยรุ่นและลูกกึ่งการันแรกพักมีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6 n-3) ใกล้เคียงกัน แต่กึ่งการันสองกลุ่มนี้มีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6 n-3) มากกว่าไข่กึ่งการันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ ) กึ่งการันจากธรรมชาติทุกกลุ่มมีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6 n-3) น้อยกว่าลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงระยะชูเอี้ยง 4-ระยะชูเอี้ยง 12 และลูกกึ่งการันระยะลงเกาะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ตรงกันข้ามกับกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) เพิ่มขึ้นตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ ยังพบกรดไขมันชนิด C18:4n-3, C20:3n-3, C20:4n-3 ในลูกกึ่งการันจากการเพาะเลี้ยงระยะชูเอี้ยง 8 ขึ้นไป จนถึงระยะลงเกาะในปริมาณเล็กน้อยเช่นเดียวกับในกึ่งการันจากธรรมชาติ (ตารางที่ 3)



กึ่งการดูนวัยรุนมีอัตราส่วนกรดไขมันโอเมกา 3/โอเมกา 6 (n3/n6) มากที่สุดแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ ) กับไขกึ่งการดูนและลูกกึ่งการดูนแรกฟัก นอกจากนี้ ไขกึ่งการดูนมีอัตราส่วนกรดไขมันโอเมกา 3/โอเมกา 6 น้อยที่สุดและแตกต่างกับลูกกึ่งการดูนแรกฟักทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ ) การดูนจากธรรมชาติทุกกลุ่มมีอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3/โอเมกา 6 มากกว่าลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p <0.05$ ) (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ กึ่งการดูนจากธรรมชาติทุกกลุ่มมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) และกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ต่ำและไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ ) (ตารางที่ 3) ในขณะที่ลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) สูงกว่ากรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ทำให้มีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) สูงและมากกว่าในกึ่งการดูนจากธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ ) (ตารางที่ 3)



ภาพที่ 10 แสดงกรดไขมันในไขกึ่งการดูน (*H. picta*) ลูกกึ่งการดูนแรกฟักและกึ่งการดูนวัยรุน

ตารางที่ 3 องค์ประกอบกรดไขมันในกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) จากธรรมชาติ (ไขกึ่งการตุ๋น ลูกกึ่งการตุ๋นแรกพัก กึ่งการตุ๋นวัยรุ่น) และ ลูกกึ่งการตุ๋นจากการเพาะเลี้ยง

| กรดไขมัน | ไขกึ่งการตุ๋น            | ระยะ<br>ซูเอียะ1         | ระยะ<br>ซูเอียะ2         | ระยะ<br>ซูเอียะ3          | ระยะ<br>ซูเอียะ4          | ระยะ<br>ซูเอียะ5          | ระยะ<br>ซูเอียะ6          | ระยะ<br>ซูเอียะ7          | ระยะ<br>ซูเอียะ 8         | ระยะ<br>ซูเอียะ 9        | ระยะ<br>ซูเอียะ 10        | ระยะ<br>ซูเอียะ11        | ระยะ<br>ซูเอียะ12        | ระยะลง<br>เกาะ           | กึ่งวัยรุ่น              |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14:0     | 6.3 ± 0.1 <sup>a</sup>   | 3.7 ± 0.4 <sup>b</sup>   | 2.6 ± 0.3 <sup>c</sup>   | 1.9 ± 0.1 <sup>d</sup>    | 1.6 ± 0.4 <sup>de</sup>   | 1.6 ± 0.4 <sup>de</sup>   | 1.5 ± 0.4 <sup>de</sup>   | 1.4 ± 0.1 <sup>de</sup>   | 1.4 ± 0.4 <sup>de</sup>   | 1.2 ± 0.1 <sup>e</sup>   | 0.9 ± 0.1 <sup>e</sup>    | 1.0 ± 0.1 <sup>e</sup>   | 1.0 ± 0.1 <sup>e</sup>   | 1.5 ± 0.3 <sup>d</sup>   | 3.0 ± 0.1 <sup>c</sup>   |
| 16:0     | 22.6 ± 0.5 <sup>a</sup>  | 22.0 ± 1.6 <sup>ab</sup> | 19.3 ± 0.9 <sup>bc</sup> | 16.5 ± 0.9 <sup>cd</sup>  | 16.9 ± 2.1 <sup>cd</sup>  | 16.6 ± 2.3 <sup>cd</sup>  | 16.8 ± 2.2 <sup>cd</sup>  | 16.2 ± 0.6 <sup>cd</sup>  | 15.2 ± 2.5 <sup>d</sup>   | 14.1 ± 1.0 <sup>d</sup>  | 12.9 ± 0.6 <sup>d</sup>   | 13.4 ± 0.2 <sup>d</sup>  | 13.6 ± 0.4 <sup>d</sup>  | 16.1 ± 2.3 <sup>cd</sup> | 14.2 ± 0.5 <sup>d</sup>  |
| 18:0     | 9.4 ± 0.6                | 11.2 ± 3.4               | 9.4 ± 0.1                | 8.9 ± 1.5                 | 9.6 ± 1.2                 | 9.9 ± 1.4                 | 9.8 ± 1.4                 | 9.1 ± 0.3                 | 8.9 ± 0.5                 | 9.3 ± 0.5                | 9.1 ± 0.3                 | 9.6 ± 0.1                | 10.0 ± 0.8               | 10.4 ± 1.1               | 10.8 ± 0.3               |
| 20:0     | 2.2 ± 0.8 <sup>a</sup>   | tr                       | n.d.                     | tr                        | n.d.                      | tr                        | n.d.                      | n.d.                      | tr                        | 0.4 ± 0.4 <sup>ab</sup>  | 0.5 ± 0.5 <sup>ab</sup>   | 0.5 ± 0.0 <sup>ab</sup>  | 0.5 ± 0.2 <sup>ab</sup>  | 1.5 ± 2.6 <sup>ab</sup>  | 1.1 ± 0.0 <sup>ab</sup>  |
| 22:0     | 0.6 ± 0.5 <sup>ab</sup>  | 0.5 ± 0.5 <sup>ab</sup>  | n.d.                     | 1.0 ± 0.1 <sup>ab</sup>   | 0.3 ± 0.5 <sup>b</sup>    | 0.9 ± 0.8 <sup>ab</sup>   | 1.4 ± 0.2 <sup>ab</sup>   | 1.2 ± 0.1 <sup>ab</sup>   | 0.8 ± 0.7 <sup>ab</sup>   | 1.3 ± 0.1 <sup>ab</sup>  | 0.7 ± 0.6 <sup>ab</sup>   | 1.5 ± 0.0 <sup>ab</sup>  | 1.5 ± 0.1 <sup>ab</sup>  | 2.0 ± 0.3 <sup>a</sup>   | 2.7 ± 0.1 <sup>a</sup>   |
| SFA      | 42.2 ± 1.0 <sup>a</sup>  | 38.8 ± 3.8 <sup>a</sup>  | 31.3 ± 1.0 <sup>bc</sup> | 28.2 ± 2.3 <sup>bc</sup>  | 28.4 ± 3.0 <sup>bc</sup>  | 29.8 ± 4.9 <sup>bc</sup>  | 29.4 ± 4.2 <sup>bc</sup>  | 28.0 ± 1.1 <sup>bc</sup>  | 26.5 ± 2.2 <sup>bc</sup>  | 26.6 ± 1.9 <sup>bc</sup> | 24.7 ± 0.8 <sup>c</sup>   | 26.1 ± 0.4 <sup>bc</sup> | 26.7 ± 1.3 <sup>bc</sup> | 31.6 ± 2.7 <sup>bc</sup> | 32.6 ± 1.0 <sup>b</sup>  |
| 16:1     | 8.7 ± 0.8 <sup>a</sup>   | 5.3 ± 0.1 <sup>b</sup>   | 3.4 ± 1.0 <sup>cd</sup>  | 4.0 ± 1.2 <sup>c</sup>    | 2.3 ± 0.8 <sup>de</sup>   | 2.5 ± 0.5 <sup>de</sup>   | 2.6 ± 0.1 <sup>de</sup>   | 2.6 ± 0.3 <sup>de</sup>   | 3.2 ± 0.4 <sup>cd</sup>   | 3.0 ± 0.5 <sup>cd</sup>  | 2.7 ± 0.3 <sup>cd</sup>   | 2.2 ± 0.2 <sup>de</sup>  | 2.1 ± 0.1 <sup>de</sup>  | 1.6 ± 0.2 <sup>e</sup>   | 3.0 ± 0.0 <sup>cd</sup>  |
| 18:1     | 24.9 ± 0.6 <sup>ab</sup> | 25.7 ± 0.5 <sup>ab</sup> | 23.7 ± 4.3 <sup>ab</sup> | 29.0 ± 2.1 <sup>a</sup>   | 23.1 ± 2.3 <sup>b</sup>   | 24.4 ± 0.4 <sup>ab</sup>  | 26.0 ± 1.9 <sup>ab</sup>  | 26.6 ± 2.5 <sup>ab</sup>  | 26.6 ± 1.2 <sup>ab</sup>  | 26.9 ± 1.8 <sup>ab</sup> | 27.5 ± 1.8 <sup>ab</sup>  | 24.5 ± 0.8 <sup>ab</sup> | 25.3 ± 0.6 <sup>ab</sup> | 19.0 ± 2.3 <sup>c</sup>  | 24.6 ± 0.8 <sup>ab</sup> |
| 20:1     | 0.4 ± 0.1 <sup>e</sup>   | 2.8 ± 1.4 <sup>d</sup>   | 27.3 ± 2.1 <sup>a</sup>  | 18.8 ± 2.4 <sup>abc</sup> | 24.6 ± 4.7 <sup>ab</sup>  | 15.7 ± 2.1 <sup>bc</sup>  | 15.5 ± 1.4 <sup>bc</sup>  | 18.7 ± 4.1 <sup>abc</sup> | 19.0 ± 5.2 <sup>abc</sup> | 15.0 ± 2.8 <sup>c</sup>  | 18.0 ± 1.8 <sup>abc</sup> | 15.4 ± 0.8 <sup>bc</sup> | 15.1 ± 1.9 <sup>c</sup>  | 14.6 ± 3.3 <sup>c</sup>  | 1.7 ± 0.4 <sup>de</sup>  |
| MUFA     | 34.0 ± 1.4 <sup>a</sup>  | 33.9 ± 0.9 <sup>a</sup>  | 54.5 ± 3.2 <sup>a</sup>  | 51.8 ± 1.1 <sup>ab</sup>  | 50.0 ± 1.0 <sup>b</sup>   | 42.7 ± 2.1 <sup>d</sup>   | 44.2 ± 0.5 <sup>d</sup>   | 47.9 ± 1.4 <sup>bc</sup>  | 48.9 ± 4.0 <sup>b</sup>   | 44.9 ± 1.0 <sup>cd</sup> | 48.2 ± 0.4 <sup>bc</sup>  | 42.1 ± 0.5 <sup>d</sup>  | 42.6 ± 1.6 <sup>d</sup>  | 35.2 ± 1.8 <sup>e</sup>  | 29.4 ± 1.1 <sup>f</sup>  |
| 18:2n-6  | 0.3 ± 0.0 <sup>c</sup>   | 0.9 ± 0.1 <sup>cb</sup>  | 2.1 ± 1.9 <sup>b</sup>   | 3.8 ± 0.1 <sup>a</sup>    | 3.6 ± 0.8 <sup>a</sup>    | 3.9 ± 0.2 <sup>a</sup>    | 4.0 ± 0.6 <sup>a</sup>    | 4.4 ± 0.6 <sup>a</sup>    | 4.7 ± 0.3 <sup>a</sup>    | 4.6 ± 0.3 <sup>a</sup>   | 4.5 ± 0.4 <sup>a</sup>    | 4.0 ± 0.2 <sup>a</sup>   | 4.1 ± 0.1 <sup>a</sup>   | 3.3 ± 0.4 <sup>a</sup>   | 0.6 ± 0.0 <sup>c</sup>   |
| 20:4n-6  | n.d.                     | n.d.                     | n.d.                     | 1.0 ± 0.2 <sup>a</sup>    | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | tr                        | 0.3 ± 0.3 <sup>bc</sup>  | 0.6 ± 0.0 <sup>ab</sup>   | 0.5 ± 0.0 <sup>b</sup>   | 0.4 ± 0.0 <sup>b</sup>   | n.d.                     | n.d.                     |
| n-6PUFA  | 0.3 ± 0.0 <sup>c</sup>   | 0.9 ± 0.1 <sup>cb</sup>  | 2.1 ± 1.9 <sup>b</sup>   | 4.8 ± 0.2 <sup>a</sup>    | 3.6 ± 0.8 <sup>a</sup>    | 3.9 ± 0.2 <sup>a</sup>    | 4.0 ± 0.6 <sup>a</sup>    | 4.4 ± 0.6 <sup>a</sup>    | 4.9 ± 0.4 <sup>a</sup>    | 4.9 ± 0.4 <sup>a</sup>   | 5.1 ± 0.4 <sup>a</sup>    | 4.5 ± 0.2 <sup>a</sup>   | 4.5 ± 0.1 <sup>a</sup>   | 3.3 ± 0.4 <sup>a</sup>   | 0.6 ± 0.0 <sup>c</sup>   |
| 18:3n-3  | 0.7 ± 0.2 <sup>a</sup>   | tr                       | n.d.                     | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | tr                       | tr                        | n.d.                     | n.d.                     | n.d.                     | 0.6 ± 0.0 <sup>a</sup>   |
| 18:4n-3  | 1.1 ± 0.5                | n.d.                     | n.d.                     | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | tr                        | tr                       | tr                        | n.d.                     | n.d.                     | tr                       | 0.4 ± 0.1                |
| 20:3n-3  | n.d.                     | n.d.                     | n.d.                     | n.d.                      | 0.3 ± 0.6 <sup>bc</sup>   | n.d.                      | 0.8 ± 0.7 <sup>abc</sup>  | 0.3 ± 0.6 <sup>c</sup>    | 1.0 ± 0.9 <sup>abc</sup>  | 1.4 ± 0.6 <sup>abc</sup> | 2.0 ± 0.2 <sup>a</sup>    | 1.4 ± 0.0 <sup>abc</sup> | 1.7 ± 0.1 <sup>abc</sup> | 0.7 ± 0.6 <sup>abc</sup> | n.d.                     |
| 20:4n-3  | 0.6 ± 0.2                | 0.3 ± 0.5                | n.d.                     | tr                        | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | n.d.                      | tr                        | 0.4 ± 0.4                | 0.8 ± 0.0                 | 0.6 ± 0.0                | 0.6 ± 0.0                | n.d.                     | 0.5 ± 0.0                |
| 20:5n-3  | 2.6 ± 0.4 <sup>a</sup>   | 8.1 ± 2.3 <sup>b</sup>   | 6.0 ± 0.4 <sup>c</sup>   | 5.5 ± 1.1 <sup>c</sup>    | 4.2 ± 1.0 <sup>d</sup>    | 3.8 ± 0.3 <sup>d</sup>    | 3.3 ± 0.1 <sup>de</sup>   | 3.6 ± 0.2 <sup>d</sup>    | 2.9 ± 0.2 <sup>de</sup>   | 2.8 ± 0.4 <sup>de</sup>  | 2.0 ± 0.3 <sup>e</sup>    | 2.7 ± 0.3 <sup>de</sup>  | 2.7 ± 0.4 <sup>de</sup>  | 3.7 ± 0.6 <sup>d</sup>   | 18.5 ± 0.4 <sup>a</sup>  |
| 22:6n-3  | 1.3 ± 0.5 <sup>a</sup>   | 6.0 ± 2.6 <sup>d</sup>   | 5.7 ± 0.9 <sup>d</sup>   | 6.6 ± 1.0 <sup>d</sup>    | 8.7 ± 0.8 <sup>c</sup>    | 9.5 ± 1.1 <sup>bc</sup>   | 10.3 ± 0.2 <sup>bc</sup>  | 10.6 ± 0.4 <sup>bc</sup>  | 9.6 ± 0.9 <sup>bc</sup>   | 9.6 ± 1.4 <sup>bc</sup>  | 9.5 ± 0.8 <sup>bc</sup>   | 12.9 ± 0.8 <sup>b</sup>  | 12.7 ± 0.5 <sup>b</sup>  | 17.4 ± 1.5 <sup>a</sup>  | 6.2 ± 0.0 <sup>d</sup>   |
| n-3PUFA  | 6.2 ± 0.7 <sup>d</sup>   | 14.5 ± 2.7 <sup>bc</sup> | 11.7 ± 1.1 <sup>c</sup>  | 12.3 ± 0.3 <sup>c</sup>   | 15.2 ± 3.8 <sup>bc</sup>  | 13.4 ± 0.8 <sup>bc</sup>  | 14.4 ± 0.6 <sup>bc</sup>  | 14.5 ± 0.3 <sup>bc</sup>  | 13.9 ± 2.2 <sup>bc</sup>  | 15.1 ± 2.0 <sup>bc</sup> | 14.6 ± 0.2 <sup>bc</sup>  | 17.6 ± 0.8 <sup>b</sup>  | 17.7 ± 0.4 <sup>b</sup>  | 23.5 ± 4.2 <sup>a</sup>  | 26.1 ± 0.3 <sup>a</sup>  |
| n-3HUFA  | 4.5 ± 1.0 <sup>d</sup>   | 14.3 ± 3.1 <sup>bc</sup> | 11.7 ± 1.1 <sup>c</sup>  | 12.3 ± 0.3 <sup>c</sup>   | 13.2 ± 0.4 <sup>bc</sup>  | 13.4 ± 0.8 <sup>bc</sup>  | 14.4 ± 0.6 <sup>bc</sup>  | 14.5 ± 0.3 <sup>bc</sup>  | 13.8 ± 2.1 <sup>bc</sup>  | 14.4 ± 2.0 <sup>bc</sup> | 14.4 ± 0.4 <sup>bc</sup>  | 17.6 ± 0.8 <sup>b</sup>  | 17.7 ± 0.4 <sup>b</sup>  | 21.8 ± 1.6 <sup>a</sup>  | 25.1 ± 0.4 <sup>a</sup>  |
| PUFA     | 6.5 ± 0.7 <sup>e</sup>   | 15.5 ± 2.8 <sup>cd</sup> | 13.8 ± 3.0 <sup>d</sup>  | 17.1 ± 0.5 <sup>bcd</sup> | 18.8 ± 4.5 <sup>bcd</sup> | 17.3 ± 1.0 <sup>bcd</sup> | 17.3 ± 2.1 <sup>bcd</sup> | 18.9 ± 0.5 <sup>bcd</sup> | 18.8 ± 2.7 <sup>bcd</sup> | 20.1 ± 1.6 <sup>bc</sup> | 19.7 ± 0.5 <sup>bc</sup>  | 22.0 ± 0.9 <sup>ab</sup> | 22.2 ± 0.4 <sup>ab</sup> | 26.8 ± 3.8 <sup>a</sup>  | 26.7 ± 0.3 <sup>a</sup>  |
| HUFA     | 4.5 ± 1.0 <sup>e</sup>   | 14.3 ± 3.1 <sup>cd</sup> | 11.7 ± 1.1 <sup>d</sup>  | 13.4 ± 0.4 <sup>cd</sup>  | 15.2 ± 3.8 <sup>cd</sup>  | 13.4 ± 0.8 <sup>cd</sup>  | 14.1 ± 0.6 <sup>d</sup>   | 14.5 ± 0.3 <sup>cd</sup>  | 17.1 ± 2.0 <sup>c</sup>   | 14.8 ± 1.9 <sup>cd</sup> | 14.9 ± 0.4 <sup>cd</sup>  | 18.0 ± 0.8 <sup>c</sup>  | 18.1 ± 0.4 <sup>c</sup>  | 21.8 ± 1.6 <sup>b</sup>  | 25.1 ± 0.4 <sup>a</sup>  |
| n-3/n-6  | 20.7 ± 3.9 <sup>b</sup>  | 15.6 ± 2.6 <sup>c</sup>  | 5.5 ± 1.1 <sup>d</sup>   | 2.6 ± 0.1 <sup>e</sup>    | 4.3 ± 0.6 <sup>de</sup>   | 3.4 ± 0.2 <sup>de</sup>   | 3.7 ± 0.7 <sup>de</sup>   | 3.3 ± 0.4 <sup>de</sup>   | 2.8 ± 0.2 <sup>de</sup>   | 3.1 ± 0.6 <sup>de</sup>  | 2.9 ± 0.2 <sup>de</sup>   | 3.9 ± 0.2 <sup>de</sup>  | 3.9 ± 0.2 <sup>de</sup>  | 7.2 ± 2.1 <sup>d</sup>   | 43.6 ± 1.5 <sup>a</sup>  |
| DHA/EPA  | 0.5 ± 0.1 <sup>g</sup>   | 0.8 ± 0.3 <sup>efg</sup> | 1.0 ± 0.1 <sup>ef</sup>  | 1.3 ± 0.5 <sup>e</sup>    | 2.2 ± 0.6 <sup>d</sup>    | 2.5 ± 0.4 <sup>cd</sup>   | 3.2 ± 0.0 <sup>cd</sup>   | 3.0 ± 0.2 <sup>cd</sup>   | 3.3 ± 0.3 <sup>bcd</sup>  | 3.5 ± 0.8 <sup>bc</sup>  | 4.7 ± 0.9 <sup>ab</sup>   | 4.7 ± 0.5 <sup>ab</sup>  | 4.9 ± 0.8 <sup>a</sup>   | 4.7 ± 0.5 <sup>ab</sup>  | 0.3 ± 0.0 <sup>g</sup>   |

ค่าที่แสดงในตารางคือค่าเฉลี่ย ± sd, n=3; tr ≤ 0.2 %



## 5 กรดไขมันในลูกกึ่งการตุนจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกึ่งการตุนแข็งแรงและลูกกึ่งการตุนอ่อนแอ)



องค์ประกอบกรดไขมันในลูกกึ่งการตุนอ่อนแอคล้ายกับในลูกกึ่งการตุนแข็งแรงคือ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) มากที่สุด รองลงมาคือกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) ซึ่งในกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) มากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 PUFA) เมื่อลูกกึ่งการตุนมีพัฒนาการมากขึ้นพบว่ามีความแตกต่างของกรดไขมันแต่ละชนิดระหว่างลูกกึ่งการตุนแข็งแรงและลูกกึ่งการตุนอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ชนิดของกรดไขมันที่แตกต่างกันคือ กรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) เช่น กรดไขมันไมริสติก (C14:0) กรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) กรดไขมันสเตียริก (C18:0) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) เช่น กรดไขมันปาล์มิโดลิค (C16:1) กรดไขมันโอลิค (C18:1n-9) กรดไขมันไม่อิ่มตัวยาวเชิงซ้อนโซยาวกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 HUFA) เช่น กรดไขมันอีพีเอ (C20:5 n-3) และกรดไขมันดีเอชเอ (C20:6n-3) เป็นต้น (ภาพที่ 11-ภาพที่ 12, ภาพที่ 14-ภาพที่ 15, ภาพที่ 18-ภาพที่ 20)

ตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตจนกระทั่งลงเกาะ ลูกกึ่งการตุนอ่อนแอมีแนวโน้มการลดลงของกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) เช่นเดียวกับลูกกึ่งการตุนแข็งแรง การลดลงของกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) เนื่องมาจากการลดลงของกรดไขมันไมริสติก (C14:0) และกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) เป็นหลัก ทั้งลูกกึ่งการตุนแข็งแรงและอ่อนแอมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันอาราซิดิก (C20:0) และ behenic (C22:0) ตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในลูกกึ่งการตุนระยะลงเกาะ (ตารางที่ 3, ภาพที่ 12 และภาพที่ 13) ลูกกึ่งการตุนแข็งแรงและลูกกึ่งการตุนอ่อนแอมีกรดไขมันสเตียริก (C18:0) ในปริมาณคงที่ตลอดพัฒนาการการเจริญเติบโต (ตารางที่ 3, ภาพที่ 12) กรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นองค์ประกอบหลักของกรดไขมันอิ่มตัวในลูกกึ่งการตุนแข็งแรงและลูกกึ่งการตุนอ่อนแอคือกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) และกรดไขมันสเตียริก (C18:0) ปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวในลูกกึ่งการตุนแข็งแรงและอ่อนแอไม่แตกต่างกันทางสถิติยกเว้นลูกกึ่งการตุนอ่อนแอระยะซุเอียะ 2, ซุเอียะ 4 และซุเอียะ 10 มีกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) และ กรดไขมันสเตียริก (C18:0) มากกว่าลูกกึ่งการตุนแข็งแรง (ภาพที่ 11-ภาพที่ 12)



ในทำนองเดียวกับลูกกึ่งการตุนแข็งแรง การลดลงของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในลูกกึ่งการตุนอ่อนแอมีผลมาจากการลดลงของกรดไขมันปาล์มิติก (C16:1n-7) และกรดไขมันโอลิค (C18:1n-9) ซึ่งปริมาณกรดไขมันเหล่านี้ลดลงอย่างชัดเจนในลูกกึ่งการตุนระยะลงเกาะ (ตารางที่ 3, ภาพที่ 14) จึงมีผลให้ปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในลูกกึ่งการตุนแข็งแรงระยะซุเอียะ 2 ซุเอียะ 3 ซุเอียะ 9 และ ซุเอียะ 12 มากกว่าลูกกึ่งการตุนอ่อนแอระยะเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ภาพที่ 15)

ลูกกึ่งการทูนอนแอมิกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) คล้ายคลึงกับลูกกึ่งการทูน  
 แข็งแรง (ภาพที่ 17 และภาพที่ 21) เมื่อลูกกึ่งการทูนมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตมากขึ้น ลูกกึ่ง  
 การทูนอนแอมิกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (C18:2n-6) เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณกรดไขมันไม่อิ่ม  
 ตัวกลุ่มโอเมก้า 6 (n-6 PUFA) เพิ่มขึ้นในบางระยะพัฒนาการเจริญเติบโต (ภาพที่ 16) ลูกกึ่ง  
 การทูแข็งแรงและลูกกึ่งการทูนอนแอมิกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า 6 (n-6  
 PUFA) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ยกเว้นลูกกึ่งการทูแข็งแรงระยะชู่เอี้ยะ 10  
 ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า 6 (n-6 PUFA) มากกว่าลูกกึ่งการทูอ่อนแาระยะเดียวกันอย่างมี  
 นัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ภาพที่ 17) สำหรับกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า 3 (n-3 PUFA)  
 ตลอดระยะพัฒนาการลูกกึ่งการทูนอนแอมิกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (C18:3 n-3) ในปริมาณน้อยมาก  
 (ภาพที่ 18) และมีกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) มากกว่ากรดไขมันดีเอสเอ (C2:6n-3) เช่นเดียวกับลูก  
 กึ่งการทูแข็งแรง (ภาพที่ 20) นอกจากนี้ ลูกกึ่งการทูแข็งแรงและอ่อนแอมิกรดไขมันอีพีเอ  
 (C20:5n-3) ไม่เพิ่มขึ้นแต่มีปริมาณกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) เพิ่มขึ้นมีผลให้ปริมาณกรดไขมันอี  
 พีเอ (C20:5n-3) กรดไขมันดีเอสเอ (C2:6n-3) (ภาพที่ 3.18) กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด  
 (PUFA) (ภาพที่ 21) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนโซ่ยาว (HUFA) (ภาพที่ 21) แตกต่างกันอย่างมี  
 นัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าลูกกึ่งการทูแข็งแรงระยะลงเกาะมีกรดไขมัน  
 ดีเอสเอ (C22:6n-3) มากกว่ากรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) แต่อัตราส่วนกรดไขมันอีพีเอ(C20:5n-  
 3) / ดีเอสเอ (C2:6n-3) และ อัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3/โอเมก้า 6 (n-3/n-6) ในลูกกึ่งการทู  
 แข็งแรงและลูกกึ่งการทูอ่อนแาระยะลงเกาะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ภาพ  
 ที่ 22)






ภาพที่ 11 แสดงกรดไขมันไม่อิ่มตัว (C14:0) และอิ่มตัว (C16:0) ในไขมันจากการเพาะเลี้ยง (ไขมันแข็งแรงและไขมันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับไขมันในไขมันจากธรรมชาติ (ไขกระดูก ไขมันแรกเกิดและไขมันวัยรุ่น)








เปอร์เซ็นต์



เปอร์เซ็นต์




ภาพที่ 13 แสดงกรดไขมัน behenic (C22:0) และกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) ในลูกกุ้งการันตุนจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันตุนแข็งแรงและลูกกุ้งการันตุนอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันตุนการันตุนจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันตุน ลูกกุ้งการันตุนแรกฟักและกุ้งการันตุนวัยรุ่น)




ภาพที่ 14 แสดงกรดไขมันพาล์มิโตลิค (C16:1n-7) และโอลิค (C18:1n-9) ในปลากังการทูนจากการเพาะเลี้ยง (ปลากังการทูนแข็งแรงและปลากังการทูนอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับปลากังการทูนจากธรรมชาติ (ปลากังการทูนการทูน ปลากังการทูนแรกพักและปลากังการทูนวัยรุ่น)



เปอร์เซ็นต์




เปอร์เซ็นต์




ภาพที่ 15 แสดงกรดไขมัน C20:1 (n7-n9) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในปลากังการตูนจากการเพาะเลี้ยง (ปลากังการตูนแข็งแรงและปลากังการตูนอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับปลากังการตูนจากธรรมชาติ (ปลากังการตูน ปลากังการตูนแรกฟักและปลากังการตูนวัยรุ่น)

เปอร์เซ็นต์



เปอร์เซ็นต์




ภาพที่ 16 แสดงกรดไขมันลิโนลิอิก (C18:2n-6) และกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในลูกกึ่งการดูดจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกึ่งการดูดแข็งแรงและลูกกึ่งการดูดอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกึ่งการดูดจากธรรมชาติ (ไข่กึ่งการดูดการดูด ลูกกึ่งการดูดแรกฟัก และกึ่งการดูดวัยรุ่น)






เปอร์เซ็นต์



เปอร์เซ็นต์




ภาพที่ 18 แสดงกรดไขมันลิโนลิค (C18:3n-3) และ C18:4n-3 ในลูกกึ่งการดูจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกึ่งการดูแข็งแรงและลูกกึ่งการดูอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกึ่งการดูจากธรรมชาติ (ไขกึ่งการดูการดู ลูกกึ่งการดูแรกพักและกึ่งการดูวัยรุ่น)






เปอร์เซ็นต์



เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 20 แสดงกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) ในลูกกุ้งการันจากการเพาะเลี้ยง (ลูกกุ้งการันแข็งแรงและลูกกุ้งการันอ่อนแอ) เปรียบเทียบกับกุ้งการันจากธรรมชาติ (ไข่กุ้งการันการัน ลูกกุ้งการันแรกฟักและกุ้งการันวัยรุ่น)









## สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

### 1 ไขมันในลูกกุ้งการดูแลตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต

สัตว์น้ำวัยอ่อนโดยทั่วไปใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน และสัตว์น้ำแต่ละชนิดต้องการไขมันในปริมาณไขมันแตกต่างกัน (Sargent *et al*, 2002) ปริมาณไขมันที่ลดลงตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งการดูแลแสดงว่าลูกกุ้งการดูแลใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานเพื่อการพัฒนาการเจริญเติบโตในปริมาณมากกว่าไขมันที่ลูกกุ้งการดูแลสะสมไว้ เนื่องจากลูกกุ้งการดูแลมีระยะพัฒนาในการเจริญเติบโตระยะชูเอี้ยะทั้งหมด 12 ระยะก่อนลงเกาะซึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า 1 เดือน (วิรัช และคณะ, 2553; รินปวีร์และคณะ 2555; Fiedler, 1994, Calado, 2008) ดังนั้น ลูกกุ้งการดูแลจึงต้องสะสมไขมันในปริมาณมาก ในการศึกษาครั้งนี้ ปริมาณไขมันในลูกกุ้งการดูแลแรกฟักประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักแห้ง) ซึ่งสูงกว่าที่พบในกุ้งทะเลชนิดอื่นๆ กุ้งกลุ่ม caridian มีปริมาณไขมันค่อนข้างสูง (Anger *et al*, 2004) ซึ่งปริมาณไขมันในลูกกุ้งผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมที่ลูกกุ้งอาศัยอยู่ (Rosa *et al*, 2007) กุ้ง caridean, *Palaemon serratus* มีไขมันประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักแห้ง) (Narciso & Morais, 2001) และลูกกุ้งทะเล *Penaeus kerathurus* แรกเกิดมีไขมันมากกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักแห้ง) (Mourente *et al*, 1995) และมากกว่ากุ้งที่อาศัยอยู่ในเขตร้อน เช่น กุ้งมังกร spiny lobster, *Jasus edwardsii* ที่มีไขมันประมาณ 7-12 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักแห้ง) (Ritar *et al*, 2003) ปริมาณไขมันในลูกกุ้งการดูแลแรกฟักอาจเป็นระดับไขมันขั้นต่ำในอาหารที่เพียงพอสำหรับลูกกุ้งการดูแลแรกเกิดถึงลูกกุ้งการดูแลระยะชูเอี้ยะ 7 และระดับไขมันในอาหารสามารถลดลงได้เมื่อลูกกุ้งการดูแลมีระยะพัฒนาการสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ระดับไขมันที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกกุ้งการดูแลควรต้องทำการทดลองต่อไป

ปริมาณไขมันในลูกกุ้งการดูแลอ่อนแอที่น้อยกว่าในลูกกุ้งการดูแลแข็งแรงเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ลูกกุ้งการดูแลรอดตายน้อย ลูกกุ้งสะสมพลังงานไว้ในรูปไตรกลีเซอไรด์ (Håkanson, 1984; Fraser, 1989; Ouellet *et al*, 1992; Mourente *et al*, 1995) สัตว์น้ำกลุ่มกุ้งกั้งปูเจริญเติบโตโดยการลอกคราบและในการลอกคราบแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานอย่างมาก (Calado 2008) สัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดอื่นๆ เช่น ในกุ้งมังกร spiny lobster, *Jasus edwardsii* (Smith *et al*, 2003) กุ้ง *Jasus edwardsii* (Jeffs *et al*, 2001) ลูกม้าน้ำ *Hippocampus guttulatus* (Faleiro & Narciso, 2010; 2011) ลูกปลา Atlantic halibut, *Hippoglossus hippoglossus* (Rønnestad *et al*, 1995) ลูกปลา spotted wolf-fish, *Anarhichas minor* (Tveiten *et al*, 2004) เป็นต้น ใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานในการลอกคราบเพื่อการพัฒนาการเจริญเติบโตเช่นกัน ลูกกุ้ง *Penaeus kerathurus* ระยะนาพลิ (nauplii) ที่ยังไม่ได้เริ่มกินอาหารจากภายนอกดำรงชีพโดยใช้พลังงานจากไตรกลีเซอไรด์ที่สะสมไว้และปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในลูกกุ้งลดลงตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตแสดงว่าลูกกุ้งมีพัฒนาการเจริญเติบโตมากกว่าการสะสมพลังงาน (Mourente *et al*, 1995) ดังนั้น ลูกกุ้งการดูแลที่ได้รับสารอาหารในปริมาณเพียงพอ กับความต้องการและเฉพาะลูกกุ้งการดูแลแข็งแรงสมบูรณ์จึงสามารถพัฒนาการเข้าสู่ระยะต่อไปได้



(Raabe and Raabe, 2007; Calado 2008) แต่ถ้าปริมาณไขมันที่สะสมไว้นั้นลดลงมากเกินไปจนกระทั่งไม่เพียงพอกับความต้องการมีผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอ (Sargent *et al*, 2002, Faleiro & Narciso 2010) ในการศึกษาี้ ระยะเวลาที่ลูกกุ้งการันต์ตัวแรกและตัวสุดท้ายลงเกาะห่างกันเกือบ 2 สัปดาห์ อาจเนื่องมาจากลูกกุ้งการันต์แต่ละตัวได้รับสารอาหารไม่เท่ากันมีผลให้ลูกกุ้งการันต์แต่ละตัวมีพัฒนาการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน กุ้งกลุ่ม stenopodidian และ caridian มีระยะพัฒนาการเจริญเติบโตหลายระยะและใช้เวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตจนถึงระยะที่ว่าตัวลงเกาะวัสดุนาน เมื่อลูกกุ้งได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมมีผลให้พัฒนาการของลูกกุ้งช้าลง (delay metamorphosis) ในขณะที่การเจริญเติบโตและการลอกคราบยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา (Calado 2008) ดังนั้น อาหารที่ลูกกุ้งกินจึงใช้ในการดำรงชีพเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้และเมื่อใดที่ลูกกุ้งมีพลังงานสะสมเพียงพอและมีขนาดโตขึ้นจึงจะลอกคราบและพัฒนาการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะต่อไปได้ตามปกติ (Knolton, 1974) แต่เมื่อลูกกุ้งสะสมพลังงานไว้มากเกินไปมีผลให้ลูกกุ้งไม่สามารถลอกคราบ (Anger, 2001; Calado 2008) และตายในระหว่างการลอกคราบได้ (Ouellet *et al*, 1992)

## 2 กรดไขมันในลูกกุ้งการันต์ตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโต

ปริมาณไขมันที่มีสูงในไข่กุ้งการันต์และในลูกกุ้งการันต์ระยะชูเอี้ยะแรกๆ สอดคล้องกับปริมาณกรดไขมันกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ที่มีมากในลูกกุ้งการันต์แรกเกิดและลูกกุ้งการันต์จากการเพาะเลี้ยงระยะชูเอี้ยะแรกๆ และปริมาณไขมันที่มีน้อยในกุ้งการันต์วัยรุ่นและในลูกกุ้งการันต์ระยะลงเกาะสอดคล้องกับปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) โดยเฉพาะกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ที่มีมากในลูกกุ้งการันต์ลงเกาะและกุ้งการันต์วัยรุ่นแสดงถึงความสำคัญของกรดไขมันแต่ละกลุ่มต่อการเจริญเติบโตในแต่ละระยะของลูกกุ้งการันต์ ลูกสัตว์น้ำสะสมไขมันในรูปของไตรกรีเซอไรด์ (Triglycerides) ซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) เป็นองค์ประกอบและลูกสัตว์น้ำใช้กรดไขมันสองกลุ่มนี้ในขบวนการออกซิเดชัน (Sargent *et al*. 1989; Tocher 2003; Turnichi & Francis 2009) ในลักษณะตรงกันข้าม กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) โดยเฉพาะกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ที่มีมากในลูกกุ้งการันต์ระยะลงเกาะและในกุ้งการันต์วัยรุ่นแสดงว่าลูกกุ้งการันต์ต้องการกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อร่างกายในการเจริญเติบโต เนื่องจากกรดไขมันสองชนิดนี้เป็นองค์ประกอบกรดไขมันในฟอสโฟลิปิดซึ่งเป็นไขมันที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์เมมเบรนและเซลล์กล้ามเนื้อร่างกาย (Harrison, 1990; Anger, 2001) และการที่ไม่พบกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มเออาร์เอ (C20:4n-6) ในกุ้งการันต์จากธรรมชาติที่ศึกษาในครั้งนี้แสดงว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา 6 มีความสำคัญต่อลูกกุ้งการันต์น้อยกว่ากรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 เช่นเดียวกับในสัตว์น้ำทะเลวัยอ่อนชนิดอื่นๆ (Sargent *et al*, 2002)



สัตว์น้ำแต่ละชนิดมีปริมาณกรดไขมันแตกต่างกันไปขึ้นกับความต้องการในแต่ละระยะพัฒนาการของสัตว์น้ำวัยอ่อน (Faleiro & Narciso, 2010) กุ้งทะเลบางชนิดมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) มากที่สุดประมาณ 44-45 เปอร์เซ็นต์และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) มากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) เช่น กุ้ง caridean, *Alpheus saxidomus* (Wehrtmann & Graeve, 1998) กุ้ง *Chlorotocus crassicornis* (Rosa et al, 2007) กุ้งบางชนิดมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) มากที่สุดประมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) เช่น กุ้งทะเลสวยงาม *Lysmata seticaudata* (Calado et al, 2005b) กุ้งมังกร *Homarus gammarus* (Rosa et al, 2005) กุ้ง *Palaemonetes schmitti* (Wehrtmann & Graeve, 1998) แต่กุ้งบางชนิดมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ใกล้เคียงกันและมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) เช่น กุ้ง *Macropipus tuberculatus* (Rosa et al, 2007) ส่วนกุ้ง *Plesionika narval* มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) มากที่สุดประมาณ 39 เปอร์เซ็นต์ และมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) ใกล้เคียงกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) (Rosa et al, 2007) ซึ่งโดยรวมแล้วลูกกุ้งเหล่านี้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในปริมาณใกล้เคียงกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) หรือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ไม่แตกต่างจากกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) ในปริมาณมาก ในการศึกษาครั้งนี้ลูกกุ้งการุณแรกเกิดมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) เป็นองค์ประกอบประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ มากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) และมากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) ในขณะที่กุ้งการุณวัยรุ่นมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในปริมาณใกล้เคียงกันคือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ลูกกุ้งการุณจากการเพาะเลี้ยงทั้งลูกกุ้งการุณแข็งแรงและลูกกุ้งการุณอ่อนแอมีองค์ประกอบกรดไขมันแนวทางเดียวกัน และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) มากที่สุด ซึ่งองค์ประกอบกรดไขมันในลูกกุ้งการุณทุกกลุ่มที่ศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากลูกกุ้ง caridean, *Polybius henslowii* (Rosa et al, 2007) กุ้ง *Palaemon serratus* และ *Palaemon elegans* (Morais et al, 2002) ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) มากที่สุดประมาณ 47-49 เปอร์เซ็นต์และมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในปริมาณใกล้เคียงกัน แต่องค์ประกอบกรดไขมันในลูกกุ้งการุณจากการเพาะเลี้ยงคล้ายคลึงกับกุ้งทะเล *Nephrops novvegicus* (Rosa et al, 2003) และกุ้ง *Plesionika martia martia* (Morais et al, 2002) ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) มากที่สุดประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์และมีกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) มากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA)

ชนิดและปริมาณกรดไขมันที่สะสมในตัวสัตว์น้ำมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรดไขมันในสัตว์น้ำที่เป็นอาหาร (Mourete et al, 1995) ดังนั้น องค์ประกอบกรดไขมันในแพลงก์ตอนสัตว์ที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำในธรรมชาติอาจจะเป็นกรดไขมันที่ใกล้เคียงกับกรดไขมันที่สัตว์น้ำต้องการ (Hamre et



al., 2008) และใกล้เคียงกับกรดไขมันที่ได้รับจากอาหารและที่สะสมในสัตว์น้ำด้วย (Fernandez-Reiriz et al., 2011; Leonardos & Lucas, 2000) ดังนั้น องค์ประกอบกรดไขมันในกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติเป็นกรดไขมันที่เหมาะสมในการนำมาปรับใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่ากุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีองค์ประกอบกรดไขมันแตกต่างกันแสดงถึงความไม่เหมาะสมของกรดไขมันในอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งก้ามกราม ปริมาณกรดไขมันในลูกกุ้งก้ามกรามแรกเกิดคล้ายคลึงกับในไข่กุ้งก้ามกรามเนื่องมาจากลูกกุ้งก้ามกรามแรกเกิดอาศัยสารอาหารที่สะสมในไข่เพื่อการเจริญเติบโต (Mourete et al, 1995) เช่นเดียวกับสัตว์น้ำอื่นๆ เช่น ลูกม้าน้ำ *H. guttatus* (Faleiro & Narciso, L. 2010) เป็นต้น ในการศึกษาที่ทดลองการทดลองให้แม่กุ้งก้ามกรามกินดาวแดงซึ่งเป็นอาหารในธรรมชาติ (Calado, 2008; รินปวีร์และคณะ, 2555) ดังนั้นกรดไขมันที่พบในลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักส่วนหนึ่งเป็นกรดไขมันที่ถ่ายทอดจากดาวแดงผ่านแม่กุ้งก้ามกรามมาสะสมในไข่กุ้งก้ามกรามและในลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักด้วยและอีกส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบกรดไขมันในแม่กุ้งก้ามกราม ดังนั้น กรดไขมันในลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักในการศึกษานี้จึงควรเป็นสัดส่วนกรดไขมันที่ใกล้เคียงกับความต้องการกรดไขมันของลูกกุ้งก้ามกรามในระยะพัฒนาการแรกๆของการเจริญเติบโต และกรดไขมันในกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นจึงควรเป็นกรดไขมันที่ใกล้เคียงกับลูกกุ้งก้ามกรามลูกกุ้งระยะลงเกาะต้องการ ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) มากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และมากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) โดยเฉพาะกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) เนื่องมาจากอาร์ทีเมียแรกฟักที่ให้กินแพลงก์ตอนพืชผสมระหว่างเตตราเซลมิส คีโตเซอรอสและไอโซโคริซิสอัตราส่วน 1:0.0:0.5 มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์และมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) ประมาณ 4 เท่า ซึ่งองค์ประกอบกรดไขมันในแพลงก์ตอนพืชที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมมีผลต่อการรอดตายของสัตว์น้ำวัยอ่อน (Fernandez-Reiriz et al, 2011) ปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ที่ต่ำกว่ากรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงซึ่งตรงกันข้ามกับกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นจากธรรมชาติที่มีปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) มากกว่ากรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ประกอบกับลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงรอดตายน้อย แสดงว่าลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงที่ให้กินอาร์ทีเมียและเสริมด้วยแพลงก์พืชเหล่านี้มีกรดไขมันไม่เหมาะสมและมีผลให้ลูกกุ้งก้ามกรามได้รับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 PUFA) ไม่เพียงพอกับความต้องการ ลูกม้าน้ำ *H. guttatus* มีอัตราการรอดตายต่ำเมื่อเลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในปริมาณสูงและมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) ในปริมาณต่ำ และลูกม้าน้ำมีอัตราการรอดตายมากขึ้นเมื่อเลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนไฮดรอกซี (HUFA) และกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) ในปริมาณสูงแต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ในปริมาณต่ำ ผู้วิจัยสรุปว่าอาร์ทีเมียมีคุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกม้าน้ำโดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) และกรดไขมันอิ่มตัว (SFA) (Faleiro & Narciso, 2011)



กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อสัตว์น้ำสะท้อนถึงผลของการเมตะบอลิซึม และ/หรือสะท้อนถึงระดับกรดไขมันที่มีในอาหารของสัตว์น้ำ ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างกรดไขมัน ในเนื้อเยื่อสัตว์และในอาหารบ่งบอกว่าสัตว์น้ำเลือกที่จะใช้กรดไขมันชนิดใดในการเผาผลาญเป็น แหล่งพลังงานหรือเลือกที่จะสะสมกรดไขมันชนิดนั้นๆเป็นองค์ประกอบเซลล์ร่างกาย (Torstensen et al. 2004) กุ้งก้ามกรามทุกกลุ่มมีกรดไขมันชนิดปาล์มิติก (C16:0) กรดไขมันสเตียริก (C18:0) กรด ไขมันปาล์มิโดลิค (C16:1n-7) และกรดไขมันโอลิค (C18:1n-9) เป็นองค์ประกอบของกรดไขมัน อิ่มตัวทั้งหมด (SFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของสัตว์ น้ำทะเลที่มีกรดไขมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบกรดไขมันหลัก เช่น หมึก cephalopods (Navarro & Villanueva, 2000) กุ้งมังกร spiny lobster, *Jasus edwardsii* (Smith, et al, 2003); spiny lobster, *Panulirus homarus* (Chakraborty et al, 2010); ลูกกุ้งหลังแดงแรกเกิด *L. amboinensis* (Calado et al, 2009) กุ้ง caridians. *P. seratus* (Narciso & Morais, 2001) กุ้งก้ามกราม *M. rosenbergii* (Roustaian et al, 1999), กุ้ง penaeids, *P. japonicas*, *P. semisulcatus* and *P. monodon* (D'Souza & Loneragan, 1999) หอยสองฝา (clam), *Venerupis pullastra* (Fernandez-Reiriz et al, 2011) ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงทุกระยะมีกรดไขมัน กรดไขมันปาล์มิโดลิค (C16:1n-7) และ กรดไขมันโอลิค (C18:1n-9) น้อยกว่าในอาร์ทีเมีย นอกจากนี้ ปริมาณกรดไขมันสองชนิดนี้ลดลง อย่างมากในลูกกุ้งก้ามกรามระยะลงเกาะ แสดงว่าลูกกุ้งก้ามกรามเลือกใช้กรดไขมันเหล่านี้เป็นแหล่ง พลังงาน (Henderson, 1996; Sargent et al. 1989; 2002; Tocher 2003) เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่าง กรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัว เชิงซ้อนทั้งหมด (PUFA) ปลาทะเลเลือกใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA) เป็นแหล่งพลังงาน มากที่สุด (Sargent et al, 2002) กรดไขมันที่มีโซ่สั้นและมีจุดหลอมเหลวต่ำถูกย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ ดีกว่ากรดไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงและดังนั้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว(MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) จึงถูกดูดซึมนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในการออกซิเดชันได้ดีกว่ากรดไขมัน อิ่มตัว (SFA) (Leger 1985 Sargent et al. 1989; Tocher 2003) ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมี ปริมาณกรดไขมันปาล์มิติก (C16:0) กรดไขมันสเตียริก (C18:0) และกรดไขมันชนิด C20:0 และ C22:0 มากกว่าในอาร์ทีเมีย แต่ปริมาณกรดไขมันเหล่านี้ค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะในลูกกุ้งระยะพัฒนาหลังๆ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกรดไขมัน C20:0 และ C22:0 ที่เป็นกรดไขมันกรดไขมันไม่อิ่มตัวโซ่ยาวเนื่องมาจากการนำไปใช้ในกระบวนการ ออกซิเดชันยากกว่าการใช้กรดไขมันโซ่สั้น (Olsen, 1998) การเพิ่มขึ้นของกรดไขมันเหล่านี้พบได้ใน สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เช่นกัน เช่น ลูกกุ้งหลังแดง *Lysemata amboinensis* (Calado et al, 2005b; 2009; Calado, 2008) spiny lobster, *Jasus edwardsii* (Smith, et al, 2003) ลูกปลา common dentex, *Dentex dentex* (Gimenez et al, 2008) ปริมาณกรดไขมันที่เพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากการสังเคราะห์ จากกรดไขมันโซ่สั้นและการสะสมจากการกินอาหารที่มีปริมาณกรดไขมันเหล่านี้มากกว่าความ ต้องการ (Olsen, 1998; Smith et al, 2003) แต่การเพิ่มขึ้นของกรดไขมันอิ่มตัว (SFA) เหล่านี้ใน ปริมาณน้อยแสดงว่าลูกกุ้งก้ามกรามใช้กรดไขมันเหล่านี้ในปริมาณน้อยกว่าการสะสมและน้อยกว่าการ



ใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA) จากการทดลองพบว่ากุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (MUFA) ลดลงมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (SFA) ซึ่งพบได้ในลูกกุ้งหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆที่ใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเป็นแหล่งพลังงานเช่นกัน ดังเช่น กุ้งมังกร spiny lobster, *Jasus edwardsii* (Smith, et al, 2003) กุ้งก้ามกราม *Macrobrachium rosenbergii* (Cavalli et al, 2001) กุ้ง Norway lobster, *Nephrops norvegicus* (Rosa et al, 2003) ลูกกุ้ง *L. amboinensis* (Calado et al, 2008) ลูกม้าน้ำแรกเกิด *H. guttatus* (Faleiro & Narciso, 2010) ลูกปลา spotted wolf-fish, *Anarhichas minor* (Tveiten et al, 2004) และลูกปลา common dentex, *Dentex dentex* (Gimenez et al, 2008) เป็นต้น

อัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) เป็นดัชนีสำคัญบ่งบอกความต้องการกรดไขมันในแต่ละกลุ่มเพื่อการเจริญเติบโต (Sargent 1995; Holman, 1986) กุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติมีอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) สูงกว่ากุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงเนื่องมาจากมีกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) สูงกว่ากรดไขมันชนิดอื่นในกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) โดยลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักและกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นมีอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) เท่ากับ 16:1 และ 44:1 ตามลำดับ แต่ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราส่วนของกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 ต่ำและเมื่อลูกกุ้งก้ามกรามลงเกาะมีอัตราส่วนกรดไขมันสองกลุ่มนี้เท่ากับ 7 ในการศึกษาครั้งนี้ กุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติมีอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) สูงซึ่งแตกต่างจากกุ้งทะเลชนิดอื่นๆ ที่มีอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) ต่ำ เช่น กุ้งทะเลสวยงาม *Lysemata seticaudata* มีอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 และ โอเมกา 6 (n3/n6) ประมาณ 0.6 (Calado et al, 2005b) กุ้งมังกร spiny lobster (*Panulirus homarus*) แรกฟักมีอัตราส่วนโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) เท่ากับ 0.81 (Chakraborty et al, 2010) การที่ลูกกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติมีอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อ โอเมกา 6 (n3/n6) สูงเนื่องจากมีปริมาณกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 6 น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์และมีเฉพาะกรดไขมันลิโนลิอิก (C18:2n-6) เป็นองค์ประกอบ ซึ่งอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 ต่อโอเมกา 6 (n3/n6) ที่มีค่าสูงแสดงว่าลูกกุ้งต้องการกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนโซ่ยาวกลุ่มโอเมกา 3 (n-3 HUFA) โดยเฉพาะกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) ในปริมาณสูงและมีความต้องการกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนโซ่ยาวกลุ่มโอเมกา 6 (n-6 HUFA) จำกัดเช่นเดียวกับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ (Calado et al, 2009, Xu, et al, 1994; Wickens et al, 1995)

ความสำคัญของกรดไขมันกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ต่อสัตว์น้ำแตกต่างกันไป กุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามระยะแรกฟักไม่พบกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) แต่ลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงที่มีระยะพัฒนาการสูงขึ้นพบกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในปริมาณใกล้เคียงกับที่พบในลูกม้าน้ำคือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (Faleiro & Narciso, 2010) ในกุ้งทะเลชนิดอื่นๆ มีกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) มากกว่าลูกกุ้งก้ามกรามที่ศึกษาครั้งนี้ กุ้งมังกร phyllosoma spiny



lobster, *Jasus edwardsii*, มีเออาร์เอประมาณ 5 เปอร์เซนต์ (Smith *et al*, 2003) และ 6.6 เปอร์เซนต์ (Smith *et al*, 2004) ดังนั้นการที่ไม่พบกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในกุ้งก้ามกรามจากธรรมชาติและในลูกกุ้งก้ามกรามระยะแรกอาจเนื่องมาจากกุ้งก้ามกรามต้องการกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในปริมาณน้อย Suprayudi, Takeuchi & Hamasaki (2004) รายงานว่าระดับกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในอาหารประมาณ 0.1-0.2 เปอร์เซนต์อาจจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกปูทะเล *S. serrata* ในช่วงที่ให้กินอาร์ทีเมียเพราะว่าระดับกรดไขมันเออาร์เอที่สูงกว่านี้ไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มการรอดตายหรือเร่งให้ลูกปูทะเล *S. serrata* ลอกคราบเร็วขึ้น กรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) และอีพีเอ (C20:5n-3) เป็นสารตั้งต้นของฮอโมนกลุ่ม eicosanoid ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ (Rowley *et al*, 1995; Mustafa & Srivastava (1989) สัตว์น้ำทั่วไปมีความต้องการกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในปริมาณน้อยกว่ากรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) แต่ปริมาณความต้องการในสัตว์น้ำแต่ละชนิดแตกต่างกันซึ่งสภาวะแวดล้อมมีผลต่อความต้องการกรดไขมันชนิดนี้ (Bell and Sargent, 2003) สัตว์น้ำที่อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม มีความต้องการกรดไขมันเออาร์เอสูงในขณะที่สัตว์น้ำอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต้องการกรดไขมันเออาร์เอน้อย (Sargent *et al*, 1999) อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการอนุบาลลูกกุ้งในระบบที่ใส่แพลงก์ตอนพืชลงในถังอนุบาลช่วยลดความเครียดในลูกกุ้ง มังกร spiny lobster, *Panulirus homarus* (Chakraborty *et al*, 2010) ดังนั้น การพบกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ปริมาณเล็กน้อยในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงระยะพัฒนาบางระยะแต่ไม่พบกรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) ในกุ้งก้ามกรามระยะลงเกาะควรจะมาจากลูกกุ้งก้ามกรามใช้กรดไขมันเออาร์เอ (C20:4n-6) เป็นแหล่งพลังงานในปริมาณที่น้อยกว่ากรดไขมันชนิดอื่นๆมากกว่าการเครียดจากสภาพแวดล้อม

กรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) และอีพีเอ (C20:5n-3) เป็นกรดไขมันหลักในฟอสโฟลิปิดที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์เมมเบรน (Stubhuang *et al*, 2007; Tocher, 2003; 2010) กรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) มีปริมาณมากในเซลล์อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับสมองและการมองเห็น (Watanabe, 1993; Lauritzen *et al*, 2001; Tocher, 2003) และมีความสำคัญต่อการรอดตายและพัฒนาการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อนรวมทั้งสัตว์กลุ่มกุ้งก้ามกราม (Furuita *et al*, 2007; Takeuchi, 1997; Takeuchi *et al*, 1999; Hamasaki *et al*, 2002; Suprayudi *et al*, 2002ab) ปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) ในลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงที่มีมากกว่าในอาร์ทีเมียแรกฟักที่เป็นอาหารแสดงว่าลูกกุ้งก้ามกรามสะสมกรดไขมันสองชนิดนี้เพื่อเป็นองค์ประกอบเซลล์กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ เมื่อลูกกุ้งก้ามกรามมีพัฒนาการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นมีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ไม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การที่กรดไขมันอีพีเอไม่ลดลงไปมากกว่าเดิมแสดงว่านอกจากลูกกุ้งก้ามกรามใช้กรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) และดีเอชเอ (C22:6n-3) ในการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อในการเจริญเติบโตแล้ว ลูกกุ้งก้ามกรามยังใช้กรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ในการเมตาบอลิซึมด้วย (Sargent *et al*, 1989; Tocher 2003, 2010; Codabaccus *et al*, 2012; Stubhuang *et al*, 2007) ดังเช่นที่พบในลูกกุ้งทะเลสวยงาม *Lysmata amboinensis* (Calado *et al*,



2009) การสะสมกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) เป็นลักษณะที่พบได้ในสัตว์น้ำทั่วไป (Henderson & Tocher 1987) ลูกกุ้ง *Penaeus kerathurus* มีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) เพิ่มขึ้นเมื่อลูกกุ้งมีการเจริญเติบโตมากขึ้น (Mourente et al, 1995) ในการศึกษาครั้งนี้กุ้งการุณจากธรรมชาติ (ลูกกุ้งการุณแรกฟักและกุ้งการุณวัยรุ่น) มีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ในปริมาณใกล้เคียงกันคือประมาณ 6 เปอร์เซนต์ ซึ่งน้อยกว่ากุ้งการุณวัยรุ่นที่มีกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) สูงถึง 19 เปอร์เซนต์ ซึ่งตรงกันข้ามกับลูกกุ้งจากการเพาะเลี้ยงที่มีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) มากกว่าในกุ้งธรรมชาติโดยเฉพาะลูกกุ้งการุณระยะลงเกาะมีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ประมาณ 17 เปอร์เซนต์ ปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ประมาณ 6 เปอร์เซนต์ที่เท่ากันในลูกกุ้งการุณแรกเกิดและในกุ้งการุณวัยรุ่นอาจจะเพียงพอต่อความต้องการในการเจริญเติบโตของลูกกุ้งการุณ ดังนั้น การอนุบาลครั้งนี้ ลูกกุ้งการุณมีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) มากเพียงพอต่อความต้องการในการเจริญเติบโต แต่ลูกกุ้งจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ไม่เกิน 4 เปอร์เซนต์และปริมาณกรดไขมันชนิดนี้ไม่เพิ่มขึ้นขึ้นตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตอาจมีสาเหตุมาจากลูกกุ้งการุณสะสมกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ได้ในปริมาณน้อยกว่าการนำไปใช้มีผลให้มีปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ไม่เพียงพอต่อความต้องการและอาจเป็นปัจจัยหนึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกกุ้งการุณในการศึกษาครั้งนี้ ลูกปูม้า *Portunus trituberculatus* ที่ได้รับกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ในอาหารไม่เพียงพอ (Takeuchi et al, 1999b) และลูกปูทะเล *Scylla serrata* (Hamasaki et al, 2002; Suprayudi et al, 2002ab) กินอาหารที่มีปริมาณกรดไขมันอีพีเอที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการมีผลให้ลูกปูทั้งสองชนิดไม่สามารถลอกคราบสู่ระยะต่อไปได้และตายในระยะต่อมา แต่ลูกปูม้า *Portunus trituberculatus* ที่ได้รับกรดไขมันดีเอชเอในปริมาณเพียงพอ ลูกปูม้าลอกคราบบ่อยขึ้นและมีความกว้างของกระดองปูเพิ่มมากขึ้น (Takeuchi et al, 1999b) นอกจากนี้ ลูกหอย *Venerupis pullastra* (Fernandez-Reiriz et al, 2011) และ *Pecten maximus* (Delauney et al, 1993) ลงเกาะได้น้อยลงเมื่อกินอาหารที่มีกรดไขมันดีเอชเอไม่เพียงพอ

อัตราส่วนที่เหมาะสมของกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ต่อ อีพีเอ (C20:5n-3) มีผลต่อการรอดตายและการพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง *Lysemata debelius* (Palmtag & Holt, 2007) ลูกกุ้ง *L. amboinensis* (Tziouveli & Smith, 2012) ในกุ้งทะเลทั่วไปมีปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) มากกว่ากรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ซึ่งตรงกันข้ามกับปลาทะเลที่มีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) มากกว่ากรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) (Faleiro & Narciso, 2010) แต่อย่างไรก็ตาม ลูกกุ้งทะเลบางชนิดก็มีกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) น้อยกว่ากรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) เช่นกัน (Rosa et al, 2007) ในการศึกษาครั้งนี้กุ้งการุณจากธรรมชาติมีกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) น้อยกว่ากรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) คล้ายกับกุ้งทะเลทั่วไปและมีอัตราส่วนของกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ประมาณ 0.3-0.8 และมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ไม่แตกต่างกับลูกกุ้งทะเลชนิดอื่นๆ เช่น ลูกกุ้งมังกรแรกเกิด spiny lobster, *Jasus edwardsii* มีอัตราส่วนระหว่างดีเอชเอ (C22:6n-3)ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) เท่ากับ 0.9 (Smith, et al, 2003) ลูกกุ้งspiny



lobster, *Jasus edwardsii*, ระยะ phyllosoma จากธรรมชาติ (Smith *et al*, 2004) และ spiny lobster, *Panulirus homarus* ระยะแรกฟักมีอัตราส่วนดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) เท่ากับ 0.5 และ 0.4 ตามลำดับ (Chakraborty *et al*, 2010) ลูกกุ้งทะเลสวยงาม *Lysmata seticaudata* มีอัตราส่วนดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ประมาณ 0.6 (Calado *et al*, 2005b) ลูกกุ้ง *Palaemon serratus* มีอัตราส่วนดีเอสเอต่ออีพีเอประมาณ 0.4 (Morais *et al*, 2002) ลูกกุ้ง *Alpheus saxidomus* (Wehrtmann and Graeve, 1998) และลูกกุ้ง *Palaemon elegans* (Morais *et al*, 2002) มีอัตราส่วนดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ประมาณ 0.2 เป็นต้น อัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ที่ใกล้เคียงกับลูกกุ้งแรกเกิดเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมและลูกกุ้ง *Lysmata amboinensis* รอดตายมากขึ้น (Calado *et al*, 2008; Calado *et al*, 2009) ลูกกุ้งทะเลสวยงาม *L. amboinensis* แรกเกิดที่มีอัตราส่วนดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) เท่ากับ 1 สามารถลอกคราบไปสู่ระยะซุเอียะ 2 ได้ (Tziouveli & Smith 2012) เช่นเดียวกับลูกกุ้งมังกร spiny lobster, *Jasus edwardsii* ระยะ phyllosoma ที่อดอาหาร 3 วันและมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) เท่ากับ 1 สามารถลอกคราบไปสู่ระยะซุเอียะ 2 ได้เช่นกัน (Smith *et al*, 2004) แต่ลูกกุ้งทะเลสวยงาม *L. amboinensis* ที่อดอาหาร 3 วันและมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ประมาณ 3.7 ไม่สามารถลอกคราบไปสู่ระยะซุเอียะ 2 ได้ (Calado *et al*, 2008) แสดงว่าอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ที่มีค่าต่ำเหมาะสมต่อการรอดตายและการพัฒนาการของลูกกุ้งมากกว่าอัตราส่วน ดีเอสเอ(C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ที่มีสูง (Biswas *et al*, 2006; Woods, 2003) ในการศึกษาครั้งนี้ ลูกกุ้งการ์ตูนแรกเกิดและในกุ้งการ์ตูนวัยรุ่นมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) น้อยกว่า 1 แต่ลูกกุ้งการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยงระยะซุเอียะ 6 ขึ้นไปมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) มากกว่า 3 และเมื่อลูกกุ้งการ์ตูนลงเกาะมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) เท่ากับ 4.7 ซึ่งสูงกว่ากุ้งการ์ตูนวัยรุ่นจากธรรมชาติประมาณ 5 เท่า ซึ่งอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) เท่ากับ 4.7 อาจเป็นอัตราส่วนสูงสุดที่ลูกกุ้งการ์ตูนจากการศึกษาครั้งนี้สามารถลอกคราบและลงเกาะได้แต่อาจไม่ใช่อัตราส่วนที่เหมาะสมเนื่องจากจำนวนลูกกุ้งการ์ตูนลงเกาะน้อยและยังพบลูกกุ้งการ์ตูนตายหลังจากลงเกาะด้วย ซึ่งอัตราส่วนดีเอสเอ(C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งมีผลต่อการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนจากการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น การอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนด้วยอาหารที่มีกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) สูงกว่ากรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) และมีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3) ต่ออีพีเอ (C20:5n-3) ประมาณ 0.5-1 ซึ่งใกล้เคียงกับในกุ้งการ์ตูนธรรมชาติ จึงเป็นอัตราส่วนที่ควรจะต้องทำการศึกษาต่อไป

กุ้งทะเลสามารถสังเคราะห์กรดไขมันได้เองจาก acetate (Kanasawa *et al*, 1979) แต่การสังเคราะห์กรดไขมันของกุ้งมีข้อจำกัดเช่นเดียวกับในสัตว์น้ำอื่นๆ Watanabe *et al*, 1989; Takeuchi *et al*, 1990;1992; D'Abramo and Sheen, 1993) และไม่พอเพียงต่อความต้องการ (Sargent, *et al*, 2002; Deering *et al*, 1997; Merican & Shim, 1996) สัตว์น้ำวัยอ่อนสังเคราะห์กรดไขมันปริมาณ

มากเนื่องจากระบบการทำงานของร่างกายยังพัฒนาการไม่สมบูรณ์ (Faleiro & Narciso, 2011) ใน การศึกษานี้ ลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) และอีพีเอ (C22:6n3) มากกว่าในอาร์ทีเมียแรกฟักแต่มีกรดไขมันลิโนลินิก (C18:3n-3) น้อยกว่าในอาร์ทีเมียแรกฟัก ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) และอีพีเอ (C22:6n3) ในลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นจากการกินอาหารมากกว่าการสังเคราะห์จากกรดไขมันลิโนลินิก (C18:3n-3) นอกจากนี้ ลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) น้อยกว่าในกึ่งการดูนวัยรุ่นจากธรรมชาติมาก ประกอบกับไม่พบกรดไขมันลิโนลินิก (C18:3n-3) เป็นองค์ประกอบในลูกกึ่งการดูนจากการเพาะเลี้ยงแต่พบกรดไขมันตัวกลางในการสังเคราะห์กรดไขมัน เช่น C18:4n-3, C20:3n-3 และ C20:4n-3 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากรดไขมันลิโนลินิก(C18:3n-3) ถูกใช้ทั้งในกระบวนการเมตตะบอลิซึมและถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดไขมันโซยาวกลุ่มโอเมกา 3 (Sargent *et al*, 2002) ปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) ที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะพัฒนาการ แต่ปริมาณกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าลูกกึ่งการดูนไม่ได้สังเคราะห์กรดไขมันดีเอชเอไปยังอีพีเอเช่นเดียวกับลูกม้าน้ำ (Faleiro & Narciso, 2011)



## ข้อเสนอแนะ

1. ผลการศึกษานี้ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาการอนุบาลลูกกุ้งการันต์ด้วยวิธีการเสริมอาหารเทคนิคต่าง ๆ กัน เช่น การเลือกชนิดและอัตราส่วนการใช้แพลงก์ตอนพืชหรือการเสริมกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ในอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์โดยตรง หรือ การเสริมกรดไขมันอีพีเอ (C20:5n-3) ในแพลงก์ตอนสัตว์ (enrichment) ร่วมกับการใช้แพลงก์ตอนพืชเพื่อให้มีปริมาณกรดไขมันอีพีเอใกล้เคียงกับในกุ้งธรรมชาติมากที่สุด
2. การเลือกใช้แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมกว่าอาร์ทีเมียแรกฟัก
3. การอนุบาลในระบบปิดแทนการอนุบาลโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพราะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ดีกว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำ

## ผลผลิต

1. ผลงานตีพิมพ์ในสารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ -
2. การจดสิทธิบัตร -
3. ผลงานเชิงพาณิชย์ -
4. ผลงานเชิงสาธารณะ -



## บรรณานุกรม

- รินปวีร์ เกตุมณี ปริญญา สุทธินนท์ สมพิศ แยมเกษม และวาริช ตนุภัทรสรณ์ 2555 การอนุบาลกุ้งตัว  
ตลก (*Hymenocera picta* Dana, 1852) รายงานการวิจัยลำดับที่ 294 ฉบับที่ 25/2555  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง กรมประมง 22 หน้า
- วิชา เจริญดี เสาวภา สวัสดิ์ภักระ วรเทพ มุขวรรณ ศิริวรรณ ชูศรี และ อนงค์ คุณอาจ 2553  
การศึกษา พัฒนาการของคัพพะและกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน *Hymenocera picta* Dana (1852).  
รายงานการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม  
(กุ้งการ์ตูน, *Hymenocera picta* Dana 1852) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์  
สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 50 หน้า
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง กรมประมง 2552 การเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูน วันที่เข้าคั่น  
ข้อมูล 30 มกราคม 2556 เข้าถึงได้จาก <http://www.fisheries.go.th/cf-rayong>
- อรุณี ทับทอง 2552 เทคโนโลยีชาวบ้าน พฤษภาคม ปีที่ 21 ฉบับที่ 454 หน้าที่ 88-89.
- Anger, K. 2001. *The biology of Decapod Crustacean Larvae. Crustacean Issues* 14. A.A.  
Balkema Publishers, Rotterdam, the Netherlands, 420 pp.
- Anger, K., Lovrich, G.A., Thate, S. & Calcagno, J. A. 2004. Larval and early juvenile  
development of *Lithodes santolla* (Molina, 1782) (Decapoda: Anomura: Lithodidae)  
reared at different temperatures in the laboratory. *Journal of Experimental Marine  
Biology & Ecology* 306, 217-230.
- Bell, J.G. & Sargent, J.R. 2003. Arachidonic acid in aquaculture feeds: current status and  
future opportunities. *Aquaculture* 218, 491-499.
- Biswas, A. K., Nozaki, J., Kurata, M., Takii, K., Kumai, H. & Seoka, M. 2006. Effect of *Artemia*  
enrichment on the growth and survival of Pacific bluefin tuna *Thunnus orientalis*  
(Temminck & Schlegel) larvae. *Aquaculture Research* 37(16), 1662-1670.
- Brusca, R.C. & Brusca, G. J. 1990. *Invertebrates*. 1<sup>st</sup> ed. Sinauer Associates, Sunderland,  
Massachusetts.

- Calado, R., Lin, J., Rhyne, A.L., Araujo, R. & Narciso, L. 2003a. Marine ornamental decapods-popular pricey, and poorly studied. *Journal of crustacean biology*, 23(4), 963-973.
- Calado, R.; Narciso, L.; Morais, S.; Rhyne, A.L. & Lin, J. 2003b. A rearing system for the culture of ornamental decapod crustacean larvae. *Aquaculture*, 218, 329-339.
- Calado, R.; Figueiredoa, J.; Rosab, R.; Nunesb, M.L. & Narcisoa, L. 2005a, Effects of temperature, density, and diet on development, survival, settlement synchronism, and fatty acid profile of the ornamental shrimp *Lysmata seticaudata*. *Aquaculture* 245, 221- 237.
- Calado, R.; Rosa, R.; Nunes, M. L & Narciso, L. 2005b. Amino and fatty acid dynamics of *Lysmata seticaudata* (Decapoda: Hippolytidae) embryos during early and late reproductive season. *Marine Biology* 147: 341–351.
- Calado, R. 2008. *Marine Ornamental Shrimp.*, Biology, Aquaculture and Conservation. Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. pp. 263.
- Calado, R., Vitorino, A., Reis, A., LopesdaSilva, T. & Dinis, M.T. 2008. Effect of different diets on larval production, quality and fatty acid profile of the marine ornamental shrimp *Lysmata amboinensis* (de Mann, 1888) using wild larvae as a standard. *Aquaculture Nutrition* 15, 484-491.
- Calado, R., Vitorino, A., Reis, A., Silva, T.L.& Dinis, M.T. 2009 .Effect of different diets on larval production, quality and fatty acid profile of the marine ornamental shrimp *Lysmata amboinensis* (de Man, 1888), using wild larvae as a standard. *Aquaculture Nutrition* 15(5), 484–491.
- Cavalli, R.O., Tamtin, M., Lavens, P. & Sorgeloss, P. 2001. Variation in lipid classes and fatty acid content in tissues of wild *Macrobrachium rosenbergii* (de Man) females during maturation. *Aquaculture* 193, 63-86.
- Chakraborty, K., Chakraborty, R. D. & Radhakrishnan, E.V. 2010. Fatty acid profiles of spiny lobster (*Panulirus homarus*) phyllosoma fed enriched *Artemia*. *Aquaculture Research* 41,e 393-e403.



- Christie, W. W. 1993. Preparation of derivatives of fatty acids for chromatographic analysis. In: Christie, W.W. (ed.). *Advances in Lipid Methodology-Two*. The Oily Press, Dundee, UK. pp. 69-111.
- Codabaccus, B. M., Carter, C.G., Bridle, A. R. & Nichols, P.D. 2012. The “n-3 LC-PUFA sparing effect” of modified dietary n-3 LC-PUFA content and DHA to EPA ratio in Atlantic salmon smolt. *Aquaculture*. 356-357, p.135-140.
- D'Abramo, L. R. & Sheen, S.-S. 1993. Polyunsaturated fatty acid nutrition in juvenile freshwater prawn *Macrobrachium rosenbergii*. *Aquaculture* 115, 63-86.
- Delaunay, F., Marty, Y., Moal, J. & Samain, J.F. 1993. The effect of monospecific algal diets on growth and fatty acid composition of *Pecten maximus* (L). larvae. *J.Exp.Mar. Biol. Ecol.* 173, 163-179.
- D'Souza, F.M.L. & Loneragan, N.R. 1999. Effects of monospecific and mixed-algae diets on survival, development and fatty acid composition of penaeid prawn (*Penaeus* spp.) larvae. *Marine Biology* 133, 621-633.
- Deering, M.J., Fielder, D. R. & Hewitt, D.R. 1997. Growth and fatty acid composition of juvenile leather prawns, *Penaeus monodon*, fed different lipids. *Aquaculture* 151, 131-141.
- Faleiro, F. & Narciso, L. 2010. Lipid dynamics during early development of *Hippocampus guttulatus* seahorses: Searching for clues on fatty acid requirements. *Aquaculture* 307 (1-2) 56-64.
- Faleiro, F. & Narciso, L. 2011. Prey–predator dynamics in seahorses (*Hippocampus guttulatus*): deciphering fatty acid clues. *Aquaculture Research*, 1-16.
- Fernandez-Reiriz, M.J., Perez-Camacho, A., Peteiro, L.G. & Labarta, U. 2011. Growth and kinetics of lipids and fatty acids of the clam *Venerupis pullastra* during larval development and postlarvae. *Aquaculture and Nutrition* 17, 13-23.
- Fiedler, G. C. (1994) The larval stages of the Harlequin shrimp, *Hymenocera picta* (Dana). Master thesis of the University of Hawaii. 101 pp.

- Fiedler, G. C. 2000. Sex determination and reproductive biology of two caridean shrimp genera: Hymenocera and Lysmata. *A PhD thesis*. University of Hawaii, USA, 220 pp.
- Fiedler, G.C. 2002. The Influence of Social Environment on Sex Determination in Harlequin Shrimp (*Hymenocera picta*: Decapoda, Gnathophyllidae). *Journal of Crustacean Biology* 22 (4), 750-761.
- Folch, J., Lees, M., & Sloane-Stanley, G. H. 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. *Journal of Biological Chemistry*, 226, 497-509.
- Furuita, H., Hori, K., Suzuki, N., Sugita, T. & Yamamoto, T. 2007. Effects of n-3 and n-6 fatty acids in broodstock diet on reproduction and fatty acid composition of broodstock and eggs in the Japanese Eel *Anguilla japonica*. *Aquaculture* 267, 55-61.
- Gimenez, G., Estevez, A., Henderson, R.J. & Bell, J.G. 2008. Changes in lipid content, fatty acid composition and lipid class composition of eggs and developing larvae (0–40 days old) of cultured common dentex (*Dentex dentex Linnaeus 1758*). *Aquaculture Nutrition*. 14 (4) 300–308.
- Hamasaki, K., Suprayudi, M.A. & Takeuchi, T. 2002. Effect of dietary n-3 HUFA on larval orphogenesis and metamorphosis to megalops in the seed production of mud crab, *Scylla serrata* (brachyuran: Portunidae). *Suisan Zoshoku* 50, 333-340.
- Hamre, K., Srivastava, A., Ronnestad, I., Mangor-Jensen, A. & Stoss, J. 2008. Several micronutrients in the rotifer *Brachionus* sp. may not fulfill the nutritional requirements of marine fish larvae. *Aquaculture Nutrition* 14, 51-60.
- Hamasaki, K., Suprayudi, M.A. & Takeuchi, T. 2002. Effect of dietary n-3 HUFA on larval morphogenesis and metamorphosis to megalops in the seed production of mud crab, *Scylla serrata* (brachyuran: Portunidae). *Suisan Zoshoku* 50, 333-340.



- Harlioglu, M.M., Koprucu, K., Harlioglu, A.G., Yilmaz, O., Aydin, S., Yonar, S. M., Duran, T.C. & Ozcan, S. 2012. The effects of dietary n-3 series fatty acid on the fatty acid composition, cholesterol and fat-soluble vitamins of pleopodal eggs and stage 1 juveniles in a freshwater crayfish, *Astacus leptodactylus* (Eschscholtz). *Aquaculture* 356-357 p.310-316.
- Harrison, K.E. 1990. The role of nutrition in maturation, reproduction and embryonic development of decapods crustaceans: a review. *Journal of Shellfish Research* 9, 1-28.
- Henderson, R. J. 1996. Fatty acid metabolism in freshwater fish with particular reference to polyunsaturated fatty acids. *Archives of Animal Nutrition* 49, 5-22.
- Holman, R.T. 1986. Nutritional and biochemical evidence of acyl interaction with respect to essential polyunsaturated fatty acids. *Prog. Lipid. Res.*, 25: 29-39.
- Holthuis, L. B. 1955. The recent genera of the Caridean and Stenopodidean shrimps (Class Crustacean: Order Decapoda: Supersection Natantia) with keys for their determination. *Zoologische Verhandelingen Uitgegeven door het Rijkmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden*, 26:1-156.
- Henderson, R. J. & Tocher, D. R. 1987. Lipid composition and biochemistry of freshwater fish. *Progressive Lipid Research* 26, 281-347.
- Izquierdo, M.S., Tandler, A., Salhi, M. & Kolkovski, S. 2001. Influence of dietary polar lipids quantity and quality on ingestion and assimilation of labeled fatty acids by larval gilthead seabream. *Aquaculture Nutrition* 7, 153-160.
- Jeffs, A.G., Nichols, P.D., Bruce, M.P. 2001. Lipid reserves used by pueruli of the spiny lobster *Jasus edwardsii* in crossing the continental shelf of New Zealand. *Comp. Biochem. Physiol.* 129A, 305-311.
- Kanasawa, A., Teshima, S.I. & Ono, K. 1979. relationship between EFA requirement of aquatic animals and capacity for bioconversion of linolenic acid to highly unsaturated fatty acids. *Comp. Biochem. Physiol.* 63b; 295-298.

- Kittaka, J. 1994. Culture of Phyllosomas of spiny lobster and its application to studies of larval recruitment and aquaculture. *Crustaceana* 66, 258-270.
- Knolton, R.E. 1974. Larval developmental processes and controlling factors in decapod Crustacea, with emphasis on the Caridea. *Thalassia jugoslavica*. 10, 138-158.
- Lauritzen, L., Hanzen, H.S., Jorgensen, M.H. & Michaelsen, K.F. 2001. The essentiality of long chain *n*-3 fatty acids in relation to development and function of the brain and retina. *Prog. Lipid. Res.* 40, 1-94.
- Leger, C. 1985. Digestion, absorption and transport of lipids. In: Cowey, C. B., Mackie, A. M. and Bell, J. G. (eds). *Nutrition and Feeding in Fish*. Academic Press Inc., London, UK. pp. 299-332.
- Leonardos, N., & Lucas, I.A.N. 2000. The use of larval fatty acid as an index of growth in *Mytilus edulis* L. larvae. *Aquaculture* 184, 155-166.
- Lin, J., Zhang, D., Creswell, R., 2001. Aquaculture of marine ornamental shrimps: an overview. Aquaculture 2001 Book of Abstracts. *World Aquaculture Society*, Orlando, FL, USA, p. 378.
- Lin, J. & Shi, P. 2002. Effect of broodstock diet on reproductive performance of the golden banded shrimp *Stenopus scutellatus*. *Journal of the World Aquaculture Society*, 33, 383-386.
- Martin, J. W. & David, G.E. 2001. An updated classification of the recent Crustacea. *Science Series Natural History Museum of Los Angeles County*, 39, 1-124.
- Merican, Z. O. & Shim, K.F. 1996. Qualitative requirements of essential fatty acids for juvenile *Penaeus monodon*. *Aquaculture* 147, 275-291.
- Morais, S., Narciso, L., Calado, R., Nunes, M.L., Rosa, R. 2002. Lipid dynamics during the embryonic development of *Plesionika martia* (Decapoda; Pandalidae), *Palaemon serratus* and *P. elegans* (Decapoda; Palaemonidae): relation to metabolic consumption. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 242, 195-204.



- Mourente, G., Medina, A., González, S. & Rodríguez, A. 1995. Variation in lipid content and nutritional status during larval development of the marine shrimp *Penaeus kerathurus*. *Aquaculture* 130, 187-199.
- Mustafa, T. & Srivastava, K.C. 1989. Prostaglandins (eicosanoids) and their role in ectothermic organisms. *Advances in Comparative Physiology and Biochemistry* 5, 157-207.
- Naessens, E., Lavens, P., Gomez, L., Browdy, C.L., McGovern-Hopkins, K., Spencer, A.W., Kawahigashi, D. & Sorgeloos, P. (1997) Maturation performance of *Penaeus vannamei* co-fed *Artemia* biomass preparations. *Aquaculture*, 155, 87-101.
- Narciso, L. & Morais, S. 2001. Fatty acid profile of *Palaemon serratus* (Palaemonidae) eggs and larvae during embryonic and larval development using different live diets. *Journal of Crustacean Biology* 21, 566-574.
- Navarro, J.C., Villanueva, R. 2000. Lipid and fatty acid composition of early stages of cephalopods: an approach to their lipid requirements. *Aquaculture*. 183, 161-177.
- Olsen Y. 1998. Lipids and essential fatty acids in aquatic food web: what can freshwater ecologists learn from mariculture? In: *Lipids in Freshwater Ecosystems* (ed. by M.T. Arts & B. C. Wainman), pp. 161-202. Springer, New York.
- Ouellet, P., Taggart, C.T., and Frank, K.T. 1992. Lipid condition and survival in shrimp (*Pandalus borealis*) larvae. *Can.J. Fish. Aquat. Sci.* 49, 368-378.
- Palmtag, M.R., 7 Holt, G.J. 2007. Experimental studies to evaluate larval survival of the fire shrimp, *Lysmata debelius*, to the juvenile stage. *Journal of the World Aquaculture Society* 38, 102-113.
- Pavlov, D., Kjorsvik. E., Refsti, T. & Anderson, O. 2004. Broodstock and egg production. In: *Culture of Cold Water marine Fish* (eds. by E. Moksness, E. Kjorsvik & Y. Olsen), Blackwell Publishing, Oxford, UK, 544pp.
- Raabe, C. & Raabe, L., 2007. The Care and Breeding of the Harlequin Shrimp. Retrieved on the 20<sup>th</sup> January 2012. From [WWW.home2.pacific.net.ph/~sweetyummy42/harlequinshrimp.html](http://WWW.home2.pacific.net.ph/~sweetyummy42/harlequinshrimp.html).

- Radhakrishnan, E. V. & Vijayakumaran, M. 1993. Early larval development of the spiny lobster *Panulirus homarus* (Linnaeus, 1785) reared in the laboratory. *Crustaceana* 68, 151-159.
- Rhyne, A. L., 2002. Improvements in marine ornamental shrimp culture. M.Sc. thesis, Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA.
- Ritar, A.J., Dunstan, G.A., Crear, B. J. & Brawn, M.R. 2003. Biochemical composition during growth and starvation of early larval stages of cultured spiny lobster (*Jasus edwardsii*) phyllosoma. *Comparative Biochemical & Physiology A* 136, 353-370.
- Rønnestad, I. Finn, R.N., Lein, I. & Lie, Q. 1995. Compartmental changes in the contents of total lipid, lipid classes and their associated fatty acids in developing yolk-sac larvae of Atlantic halibut, *Hippoglossus hippoglossus* (L.) *Aquaculture Nutrition* 1(2), 119-130.
- Roustaian, P., Kamarudin, M.S., Omar, H., Saad, C.R. & Ahmad, M.H. 1999. Changes in fatty acid profile during larval development of freshwater prawn *Macrobrachium rosenbergii* (de Man). *Aquaculture Research* 30, 815-824.
- Rosa, R., Morais, S., Calado, R., Narciso, L. & Nunes, M.L. 2003. Biochemical changes during the embryonic development of Norway lobster, *Nephrops norvegicus* (Crustacea: Decapoda). *Aquaculture* 221, 507-522.
- Rosa, R., Calado, R., Narciso, L. & Nunes, M. L. 2007. Embryogenesis of decapods crustaceans with different life history traits, feeding ecology and habitats: a fatty acid approach. *Marine Biology* 151, 935-947.
- Rosa, R., Calado, R., Andradea, A.M., Narciso, L. & Nunes, M. L. 2005. Changes in amino acids and lipids during embryogenesis of European lobster, *Homarus gammarus* (Crustacea:Decapoda). *Comp. Biochem. Physiol.B* 140, 241-249.
- Roustaian, P., Kamarudin, M.S., Omar, H., Saad, C.R. & Ahmad, M.H. 1999. Changes in fatty acid profile during larval development of freshwater prawn *Macrobrachium rosenbergii* (de Man). *Aquaculture Research* 30, 815-824.



- Rowley, A.F., Knight, J., Lloyd-Evans, P., Holland, J.W. & Vickers, P.J. 1995. Eicosanoids and their role in immune modulation in fish-a brief overview. *Fish Shellfish Immunol.* 5, 549-567.
- Rueda, F.M. & Martinez, F.J. (2001) A review on the biology and potential aquaculture of *Dentex dentex*. *Rev. Fish Biol. Fish.*, 11, 57-70.
- Sargent, J. R., Henderson, R. J., & Tocher, D. R. 1989. The lipids. In: Halver, J. E. (ed). *Fish Nutrition* 2<sup>nd</sup> editions. Academic Press, San Diego, USA. pp. 154-219.
- Sargent, J.R., 1995. Origin and functions of egg lipids: nutritional implications. In: Bromage, N. R., Roberts, R.J.(Eds.), *broodstock Management and Egg and Larval Quality*. Blachwell Science, London, pp. 353-372.
- Sargent, J, Bell, G., McEvoy, L., Tocher, D. & Estevez, A. 1999. Recent developments in the essential fatty acid nutrition of fish. *Aquaculture* 177, 191-1999.
- Sargent, J.R., Tocher, D.R., & Bell, J.G. 2002. The lipids, In: Halver, J.E., Hardy, R.W. (eds.), *Fish Nutrition* , third edition. Academic Press, San Diego, CA, USA, pp. 181-257.
- Sean, M. M. 2010. Culturing the harlequin shrimp *Hymenocera picta*. *Center for tropical and subtropical aquaculture*. December. vol. 2(12), Retrieved on the 20<sup>th</sup> January 2012. From <http://www.ctsa.org>.
- Sewell, A., 2007. Ornamental crustaceans. Reef keeping online magazine. Retrieved on the 20<sup>th</sup> January 2012. From <http://www.reefkeeping.com/issues/2007-05/as/index.php>
- Smith, G. G., Thompson, P. A., Ritar, A. J. and Dunstan, G. A. 2003. Effects of starvation and feeding on the fatty acid profiles of Stage I phyllosoma of the spiny lobster, *Jasus edwardsii*. *Aquaculture Research* 34, 416-426.
- Smith, G., Ritar, A.J., Johnston, D. & Dunstan, G. A. 2004. Influence of diet on broodstock lipid and fatty acid composition and larval competency in the spiny lobster, *Jasus edwardsii* *Aquaculture* 233, 451-475.

- Smith, G. G., Thompson, P. A., Ritar, A. J. and Dunstan, G. A. 2003. Effects of starvation and feeding on the fatty acid profiles of Stage I phyllosoma of the spiny lobster, *Jasus edwardsii*. *Aquaculture Research* 34, 416-426.
- Stubhuang, I., Lie, O. & Torstensen, B.E. 2007. Fatty acid productive value and  $\beta$ -oxidation capacity in Atlantic salmon tissues (*Salmo salar* L.) fed on different lipid sources along the whole growth period. *Aquaculture Nutrition* 13, 145-155.
- Sui, L.X., Mattieu, W., Cheng, Y.X., Sorgeloose, P. 2007. The effect of dietary n-3 HUFA levels and DHA/EPA ratios on growth, survival and osmotic stress tolerance of Chinese mitten crab, *Eriocheir sinensis* larvae. *Aquaculture* 273, 139-150.
- Suprayudi, M.A., Takeuchi, T. & Hamasaki, K. 2004. Essential fatty acids for larval mud crab *Scylla serrata*: implications of lack of the ability to bioconvert C18 unsaturated fatty acids to highly unsaturated fatty acids. *Aquaculture*, 231(1-4), 403-416.
- Suprayudi, M.A., Takeuchi, T., Hamasaki, K. & Hirokawa, J. 2002a. The effect of n-3 HUFA content in rotifers on the development and survival of mud crab, *Scylla serrata*, larvae. *Suisan Zoshoku* 50; 205-212.
- Suprayudi, M.A., Takeuchi, T., Hamasaki, K. & Hirokawa, J. 2002b. Effect of *Artemia* feeding schedule and density on the survival and development of larval mud crab, *Scylla serrata*. *Fish. Sci.* 68, 1295-1303.
- Takeuchi, T. 1997. Essential fatty acid requirements of aquatic animal with emphasis on fish larvae and fingerlings. *Reviews in Fisheries Science* 5, 1-25.
- Takeuchi, T., Toyota, M. Satoh, S. & Watanabe, T. 1990. Requirement of juvenile red sea bream *Pargus major* for eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids. *Nippon Suisan Gaikkashi*, 56, 1263-1269.
- Takeuchi, T., Arakawa, T., Satoh, S. & Watanabe, T. 1992. Supplemental effect of phospholipid and requirement of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids of juvenile striped jack. *Nippon Suisan Gaikkashi*, 58, 707-713.



- Takeuchi, T., Satoh, N., Sekiya, S., Shimizu, T. & Watanabe, T. 1999. The effect of dietary EPA and DHA on molting rate of larval swimming crab *Portunus trituberculatus*. *Nippon Suisan Gakkaishi* 65, 988-1004.
- Tocher, D.R., Fraser, A.J., Sargent, J.R. & Gamble, J.C. 1985. Fatty acid composition of phospholipids and neutral lipids during embryonic and early larval development in Atlantic herring (*Clupea harengus* L.). *Lipids* 20, 69-74.
- Tocher, D. R. 2003. Metabolism and functions of lipids and fatty acids in teleost fish. *Reviews in Fisheries Science* 11 (2), 107-184.
- Tocher, D.R. 2010. Fatty acid requirements in ontogeny of marine and freshwater fish. *Aquaculture Research* 41, 717-732.
- Torstensen, B. E., Froyland L., Ornsrud, R., & Lie, O. 2004. Tailoring of a cardioprotective fillet fatty acid composition of Atlantic salmon (*Salmo salar*) fed vegetable oils. *Food Chemistry*, 87, 567-580.
- Turnichi, G.M., Francis, D.S. 2009. Fatty acid metabolism (desaturation, elongation and  $\beta$ -oxidation) in rainbow trout fed fish oil or linseed oil-based diets. *British Journal of Nutrition* 102, 69-81.
- Tveiten, H., Jobling, M. & Andreassen, I. 2004. Influence of egg lipids and fatty acids on egg viability, and their utilization during embryonic development of spotted wolf-fish, *Anarhichas minor* Olafsen. *Aquaculture Research* 35, (2), 152-161.
- Tziouveli, V. & Smith, G.G. 2012. A comparison of the fatty acid profiles of adult tissues, and newly hatched, fed and starved *Lysmata amboinensis* larvae. *Aquaculture Research* 43, (4) p. 577-587.
- Vahappiily, R. & Chen, E. 1998. Heterotrophic production potential of omega-3 polyunsaturated fatty acids by microalgae and algae-like microorganisms. *Botanica Marina* 41, 553-558.
- Wabnitz, C., Taylor, M., Green, C. and Razak, T. 2003. From Ocean to Aquarium. UNEP-WCMC. Cambridge.

- Watanabe, T., Arakawa, T., Takeuchi, T. & Satoh, S. 1989. Comparison between eicosapentanoic and docosahexaenoic acids in terms of essential fatty acid efficiency in juvenile striped jack *Pseudocaranx dentex*. *Nippon Suisan Gaikkashi*, 55, 1989-1995
- Watanabe, T. 1993. Importance of docosahexaenoic acid in marine larval fish. *Journal of the World Aquaculture Society* 24, 152-161.
- Wehrtmann, I.S. & Graeve, M. 1998. Lipid composition and utilization in developing eggs of two tropical marine caridean shrimps (Decapoda: Caridea:Alpheidae, Palaemonidae). *Comp. Biochem. Physiol.B* 121, 457-463.
- Wickens, J.F., beard, T.W. & Child, A. R. 1995. Maximizing lobster, *Homarus gammarus* (L.), egg and larval viability. *Aquaculture Research* 26, 379-392.
- Woods, C.M.C. 2003. Effects of varying *Artemia* enrichment on growth and survival of juvenile seahorses, *Hippocampus abdominalis*. *Aquaculture* 220, 537-548.
- Wouters, R., Gomez, L., Lavens, P. & Calderon, J. 1999. Feeding enriched *Artemia* biomass to *Penaeus vannamei* broodstock: its effect on reproductive performance and larval quality. *Journal of Shellfish Research* 18, 651-656.
- Wu, X.G., Cheng, Y.X., Sui, L.Y., Zeng, C.S., Southgate, P.C., Yang, X. Z., 2007. Effect of dietary supplement of phospholipid and highly unsaturated fatty acids on reproductive performance and offspring quality of the Chinese mitten crab, *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards), female broodstock. *Aquaculture* 273, 602-613.
- Xu, X.L., Ji, W. J., Castell, J.D. & O'dor, R.K. 1994a. Essential fatty acid requirement of the Chinese prawn, *Penaeus chinensis*. *Aquaculture*.127, 29-40.
- Xu X. L., Ji W. J., Castell J. D. & O'Dor R. K. 1994. Influence of dietary lipid sources on fecundity, egg hatchability and fatty acid composition of Chinese prawn (*Penaeus chinensis*) broodstock. *Aquaculture* 119, 359-370.
- Zar, J. H. 1999. *Biostatistical Analysis*. 4<sup>th</sup> editions. Prentice-Hall, New Jersey, USA. 123 pp.




Zhang, D., Lin, J. and Creswell, R., 1997. Larviculture and effect of food on larval survival and development in golden coral shrimp *Stenopus spimosus*. *Journal of Shellfish Research* 16(2), 367-369.

Zhang, D., Lin, J., Creswell, R., 1998. Effects of food and temperature on survival and development in the peppermint shrimp *Lysmata wurdemanni*. *Journal of the World Aquaculture Society* 29 (4), 471-476.

ภาคผนวก ก  
(ตารางวิเคราะห์ผลทางสถิติ)





ภาพภาคผนวกที่ 1 ตัวอย่างโครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน PUFA (1) ลูกกุ้งการ์ตูน (2) และ สารมาตรฐานกรดไขมันชนิดเดียว)

ตารางภาคผนวกที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณไขมันในกึ่งการตูน (*H. picta*)  
จากธรรมชาติและลูกกึ่งการตูนจากการเพาะเลี้ยงที่ระดับนัยสำคัญ 95%

ANOVA

Lipid

|                | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| Between Groups | 198.760        | 14 | 14.197      | 16.155 | .000 |
| Within Groups  | 26.364         | 30 | .879        |        |      |
| Total          | 225.124        | 44 |             |        |      |

ตารางภาคผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณไขมันในกึ่งการตูน (*H. picta*)  
อ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงที่ระดับนัยสำคัญ 95%

ANOVA

Asine transformation

|                | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| Between Groups | 122.058        | 8  | 15.257      | 28.686 | .000 |
| Within Groups  | 8.510          | 16 | .532        |        |      |
| Total          | 130.568        | 24 |             |        |      |



ตารางภาคผนวกที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกรดไขมันอิ่มตัวในกึ่งการ์ตูน (*H. picta*)  
จากธรรมชาติและในลูกกึ่งการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยงที่ระดับนัยสำคัญ 95%

ANOVA

|                      | Sum of<br>Squares | Df | Mean Square | F      | Sig. |
|----------------------|-------------------|----|-------------|--------|------|
| c14:0 Between Groups | 247.279           | 14 | 17.663      | 48.465 | .000 |
| Within Groups        | 10.933            | 30 | .364        |        |      |
| Total                | 258.212           | 44 |             |        |      |
| c16:0 Between Groups | 202.978           | 14 | 14.498      | 12.082 | .000 |
| Within Groups        | 36.000            | 30 | 1.200       |        |      |
| Total                | 238.978           | 44 |             |        |      |
| c18:0 Between Groups | 16.816            | 14 | 1.201       | .934   | .536 |
| Within Groups        | 38.580            | 30 | 1.286       |        |      |
| Total                | 55.396            | 44 |             |        |      |
| c20:0 Between Groups | 256.572           | 14 | 18.327      | 3.029  | .005 |
| Within Groups        | 181.500           | 30 | 6.050       |        |      |
| Total                | 438.072           | 44 |             |        |      |
| c22:0 Between Groups | 261.871           | 14 | 18.705      | 4.131  | .001 |
| Within Groups        | 135.853           | 30 | 4.528       |        |      |
| Total                | 397.724           | 44 |             |        |      |
| SFA Between Groups   | 367.575           | 14 | 26.255      | 10.788 | .000 |
| Within Groups        | 73.013            | 30 | 2.434       |        |      |
| Total                | 440.588           | 44 |             |        |      |

ตารางภาคผนวกที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกึ่งการ์ตูน  
(*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกึ่งการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยงที่ระดับนัยสำคัญ 95%

ANOVA

|                      | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
|----------------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| c16:1 Between Groups | 242.163        | 14 | 17.297      | 22.126 | .000 |
| Within Groups        | 23.453         | 30 | .782        |        |      |
| Total                | 265.616        | 44 |             |        |      |
| c18:1 Between Groups | 100.252        | 14 | 7.161       | 4.576  | .000 |
| Within Groups        | 46.947         | 30 | 1.565       |        |      |
| Total                | 147.199        | 44 |             |        |      |
| c20:1 Between Groups | 2682.179       | 14 | 191.584     | 30.502 | .000 |
| Within Groups        | 188.433        | 30 | 6.281       |        |      |
| Total                | 2870.612       | 44 |             |        |      |
| MUFA Between Groups  | 780.956        | 14 | 55.783      | 52.285 | .000 |
| Within Groups        | 32.007         | 30 | 1.067       |        |      |
| Total                | 812.963        | 44 |             |        |      |



ตารางภาคผนวกที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา 6 ในกุ้ง  
 การ์ตูน (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยงที่ระดับ  
 นัยสำคัญ 95%

ANOVA

|                        | Sum of<br>Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
|------------------------|-------------------|----|-------------|--------|------|
| c18:2n6 Between Groups | 431.366           | 14 | 30.812      | 11.899 | .000 |
| Within Groups          | 77.687            | 30 | 2.590       |        |      |
| Total                  | 509.052           | 44 |             |        |      |
| c20:4n6 Between Groups | 176.256           | 14 | 12.590      | 15.100 | .000 |
| Within Groups          | 25.013            | 30 | .834        |        |      |
| Total                  | 201.270           | 44 |             |        |      |
| n-6PUFA Between Groups | 486.228           | 14 | 34.731      | 13.259 | .000 |
| Within Groups          | 78.580            | 30 | 2.619       |        |      |
| Total                  | 564.808           | 44 |             |        |      |

ตารางภาคผนวกที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา 3 ใน  
 กุ้งการ์ตูน (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยงที่ระดับ  
 นัยสำคัญ 95%

| ANOVA   |                |                   |    |             |        |      |
|---------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|------|
|         |                | Sum of<br>Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
| c18:3n3 | Between Groups | 110.590           | 14 | 7.899       | 7.582  | .000 |
|         | Within Groups  | 31.253            | 30 | 1.042       |        |      |
|         | Total          | 141.843           | 44 |             |        |      |
| c18:4n3 | Between Groups | 155.210           | 14 | 11.086      | 1.939  | .063 |
|         | Within Groups  | 171.493           | 30 | 5.716       |        |      |
|         | Total          | 326.703           | 44 |             |        |      |
| c20:3n3 | Between Groups | 387.051           | 14 | 27.647      | 5.892  | .000 |
|         | Within Groups  | 140.767           | 30 | 4.692       |        |      |
|         | Total          | 527.818           | 44 |             |        |      |
| c20:4n3 | Between Groups | 177.292           | 14 | 12.664      | 1.954  | .061 |
|         | Within Groups  | 194.400           | 30 | 6.480       |        |      |
|         | Total          | 371.692           | 44 |             |        |      |
| c20:5n3 | Between Groups | 770.105           | 14 | 55.008      | 60.125 | .000 |
|         | Within Groups  | 27.447            | 30 | .915        |        |      |
|         | Total          | 797.552           | 44 |             |        |      |
| c22:6n3 | Between Groups | 732.441           | 14 | 52.317      | 38.519 | .000 |
|         | Within Groups  | 40.747            | 30 | 1.358       |        |      |
|         | Total          | 773.188           | 44 |             |        |      |
| n-3PUFA | Between Groups | 587.018           | 14 | 41.930      | 20.416 | .000 |
|         | Within Groups  | 61.613            | 30 | 2.054       |        |      |
|         | Total          | 648.631           | 44 |             |        |      |



ตารางภาคผนวกที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน อัตราส่วนของกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3/ 6 และอัตราส่วนของกรดไขมันดีเอสเอ (C22:6n-3)/ อีพีเอ (C20:5n-3) ในกึ่งการันตุน (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกึ่งการันตุนจากการเพาะเลี้ยงที่ระดับนัยสำคัญ 95%

| ANOVA  |                |                |    |             |        |      |
|--------|----------------|----------------|----|-------------|--------|------|
|        |                | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
| PUFA   | Between Groups | 648.803        | 14 | 46.343      | 19.639 | .000 |
|        | Within Groups  | 70.793         | 30 | 2.360       |        |      |
|        | Total          | 719.596        | 44 |             |        |      |
| HUFA   | Between Groups | 652.612        | 14 | 46.615      | 27.317 | .000 |
|        | Within Groups  | 51.193         | 30 | 1.706       |        |      |
|        | Total          | 703.806        | 44 |             |        |      |
| n3n6   | Between Groups | 3608.044       | 14 | 257.717     | 56.467 | .000 |
|        | Within Groups  | 136.920        | 30 | 4.564       |        |      |
|        | Total          | 3744.964       | 44 |             |        |      |
| DHAEPA | Between Groups | 455.846        | 14 | 32.560      | 42.594 | .000 |
|        | Within Groups  | 22.933         | 30 | .764        |        |      |
|        | Total          | 478.779        | 44 |             |        |      |

ตารางภาคผนวกที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันในกิ้งก่า (H. picta) จากธรรมชาติและลูกกิ้งก่าจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

Lipid

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Samplename | N | Subset for alpha = 0.05 |         |
|------------|---|-------------------------|---------|
|            |   | 1                       | 2       |
| Juveniles  | 3 | 6.4200                  |         |
| zoeal8     | 3 | 7.4300                  |         |
| Settle     | 3 | 7.6833                  |         |
| zoeal12    | 3 | 7.7100                  |         |
| zoeal9     | 3 | 7.7333                  |         |
| zoeal11    | 3 | 8.0133                  |         |
| zoeal10    | 3 | 8.5800                  |         |
| zoeal6     | 3 |                         | 10.3300 |
| zoeal7     | 3 |                         | 10.5167 |
| zoeal4     | 3 |                         | 10.9067 |
| zoeal5     | 3 |                         | 11.3067 |
| Eggs       | 3 |                         | 11.5800 |
| zoeal1     | 3 |                         | 12.6133 |
| zoeal2     | 3 |                         | 12.6200 |
| zoeal3     | 3 |                         | 12.6533 |
| Sig.       |   | .104                    | .081    |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันในกึ่งการตูน (*H. picta*) อ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

Asine transformation

Student-Newman-Keuls<sup>a, b</sup>

| Weak-zoeal | N | Subset for alpha = 0.05 |          |           |
|------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|            |   | 1                       | 2        | 3         |
| zoeal 9    | 3 | 5.608298                | 8.410649 | 9.942675  |
| zoeal 4    | 3 | 6.023509                |          |           |
| zoeal 12   | 3 | 6.272626                |          |           |
| zoeal 7    | 2 | 6.838953                |          |           |
| zoeal 11   | 3 |                         |          |           |
| zoeal 3    | 3 |                         |          |           |
| zoeal 10   | 2 |                         |          |           |
| zoeal 8    | 3 |                         |          | 10.907253 |
| zoeal 5    | 3 |                         |          | 11.603733 |
| Sig.       |   | .243                    | 1.000    | .075      |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.700.
- b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

ตารางภาคผนวกที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันอิ่มตัวชนิด C14:0 ในกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จาก ธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |       |        |        |
|-----------|---|-------------------------|-------|-------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2     | 3     | 4      | 5      |
| zoeal10   | 3 | 5.567                   |       |       |        |        |
| zoeal11   | 3 | 5.833                   |       |       |        |        |
| zoeal12   | 3 | 5.833                   |       |       |        |        |
| zoeal9    | 3 | 6.133                   |       |       |        |        |
| zoeal8    | 3 | 6.733                   | 6.733 |       |        |        |
| zoeal6    | 3 | 6.900                   | 6.900 |       |        |        |
| zoeal7    | 3 | 6.900                   | 6.900 |       |        |        |
| Settle    | 3 | 7.067                   | 7.067 |       |        |        |
| zoeal5    | 3 | 7.200                   | 7.200 |       |        |        |
| zoeal4    | 3 | 7.233                   | 7.233 |       |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         | 7.867 |       |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         |       | 9.267 |        |        |
| juveniles | 3 |                         |       | 9.900 |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         |       |       | 11.067 |        |
| Eggs      | 3 |                         |       |       |        | 14.567 |
| Sig.      |   | .054                    | .277  | .209  | 1.000  | 1.000  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a.Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 11 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมัน  
 อิ่มตัวชนิด C16:0 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการ  
 เพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      |
| zoeal10   | 3 | 20.667                  |        |        |        |        |
| zoeal11   | 3 | 21.000                  | 21.000 |        |        |        |
| zoeal9    | 3 | 21.333                  | 21.333 |        |        |        |
| zoeal12   | 3 | 21.333                  | 21.333 |        |        |        |
| juveniles | 3 | 21.667                  | 21.667 |        |        |        |
| zoeal8    | 3 | 22.667                  | 22.667 |        |        |        |
| zoeal7    | 3 | 23.333                  | 23.333 | 23.333 |        |        |
| settle    | 3 | 23.333                  | 23.333 | 23.333 |        |        |
| zoeal3    | 3 | 23.667                  | 23.667 | 23.667 |        |        |
| zoeal4    | 3 | 23.667                  | 23.667 | 23.667 |        |        |
| zoeal6    | 3 | 23.667                  | 23.667 | 23.667 |        |        |
| zoeal5    | 3 |                         | 24.000 | 24.000 |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         |        | 25.667 | 25.667 |        |
| zoeal1    | 3 |                         |        |        | 27.333 | 27.333 |
| eggs      | 3 |                         |        |        |        | 28.000 |
| Sig.      |   | .066                    | .066   | .159   | .072   | .462   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 12 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันอิ่มตัวชนิด C18:0 ในกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) จาก ธรรมชาติและลูกกุ้งการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c18:0

| Zoeal                                    | N | Subset for alpha = 0.05 |  |
|------------------------------------------|---|-------------------------|--|
|                                          |   | 1                       |  |
| Student-Newman-Keuls <sup>a</sup> zoeal3 | 3 | 17.333                  |  |
| zoeal8                                   | 3 | 17.367                  |  |
| zoeal7                                   | 3 | 17.533                  |  |
| zoeal10                                  | 3 | 17.600                  |  |
| zoeal9                                   | 3 | 17.733                  |  |
| zoeal2                                   | 3 | 17.800                  |  |
| Eggs                                     | 3 | 17.867                  |  |
| zoeal11                                  | 3 | 18.000                  |  |
| zoeal4                                   | 3 | 18.033                  |  |
| zoeal6                                   | 3 | 18.200                  |  |
| zoeal5                                   | 3 | 18.300                  |  |
| zoeal12                                  | 3 | 18.400                  |  |
| Settle                                   | 3 | 18.867                  |  |
| Juveniles                                | 3 | 19.233                  |  |
| zoeal1                                   | 3 | 19.367                  |  |
| Sig.                                     |   | .665                    |  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 13 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันอิ่มตัวชนิด C20:0 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

| c20:0                                    |   |                         |       |
|------------------------------------------|---|-------------------------|-------|
| Zoeal                                    | N | Subset for alpha = 0.05 |       |
|                                          |   | 1                       | 2     |
| Student-Newman-Keuls <sup>a</sup> zoeal2 | 3 | .000                    |       |
| zoeal4                                   | 3 | .000                    |       |
| zoeal6                                   | 3 | .000                    |       |
| zoeal7                                   | 3 | .000                    |       |
| zoeal8                                   | 3 | 1.167                   |       |
| zoeal3                                   | 3 | 1.233                   |       |
| zoeal5                                   | 3 | 1.400                   |       |
| zoeal1                                   | 3 | 1.500                   |       |
| zoeal9                                   | 3 | 2.933                   | 2.933 |
| zoeal10                                  | 3 | 3.100                   | 3.100 |
| zoeal11                                  | 3 | 3.900                   | 3.900 |
| Settle                                   | 3 | 4.133                   | 4.133 |
| zoeal12                                  | 3 | 4.233                   | 4.233 |
| Juveniles                                | 3 | 5.900                   | 5.900 |
| Eggs                                     | 3 |                         | 8.433 |
| Sig.                                     |   | .217                    | .123  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 14 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมัน  
 อิ่มตัวชนิด C22:0 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการ  
 เพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

| c22:0                                    |   |                         |       |       |
|------------------------------------------|---|-------------------------|-------|-------|
| Zoeal                                    | N | Subset for alpha = 0.05 |       |       |
|                                          |   | 1                       | 2     | 3     |
| Student-Newman-Keuls <sup>a</sup> zoeal2 | 3 | .000                    |       |       |
| zoeal4                                   | 3 | 1.767                   | 1.767 |       |
| zoeal1                                   | 3 | 3.367                   | 3.367 | 3.367 |
| eggs                                     | 3 | 3.667                   | 3.667 | 3.667 |
| zoeal10                                  | 3 | 3.900                   | 3.900 | 3.900 |
| zoeal8                                   | 3 | 4.133                   | 4.133 | 4.133 |
| zoeal5                                   | 3 | 4.400                   | 4.400 | 4.400 |
| zoeal3                                   | 3 | 5.633                   | 5.633 | 5.633 |
| zoeal7                                   | 3 |                         | 6.367 | 6.367 |
| zoeal9                                   | 3 |                         | 6.467 | 6.467 |
| zoeal6                                   | 3 |                         | 6.733 | 6.733 |
| zoeal11                                  | 3 |                         | 7.033 | 7.033 |
| zoeal12                                  | 3 |                         | 7.100 | 7.100 |
| settle                                   | 3 |                         |       | 8.133 |
| juveniles                                | 3 |                         |       | 9.467 |
| Sig.                                     |   | .051                    | .138  | .060  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 15 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด (saturated fatty acid) ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

| SFA                                       |   |                         |        |        |
|-------------------------------------------|---|-------------------------|--------|--------|
| Zoeal                                     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |
|                                           |   | 1                       | 2      | 3      |
| Student-Newman-Keuls <sup>a</sup> zoeal10 | 3 | 29.800                  |        |        |
| zoeal11                                   | 3 | 30.700                  | 30.700 |        |
| zoeal8                                    | 3 | 30.933                  | 30.933 |        |
| zoeal9                                    | 3 | 31.033                  | 31.033 |        |
| zoeal12                                   | 3 | 31.133                  | 31.133 |        |
| zoeal7                                    | 3 | 31.933                  | 31.933 |        |
| zoeal3                                    | 3 | 32.033                  | 32.033 |        |
| zoeal4                                    | 3 | 32.133                  | 32.133 |        |
| zoeal6                                    | 3 | 32.833                  | 32.833 |        |
| zoeal5                                    | 3 | 33.033                  | 33.033 |        |
| zoeal2                                    | 3 | 34.000                  | 34.000 |        |
| settle                                    | 3 | 34.167                  | 34.167 |        |
| juveniles                                 | 3 |                         | 34.800 |        |
| zoeal1                                    | 3 |                         |        | 38.533 |
| eggs                                      | 3 |                         |        | 40.533 |
| Sig.                                      |   | .064                    | .101   | .127   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 16 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิด C16:1 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c16:1

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      |
| Settle    | 3 | 7.133                   |        |        |        |        |
| zoeal12   | 3 | 8.400                   | 8.400  |        |        |        |
| zoeal4    | 3 | 8.533                   | 8.533  |        |        |        |
| zoeal11   | 3 | 8.600                   | 8.600  |        |        |        |
| zoeal5    | 3 | 9.033                   | 9.033  |        |        |        |
| zoeal7    | 3 | 9.267                   | 9.267  | 9.267  |        |        |
| zoeal6    | 3 | 9.367                   | 9.367  | 9.367  |        |        |
| zoeal10   | 3 | 9.433                   | 9.433  | 9.433  |        |        |
| zoeal9    | 3 |                         | 10.000 | 10.000 |        |        |
| Juveniles | 3 |                         | 10.033 | 10.033 |        |        |
| zoeal8    | 3 |                         | 10.267 | 10.267 |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 10.567 | 10.567 |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         |        | 11.467 |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         |        |        | 13.333 |        |
| Eggs      | 3 |                         |        |        |        | 17.100 |
| Sig.      |   | .058                    | .140   | .079   | 1.000  | 1.000  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 17 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิด C18:1 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c18:1

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      |
| Settle    | 3 | 25.867                  |        |        |
| zoeal4    | 3 |                         | 28.667 |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 29.100 | 29.100 |
| zoeal5    | 3 |                         | 29.600 | 29.600 |
| zoeal11   | 3 |                         | 29.667 | 29.667 |
| Juveniles | 3 |                         | 29.733 | 29.733 |
| Eggs      | 3 |                         | 29.967 | 29.967 |
| zoeal12   | 3 |                         | 30.233 | 30.233 |
| zoeal1    | 3 |                         | 30.433 | 30.433 |
| zoeal6    | 3 |                         | 30.667 | 30.667 |
| zoeal7    | 3 |                         | 31.033 | 31.033 |
| zoeal8    | 3 |                         | 31.067 | 31.067 |
| zoeal9    | 3 |                         | 31.267 | 31.267 |
| zoeal10   | 3 |                         | 31.567 | 31.567 |
| zoeal3    | 3 |                         |        | 32.567 |
| Sig.      |   | 1.000                   | .236   | .078   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 18 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิด C20:1 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

**c20:1**

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|-------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2     | 3      | 4      | 5      |
| Eggs      | 3 | 3.633                   |       |        |        |        |
| Juveniles | 3 | 7.567                   | 7.567 |        |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         | 9.667 |        |        |        |
| Settle    | 3 |                         |       | 22.367 |        |        |
| zoeal9    | 3 |                         |       | 22.700 |        |        |
| zoeal12   | 3 |                         |       | 22.800 |        |        |
| zoeal11   | 3 |                         |       | 23.100 | 23.100 |        |
| zoeal6    | 3 |                         |       | 23.200 | 23.200 |        |
| zoeal5    | 3 |                         |       | 23.333 | 23.333 |        |
| zoeal10   | 3 |                         |       | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| zoeal7    | 3 |                         |       | 25.567 | 25.567 | 25.567 |
| zoeal3    | 3 |                         |       | 25.667 | 25.667 | 25.667 |
| zoeal8    | 3 |                         |       | 25.733 | 25.733 | 25.733 |
| zoeal4    | 3 |                         |       |        | 29.700 | 29.700 |
| zoeal2    | 3 |                         |       |        |        | 31.300 |
| Sig.      |   | .064                    | .313  | .816   | .053   | .051   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 19 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด (monounsaturated fatty acid) ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

### MUFA

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| juveniles | 3 | 32.800                  |        |        |        |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         | 35.633 |        |        |        |        |
| eggs      | 3 |                         | 35.667 |        |        |        |        |
| settle    | 3 |                         | 36.333 |        |        |        |        |
| zoeal11   | 3 |                         |        | 40.467 |        |        |        |
| zoeal12   | 3 |                         |        | 40.733 |        |        |        |
| zoeal5    | 3 |                         |        | 40.800 |        |        |        |
| zoeal6    | 3 |                         |        | 41.633 |        |        |        |
| zoeal9    | 3 |                         |        | 42.067 | 42.067 |        |        |
| zoeal7    | 3 |                         |        |        | 43.833 | 43.833 |        |
| zoeal10   | 3 |                         |        |        | 43.967 | 43.967 |        |
| zoeal8    | 3 |                         |        |        |        | 44.367 |        |
| zoeal4    | 3 |                         |        |        |        | 44.967 |        |
| zoeal3    | 3 |                         |        |        |        | 46.033 | 46.033 |
| zoeal2    | 3 |                         |        |        |        |        | 47.567 |
| Sig.      |   | 1.000                   | .688   | .341   | .079   | .094   | .079   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 20 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 ชนิด C18:2n-6 ของกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c18:2n6

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |        |
|-----------|---|-------------------------|-------|--------|
|           |   | 1                       | 2     | 3      |
| Eggs      | 3 | 3.000                   |       |        |
| Juveniles | 3 | 4.467                   | 4.467 |        |
| zoeal1    | 3 | 5.533                   | 5.533 |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 6.700 |        |
| Settle    | 3 |                         |       | 10.500 |
| zoeal4    | 3 |                         |       | 10.833 |
| zoeal3    | 3 |                         |       | 11.200 |
| zoeal5    | 3 |                         |       | 11.433 |
| zoeal6    | 3 |                         |       | 11.533 |
| zoeal11   | 3 |                         |       | 11.533 |
| zoeal12   | 3 |                         |       | 11.733 |
| zoeal7    | 3 |                         |       | 12.133 |
| zoeal10   | 3 |                         |       | 12.300 |
| zoeal9    | 3 |                         |       | 12.367 |
| zoeal8    | 3 |                         |       | 12.467 |
| Sig.      |   | .148                    | .222  | .910   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 21 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 ชนิด C20:4n6 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c2046

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |       |       |
|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|
|           |   | 1                       | 2     | 3     | 4     |
| zoeal1    | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal2    | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal4    | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal5    | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal6    | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal7    | 3 | .000                    |       |       |       |
| settle    | 3 | .000                    |       |       |       |
| eggs      | 3 | .000                    |       |       |       |
| juveniles | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal8    | 3 | 1.467                   | 1.467 |       |       |
| zoeal9    | 3 |                         | 2.733 | 2.733 |       |
| zoeal12   | 3 |                         |       | 3.600 |       |
| zoeal11   | 3 |                         |       | 3.867 |       |
| zoeal10   | 3 |                         |       | 4.367 | 4.367 |
| zoeal3    | 3 |                         |       |       | 5.833 |
| Sig.      |   | .626                    | .100  | .149  | .058  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 22 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 6 ทั้งหมด (n-6 PUFA) ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

n6-PUFA

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |        |
|-----------|---|-------------------------|-------|--------|
|           |   | 1                       | 2     | 3      |
| Eggs      | 3 | 3.000                   |       |        |
| Juveniles | 3 | 4.467                   | 4.467 |        |
| zoeal1    | 3 | 5.533                   | 5.533 |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 6.700 |        |
| Settle    | 3 |                         |       | 10.500 |
| zoeal4    | 3 |                         |       | 10.833 |
| zoeal5    | 3 |                         |       | 11.433 |
| zoeal6    | 3 |                         |       | 11.533 |
| zoeal7    | 3 |                         |       | 12.133 |
| zoeal11   | 3 |                         |       | 12.200 |
| zoeal12   | 3 |                         |       | 12.300 |
| zoeal3    | 3 |                         |       | 12.667 |
| zoeal8    | 3 |                         |       | 12.733 |
| zoeal9    | 3 |                         |       | 12.800 |
| zoeal10   | 3 |                         |       | 13.067 |
| Sig.      |   | .151                    | .225  | .687   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 23 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 ชนิด C18:3n-3 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c18:3n3

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |
|-----------|---|-------------------------|-------|
|           |   | 1                       | 2     |
| zoeal2    | 3 | .000                    |       |
| zoeal3    | 3 | .000                    |       |
| zoeal4    | 3 | .000                    |       |
| zoeal5    | 3 | .000                    |       |
| zoeal6    | 3 | .000                    |       |
| zoeal7    | 3 | .000                    |       |
| zoeal8    | 3 | .000                    |       |
| zoeal11   | 3 | .000                    |       |
| zoeal12   | 3 | .000                    |       |
| Settle    | 3 | .000                    |       |
| zoeal10   | 3 | .933                    |       |
| zoeal9    | 3 | 1.367                   |       |
| zoeal1    | 3 | 1.533                   |       |
| Juveniles | 3 |                         | 4.533 |
| Eggs      | 3 |                         | 4.767 |
| Sig.      |   | .815                    | .781  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 24 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 ชนิด C18:4n-3 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและถูกกักการังจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c18:4n3

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |
|-----------|---|-------------------------|
|           |   | 1                       |
| zoeal1    | 3 | .000                    |
| zoeal2    | 3 | .000                    |
| zoeal3    | 3 | .000                    |
| zoeal4    | 3 | .000                    |
| zoeal5    | 3 | .000                    |
| zoeal6    | 3 | .000                    |
| zoeal7    | 3 | .000                    |
| zoeal11   | 3 | .000                    |
| zoeal12   | 3 | .000                    |
| zoeal8    | 3 | 1.133                   |
| zoeal10   | 3 | 1.133                   |
| zoeal9    | 3 | 2.500                   |
| Juveniles | 3 | 3.567                   |
| Settle    | 3 | 4.367                   |
| Eggs      | 3 | 5.833                   |
| Sig.      |   | .215                    |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 25 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 ชนิด C20:3n-3 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c2033

Student-Newman-Keuls <sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |       |       |
|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|
|           |   | 1                       | 2     | 3     | 4     |
| zoeal1    | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal2    | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal5    | 3 | .000                    |       |       |       |
| Eggs      | 3 | .000                    |       |       |       |
| Juveniles | 3 | .000                    |       |       |       |
| zoeal3    | 3 | 1.133                   | 1.133 |       |       |
| zoeal4    | 3 | 1.900                   | 1.900 | 1.900 |       |
| zoeal7    | 3 | 1.933                   | 1.933 | 1.933 |       |
| Settle    | 3 | 3.933                   | 3.933 | 3.933 | 3.933 |
| zoeal6    | 3 | 4.300                   | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| zoeal8    | 3 | 4.667                   | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| zoeal9    | 3 |                         | 6.767 | 6.767 | 6.767 |
| zoeal11   | 3 |                         | 6.767 | 6.767 | 6.767 |
| zoeal12   | 3 |                         |       | 7.400 | 7.400 |
| zoeal10   | 3 |                         |       |       | 8.033 |
| Sig.      |   | .274                    | .058  | .069  | .269  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 26 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 ชนิด C20:4n-3 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติ และลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c2043

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |
|-----------|---|-------------------------|
|           |   | 1                       |
| zoeal2    | 3 | .000                    |
| zoeal5    | 3 | .000                    |
| zoeal6    | 3 | .000                    |
| zoeal7    | 3 | .000                    |
| Settle    | 3 | .000                    |
| zoeal3    | 3 | 1.367                   |
| zoeal8    | 3 | 1.600                   |
| zoeal1    | 3 | 1.733                   |
| zoeal9    | 3 | 3.100                   |
| Juveniles | 3 | 4.033                   |
| zoeal11   | 3 | 4.333                   |
| Eggs      | 3 | 4.400                   |
| zoeal12   | 3 | 4.500                   |
| zoeal4    | 3 | 4.733                   |
| zoeal10   | 3 | 5.133                   |
| Sig.      |   | .488                    |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 27 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 ชนิด C20:5n-3 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติ และลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c2053

Student-Newman-Keuls <sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      |
| zoeal10   | 3 | 8.233                   |        |        |        |        |
| Eggs      | 3 | 9.267                   | 9.267  |        |        |        |
| zoeal12   | 3 | 9.333                   | 9.333  |        |        |        |
| zoeal11   | 3 | 9.500                   | 9.500  |        |        |        |
| zoeal9    | 3 | 9.633                   | 9.633  |        |        |        |
| zoeal8    | 3 | 9.833                   | 9.833  |        |        |        |
| zoeal6    | 3 | 10.433                  | 10.433 |        |        |        |
| zoeal7    | 3 |                         | 10.867 |        |        |        |
| Settle    | 3 |                         | 11.133 |        |        |        |
| zoeal5    | 3 |                         | 11.300 |        |        |        |
| zoeal4    | 3 |                         | 11.733 |        |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         |        | 13.467 |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         |        | 14.167 |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         |        |        | 16.367 |        |
| Juveniles | 3 |                         |        |        |        | 25.433 |
| Sig.      |   | .105                    | .088   | .377   | 1.000  | 1.000  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 28 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 ชนิด C22:6n-3 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติ และลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

c2263

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      |
| Eggs      | 3 | 6.333                   |        |        |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 13.833 |        |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         | 14.000 |        |        |        |
| Juveniles | 3 |                         | 14.367 |        |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         | 14.800 |        |        |        |
| zoeal4    | 3 |                         |        | 17.100 |        |        |
| zoeal10   | 3 |                         |        | 17.933 | 17.933 |        |
| zoeal5    | 3 |                         |        | 17.967 | 17.967 |        |
| zoeal9    | 3 |                         |        | 18.000 | 18.000 |        |
| zoeal8    | 3 |                         |        | 18.100 | 18.100 |        |
| zoeal6    | 3 |                         |        | 18.733 | 18.733 |        |
| zoeal7    | 3 |                         |        | 18.933 | 18.933 |        |
| zoeal12   | 3 |                         |        |        | 20.900 |        |
| zoeal11   | 3 |                         |        |        | 21.000 |        |
| Settle    | 3 |                         |        |        |        | 24.600 |
| Sig.      |   | 1.000                   | .742   | .479   | .054   | 1.000  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 29 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมกา 3 ทั้งหมด (n-3PUFA) ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

n3PUFA

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      |
| Eggs      | 3 | 14.433                  |        |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 20.033 |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         | 20.567 |        |        |
| zoeal5    | 3 |                         | 21.467 | 21.467 |        |
| zoeal8    | 3 |                         | 21.867 | 21.867 |        |
| zoeal6    | 3 |                         | 22.300 | 22.300 |        |
| zoeal7    | 3 |                         | 22.333 | 22.333 |        |
| zoeal1    | 3 |                         | 22.367 | 22.367 |        |
| zoeal10   | 3 |                         | 22.433 | 22.433 |        |
| zoeal4    | 3 |                         | 22.833 | 22.833 |        |
| zoeal9    | 3 |                         | 22.833 | 22.833 |        |
| zoeal11   | 3 |                         |        | 24.767 |        |
| zoeal12   | 3 |                         |        | 24.867 |        |
| Settle    | 3 |                         |        |        | 28.967 |
| Juveniles | 3 |                         |        |        | 30.767 |
| Sig.      |   | 1.000                   | .365   | .148   | .134   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 30 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งหมด (กลุ่มโอเมกา 3 และ 6) ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติ และลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

PUFA

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      |
| Eggs      | 3 | 14.733                  |        |        |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 21.733 |        |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         | 23.133 | 23.133 |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         | 24.433 | 24.433 | 24.433 |        |
| zoeal5    | 3 |                         | 24.600 | 24.600 | 24.600 |        |
| zoeal6    | 3 |                         | 25.433 | 25.433 | 25.433 |        |
| zoeal4    | 3 |                         | 25.567 | 25.567 | 25.567 |        |
| zoeal8    | 3 |                         | 25.667 | 25.667 | 25.667 |        |
| zoeal7    | 3 |                         | 25.767 | 25.767 | 25.767 |        |
| zoeal10   | 3 |                         |        | 26.300 | 26.300 |        |
| zoeal9    | 3 |                         |        | 26.600 | 26.600 |        |
| zoeal11   | 3 |                         |        |        | 28.000 | 28.000 |
| zoeal12   | 3 |                         |        |        | 28.133 | 28.133 |
| Settle    | 3 |                         |        |        |        | 31.133 |
| Juveniles | 3 |                         |        |        |        | 31.133 |
| Sig.      |   | 1.000                   | .055   | .169   | .136   | .081   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 31 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันไม่อิ่มตัวโซ่ยาวเชิงซ้อนทั้งหมดกลุ่มโอเมกา 3 และ 6 (Highly unsaturated fatty acid) ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

HUFA

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| Zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      |
| Eggs      | 3 | 12.133                  |        |        |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 20.033 |        |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         | 21.433 | 21.433 |        |        |
| zoeal5    | 3 |                         | 21.467 | 21.467 |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         | 22.200 | 22.200 |        |        |
| zoeal6    | 3 |                         | 22.300 | 22.300 |        |        |
| zoeal7    | 3 |                         | 22.333 | 22.333 |        |        |
| zoeal9    | 3 |                         | 22.567 | 22.567 |        |        |
| zoeal10   | 3 |                         | 22.700 | 22.700 |        |        |
| zoeal4    | 3 |                         | 22.833 | 22.833 |        |        |
| zoeal8    | 3 |                         |        | 24.400 |        |        |
| zoeal12   | 3 |                         |        | 25.133 |        |        |
| zoeal11   | 3 |                         |        | 25.133 |        |        |
| Settle    | 3 |                         |        |        | 27.833 |        |
| Juveniles | 3 |                         |        |        |        | 30.067 |
| Sig.      |   | 1.000                   | .218   | .051   | 1.000  | 1.000  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 32 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3/โอเมกา 6 ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติและลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

n3n6

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      |
| zoeal2    | 3 | 7.800                   |        |        |        |        |
| zoeal3    | 3 | 9.233                   |        |        |        |        |
| zoeal8    | 3 | 9.733                   | 9.733  |        |        |        |
| zoeal10   | 3 | 9.733                   | 9.733  |        |        |        |
| zoeal9    | 3 | 10.133                  | 10.133 |        |        |        |
| zoeal7    | 3 | 10.467                  | 10.467 |        |        |        |
| zoeal5    | 3 | 10.600                  | 10.600 |        |        |        |
| zoeal6    | 3 | 11.033                  | 11.033 |        |        |        |
| zoeal12   | 3 | 11.367                  | 11.367 |        |        |        |
| zoeal11   | 3 | 11.433                  | 11.433 |        |        |        |
| zoeal4    | 3 | 11.900                  | 11.900 |        |        |        |
| settle    | 3 |                         | 15.500 |        |        |        |
| zoeal1    | 3 |                         |        | 23.200 |        |        |
| eggs      | 3 |                         |        |        | 28.733 |        |
| juveniles | 3 |                         |        |        |        | 41.300 |
| Sig.      |   | .428                    | .063   | 1.000  | 1.000  | 1.000  |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

ตารางภาคผนวกที่ 33 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอ (C22:6n-3) /อีพีเอ (C20:5n-3) ของกุ้งก้ามกราม (*H. picta*) จากธรรมชาติ และลูกกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Student-Newman-Keuls

# DHA/EPA

Student-Newman-Keuls<sup>a</sup>

| zoeal     | N | Subset for alpha = 0.05 |       |       |        |        |        |        |
|-----------|---|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 1                       | 2     | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      |
| juveniles | 3 | 3.333                   |       |       |        |        |        |        |
| eggs      | 3 | 3.900                   | 3.900 |       |        |        |        |        |
| zoeal1    | 3 | 4.967                   | 4.967 | 4.967 |        |        |        |        |
| zoeal2    | 3 |                         | 5.600 | 5.600 |        |        |        |        |
| zoeal3    | 3 |                         |       | 6.367 |        |        |        |        |
| zoeal4    | 3 |                         |       |       | 8.400  |        |        |        |
| zoeal5    | 3 |                         |       |       | 9.067  | 9.067  |        |        |
| zoeal7    | 3 |                         |       |       | 9.900  | 9.900  |        |        |
| zoeal6    | 3 |                         |       |       | 10.233 | 10.233 |        |        |
| zoeal8    | 3 |                         |       |       | 10.467 | 10.467 | 10.467 |        |
| zoeal9    | 3 |                         |       |       |        | 10.667 | 10.667 |        |
| zoeal10   | 3 |                         |       |       |        |        | 12.533 | 12.533 |
| zoeal11   | 3 |                         |       |       |        |        | 12.533 | 12.533 |
| settle    | 3 |                         |       |       |        |        | 12.533 | 12.533 |
| zoeal12   | 3 |                         |       |       |        |        |        | 12.767 |
| Sig.      |   | .073                    | .060  | .139  | .051   | .193   | .051   | .988   |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



ตารางภาคผนวกที่ 34 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) ระยะชูเอี้ยงะ 3 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower Upper                               |
| Asine transformation     | Equal variances assumed     | .684                                    | .455 | 3.284                        | 4     | .030            | 2.7124331       | .8259440              | .4192450 5.0056213                        |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.284                        | 3.517 | .037            | 2.7124331       | .8259440              | .2896267 5.1352396                        |

ตารางภาคผนวกที่ 35 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) ระยะชูเอี้ยงะ 4 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower Upper                               |
| Asine transformation     | Equal variances assumed     | 9.491                                   | .037 | 7.286                        | 4     | .002            | 4.8817805       | .6700663              | 3.0213781 6.7421829                       |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 7.286                        | 2.178 | .014            | 4.8817805       | .6700663              | 2.2135760 7.5499851                       |

ตารางภาคผนวกที่ 36 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p<0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) ระยะชูเอี้ยงะ 5 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยง ด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower Upper                               |
| Asine transformation     | Equal variances assumed     | .399                                    | .562 | -.313                        | 4     | .770            | -.2971723       | .9499869              | -2.9347587 2.3404141                      |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.313                        | 3.836 | .771            | -.2971723       | .9499869              | -2.9798517 2.3855070                      |

ตารางภาคผนวกที่ 37 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกึ่งการดูด (H. picta) ระยะชูเอี้ยะ 7 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

Independent Samples Test

|                      |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |           |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                      |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |           |
|                      |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper     |
| Asine transformation | Equal variances assumed     | 2.305                                   | .226 | 3.427                        | 3     | .042            | 3.6788719       | 1.0734347             | .2627237                                  | 7.0950201 |
|                      | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.991                        | 2.961 | .029            | 3.6788719       | .9216964              | .7236794                                  | 6.6340644 |

ตารางภาคผนวกที่ 38 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกึ่งการดูด (H. picta) ระยะชูเอี้ยะ 8 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

Independent Samples Test

|                      |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |            |                                           |  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|--|
|                      |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |            | 95% Confidence Interval of the Difference |  |
|                      |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower      | Upper                                     |  |
| Asine transformation | Equal variances assumed     | 1.773                                   | .254 | -5.242                       | 4     | .006            | -3.4792587      | .6637472              | -5.3221164 | -1.6364010                                |  |
|                      | Equal variances not assumed |                                         |      | -5.242                       | 2.701 | .017            | -3.4792587      | .6637472              | -5.7300419 | -1.2284756                                |  |

ตารางภาคผนวกที่ 39 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกึ่งการดูด (H. picta) ระยะชูเอี้ยะ 9 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

Independent Samples Test

|                      |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |           |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                      |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |           |
|                      |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper     |
| Asine transformation | Equal variances assumed     | .306                                    | .610 | 2.421                        | 4     | .073            | 2.1238018       | .8773293              | -.3120549                                 | 4.5596585 |
|                      | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.421                        | 3.736 | .077            | 2.1238018       | .8773293              | -.3814320                                 | 4.6290356 |

ตารางภาคผนวกที่ 40 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ระยะชูเอี้ยงะ 10 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

Independent Samples Test

|                      |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |           |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                      |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |           |
|                      |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper     |
| Asine transformation | Equal variances assumed     | .805                                    | .436 | -4.263                       | 3     | .024            | -1.6226713      | .3806817              | -2.8341705                                | -.4111721 |
|                      | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.578                       | 2.792 | .023            | -1.6226713      | .3544623              | -2.7997385                                | -.4456041 |

ตารางภาคผนวกที่ 41 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ระยะชูเอี้ยงะ 11 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

Independent Samples Test

|                      |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |            | 95% Confidence Interval of the Difference |  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|--|
|                      |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |            |                                           |  |
|                      |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower      | Upper                                     |  |
| Asine transformation | Equal variances assumed     | 1.819                                   | .249 | -.507                        | 4     | .639            | -.3971202       | .7836102              | -2.5727710 | 1.7785306                                 |  |
|                      | Equal variances not assumed |                                         |      | -.507                        | 2.397 | .655            | -.3971202       | .7836102              | -3.2862646 | 2.4920241                                 |  |

ตารางภาคผนวกที่ 42 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ระยะชูเอี้ยงะ 12 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

Independent Samples Test

|                      |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |           |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                      |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |           |
|                      |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper     |
| Asine transformation | Equal variances assumed     | .046                                    | .840 | 1.787                        | 4     | .148            | 1.4348095       | .8028354              | -.7942190                                 | 3.6638379 |
|                      | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.787                        | 4.000 | .148            | 1.4348095       | .8028354              | -.7942198                                 | 3.6638387 |



ตารางภาคผนวกที่ 43 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของไขมันระหว่างกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) ระยะลงเกาะที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |           |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |           |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper     |
| Asine transformation     | Equal variances assumed     | .879                                    | .402 | 3.570                        | 4     | .023            | 1.8373899       | .5146719              | .4084317                                  | 3.2663482 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.570                        | 3.606 | .028            | 1.8373899       | .5146719              | .3447067                                  | 3.3300732 |

ตารางภาคผนวกที่ 44 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) ระยะชูเอี้ยงะ1 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |          |                                           |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|--|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |          |                                           |  |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |          | 95% Confidence Interval of the Difference |  |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower    | Upper                                     |  |
| c14                      | Equal variances assumed     | 2.049                                   | .226 | 2.071                        | 4     | .107            | 2.20000         | 1.06249               | -.74995  | 5.14995                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.071                        | 2.589 | .144            | 2.20000         | 1.06249               | -1.50612 | 5.90612                                   |  |

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |         |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |         |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |         |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper   |
| c16                      | Equal variances assumed     | 2.834                                   | .168 | 1.890                        | 4     | .132            | 2.73333         | 1.44607               | -1.28159                                  | 6.74826 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.890                        | 3.004 | .155            | 2.73333         | 1.44607               | -1.86562                                  | 7.33229 |
| c18                      | Equal variances assumed     | .606                                    | .480 | .648                         | 4     | .552            | 1.40000         | 2.16076               | -4.59923                                  | 7.39923 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .648                         | 3.623 | .556            | 1.40000         | 2.16076               | -4.85384                                  | 7.65384 |
| c20                      | Equal variances assumed     | .048                                    | .838 | -.781                        | 4     | .478            | -1.83333        | 2.34687               | -8.34928                                  | 4.68261 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.781                        | 3.870 | .480            | -1.83333        | 2.34687               | -8.43622                                  | 4.76955 |
| c22                      | Equal variances assumed     | .190                                    | .686 | .541                         | 4     | .618            | 1.40000         | 2.59015               | -5.79142                                  | 8.59142 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .541                         | 3.908 | .618            | 1.40000         | 2.59015               | -5.85832                                  | 8.65832 |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | .046                                    | .840 | 1.477                        | 4     | .214            | 2.56667         | 1.73750               | -2.25739                                  | 7.39073 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.477                        | 3.962 | .214            | 2.56667         | 1.73750               | -2.27582                                  | 7.40915 |

ตารางภาคผนวกที่ 44 (ต่อ)

Independent Samples Test

|         |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|         |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|         |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| C161    | Equal variances assumed     | 4.831                                   | .093 | 1.682                        | 4     | .168            | 1.90000         | 1.12940               | -1.23573                                  | 5.03573  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.682                        | 2.003 | .234            | 1.90000         | 1.12940               | -2.95134                                  | 6.75134  |
| C181    | Equal variances assumed     | .434                                    | .546 | -1.414                       | 4     | .230            | -.53333         | .37712                | -1.58040                                  | .51373   |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.414                       | 3.396 | .242            | -.53333         | .37712                | -1.65815                                  | .59148   |
| C201    | Equal variances assumed     | 5.435                                   | .080 | -1.821                       | 4     | .143            | -8.36667        | 4.59444               | -21.12288                                 | 4.38955  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.821                       | 2.438 | .187            | -8.36667        | 4.59444               | -25.09128                                 | 8.35795  |
| TMJFA   | Equal variances assumed     | 7.023                                   | .057 | -2.047                       | 4     | .110            | -4.16667        | 2.03579               | -9.81893                                  | 1.48559  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.047                       | 2.100 | .171            | -4.16667        | 2.03579               | -12.53828                                 | 4.20494  |
| C182n6  | Equal variances assumed     | 14.706                                  | .019 | -.380                        | 4     | .723            | -1.30000        | 3.41988               | -10.79510                                 | 8.19510  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -.380                        | 2.007 | .740            | -1.30000        | 3.41988               | -15.96384                                 | 13.36384 |
| C204n6  | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -2.66667        | 2.66667               | -10.07052                                 | 4.73719  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -2.66667        | 2.66667               | -14.14041                                 | 8.80707  |
| Tn6PUFA | Equal variances assumed     | 10.925                                  | .030 | -.563                        | 4     | .603            | -2.23333        | 3.96344               | -13.23762                                 | 8.77095  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -.563                        | 2.005 | .630            | -2.23333        | 3.96344               | -19.24287                                 | 14.77620 |
| SUMn4   | Equal variances assumed     | 12.124                                  | .025 | .924                         | 4     | .408            | 3.50000         | 3.78799               | -7.01715                                  | 14.01715 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | .924                         | 2.002 | .453            | 3.50000         | 3.78799               | -12.78151                                 | 19.78151 |

Independent Samples Test

|        |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|        |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|        |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| C183n3 | Equal variances assumed     | 1.170                                   | .340 | .270                         | 4     | .800            | .50000          | 1.84902               | -4.63371                                  | 5.63371  |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | .270                         | 3.506 | .802            | .50000          | 1.84902               | -4.93196                                  | 5.93196  |
| C184n3 | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -.76667         | .76667                | -2.89527                                  | 1.36194  |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -.76667         | .76667                | -4.06537                                  | 2.53203  |
| C203n3 | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -1.86667        | 1.86667               | -7.04936                                  | 3.31603  |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -1.86667        | 1.86667               | -9.89829                                  | 6.16495  |
| C204n3 | Equal variances assumed     | .081                                    | .790 | .071                         | 4     | .947            | .16667          | 2.33643               | -6.32029                                  | 6.65363  |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | .071                         | 3.960 | .947            | .16667          | 2.33643               | -6.34635                                  | 6.67968  |
| C205n3 | Equal variances assumed     | 4.355                                   | .105 | -.157                        | 4     | .883            | -.60000         | 3.81037               | -11.17927                                 | 9.97927  |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | -.157                        | 2.661 | .886            | -.60000         | 3.81037               | -13.64747                                 | 12.44747 |
| C226n3 | Equal variances assumed     | 1.225                                   | .330 | -.849                        | 4     | .444            | -1.73333        | 2.04233               | -7.40375                                  | 3.93708  |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | -.849                        | 3.467 | .451            | -1.73333        | 2.04233               | -7.76471                                  | 4.29804  |



ตารางภาคผนวกที่ 44 (ต่อ)

Independent Samples Test

|         |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|         |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|         |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| Tn3PUFA | Equal variances assumed     | .637                                    | .469 | -.947                        | 4     | .397            | -2.06667        | 2.18149               | -8.12345                                  | 3.99011  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -.947                        | 3.699 | .401            | -2.06667        | 2.18149               | -8.32261                                  | 4.18927  |
| TPUFA   | Equal variances assumed     | .272                                    | .629 | -2.165                       | 4     | .096            | -3.40000        | 1.57021               | -7.75960                                  | .95960   |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.165                       | 3.622 | .103            | -3.40000        | 1.57021               | -7.94511                                  | 1.14511  |
| THUFA   | Equal variances assumed     | .054                                    | .827 | -1.201                       | 4     | .296            | -2.63333        | 2.19266               | -8.72115                                  | 3.45448  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.201                       | 3.946 | .297            | -2.63333        | 2.19266               | -8.75399                                  | 3.48732  |
| n3n6    | Equal variances assumed     | .865                                    | .421 | 6.822                        | 3     | .006            | 12.00000        | 1.75910               | 6.40175                                   | 17.59825 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | 7.353                        | 2.815 | .006            | 12.00000        | 1.63197               | 6.60734                                   | 17.39266 |
| DHA-EPA | Equal variances assumed     | 2.734                                   | .174 | -.637                        | 4     | .559            | -.93333         | 1.46553               | -5.00230                                  | 3.13563  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -.637                        | 3.001 | .569            | -.93333         | 1.46553               | -5.59610                                  | 3.72943  |

ตารางภาคผนวกที่ 45 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการคืน (*H. picta*) ระยะชู่เอื้อยะ 2 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

Independent Samples Test

|      |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|      |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|      |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| c14  | Equal variances assumed     | 9.715                                   | .036 | 1.225                        | 4     | .288            | 3.56667         | 2.91166               | -4.51740                                  | 11.65074 |
|      | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.225                        | 2.055 | .342            | 3.56667         | 2.91166               | -8.64682                                  | 15.78016 |
| c16  | Equal variances assumed     | 3.169                                   | .150 | -.615                        | 4     | .572            | -.73333         | 1.19210               | -4.04314                                  | 2.57648  |
|      | Equal variances not assumed |                                         |      | -.615                        | 2.366 | .592            | -.73333         | 1.19210               | -5.17271                                  | 3.70604  |
| c18  | Equal variances assumed     | 9.197                                   | .039 | -6.300                       | 4     | .003            | -2.36667        | .37565                | -3.40963                                  | -1.32370 |
|      | Equal variances not assumed |                                         |      | -6.300                       | 2.097 | .022            | -2.36667        | .37565                | -3.91356                                  | -.81977  |
| c22  | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -2.63333        | 2.63333               | -9.94464                                  | 4.67797  |
|      | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -2.63333        | 2.63333               | -13.96365                                 | 8.69699  |
| TSFA | Equal variances assumed     | 6.880                                   | .059 | -1.611                       | 4     | .183            | -1.96667        | 1.22111               | -5.35701                                  | 1.42368  |
|      | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.611                       | 2.379 | .229            | -1.96667        | 1.22111               | -6.49533                                  | 2.56200  |



ตารางภาคผนวกที่ 45 (ต่อ)

Independent Samples Test

|         |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|         |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|         |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| C161    | Equal variances assumed     | 6.283                                   | .066 | 1.640                        | 4     | .176            | 4.90000         | 2.98701               | -3.39327                                  | 13.19327 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.640                        | 2.412 | .221            | 4.90000         | 2.98701               | -6.06190                                  | 15.86190 |
| C181    | Equal variances assumed     | 4.902                                   | .091 | -.601                        | 4     | .580            | -1.00000        | 1.66333               | -5.61814                                  | 3.61814  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -.601                        | 2.186 | .604            | -1.00000        | 1.66333               | -7.60313                                  | 5.60313  |
| C201    | Equal variances assumed     | 4.310                                   | .106 | 2.240                        | 4     | .089            | 7.20000         | 3.21455               | -1.72502                                  | 16.12502 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.240                        | 2.146 | .146            | 7.20000         | 3.21455               | -5.76960                                  | 20.16960 |
| TMUFA   | Equal variances assumed     | .092                                    | .777 | 4.806                        | 4     | .009            | 6.43333         | 1.33874               | 2.71640                                   | 10.15027 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | 4.806                        | 3.807 | .010            | 6.43333         | 1.33874               | 2.64097                                   | 10.22570 |
| C182n6  | Equal variances assumed     | 10.936                                  | .030 | -1.175                       | 4     | .305            | -4.00000        | 3.40490               | -13.45351                                 | 5.45351  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.175                       | 2.024 | .360            | -4.00000        | 3.40490               | -18.48287                                 | 10.48287 |
| Tn6PUFA | Equal variances assumed     | 10.936                                  | .030 | -1.175                       | 4     | .305            | -4.00000        | 3.40490               | -13.45351                                 | 5.45351  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.175                       | 2.024 | .360            | -4.00000        | 3.40490               | -18.48287                                 | 10.48287 |
| SUMn4   | Equal variances assumed     | 1.985                                   | .232 | -.352                        | 4     | .742            | -1.50000        | 4.25898               | -13.32482                                 | 10.32482 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -.352                        | 3.245 | .746            | -1.50000        | 4.25898               | -14.49322                                 | 11.49322 |

ตารางภาคผนวกที่ 45 (ต่อ)

Independent Samples Test

|        |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|        |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|        |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| C205n3 | Equal variances assumed     | .165                                    | .705 | -2.679                       | 4     | .055            | -1.30000        | .48534                | -2.64752                                  | .04752   |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.679                       | 3.921 | .056            | -1.30000        | .48534                | -2.65823                                  | .05823   |
| C226n3 | Equal variances assumed     | 2.684                                   | .177 | -7.136                       | 4     | .002            | -4.96667        | .69602                | -6.89913                                  | -3.03420 |
|        | Equal variances not assumed |                                         |      | -7.136                       | 3.010 | .006            | -4.96667        | .69602                | -7.17744                                  | -2.75589 |

ตารางภาคผนวกที่ 45 (ต่อ)

Independent Samples Test

|         |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|         |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|         |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| Tn3PUFA | Equal variances assumed     | .757                                    | .433 | -6.654                       | 4     | .003            | -4.70000        | .70632                | -6.66106                                  | -2.73894 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -6.654                       | 3.430 | .004            | -4.70000        | .70632                | -6.79646                                  | -2.60354 |
| TPUFA   | Equal variances assumed     | 3.453                                   | .137 | -3.519                       | 4     | .024            | -5.50000        | 1.56276               | -9.83892                                  | -1.16108 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.519                       | 2.446 | .053            | -5.50000        | 1.56276               | -11.17563                                 | .17563   |
| THUFA   | Equal variances assumed     | .757                                    | .433 | -6.654                       | 4     | .003            | -4.70000        | .70632                | -6.66106                                  | -2.73894 |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -6.654                       | 3.430 | .004            | -4.70000        | .70632                | -6.79646                                  | -2.60354 |
| n3n6    | Equal variances assumed     | 76.409                                  | .003 | -1.735                       | 3     | .181            | -1.33333        | .76860                | -3.77935                                  | 1.11268  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.319                       | 1.042 | .406            | -1.33333        | 1.01050               | -13.00135                                 | 10.33469 |
| DHAEPa  | Equal variances assumed     | .082                                    | .789 | -4.703                       | 4     | .009            | -1.36667        | .29059                | -2.17348                                  | -.55985  |
|         | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.703                       | 3.741 | .011            | -1.36667        | .29059                | -2.19600                                  | -.53733  |



ตารางภาคผนวกที่ 46 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการคืน (*H. picta*) ระยะชู่เอี้ยะ 3 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|                          |                             | F                                       | Sig. |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|                          |                             |                                         |      | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| c14                      | Equal variances assumed     | 6.676                                   | .061 | 1.055                        | 4     | .351            | .53333          | .50553                | -.87023                                   | 1.93690  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.055                        | 2.239 | .392            | .53333          | .50553                | -1.43391                                  | 2.50057  |
| c16                      | Equal variances assumed     | 9.338                                   | .038 | -.413                        | 4     | .701            | -.86667         | 2.09709               | -6.68912                                  | 4.95578  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.413                        | 2.185 | .716            | -.86667         | 2.09709               | -9.19689                                  | 7.46356  |
| c18                      | Equal variances assumed     | .375                                    | .573 | -2.220                       | 4     | .091            | -3.60000        | 1.62138               | -8.10169                                  | .90169   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.220                       | 3.298 | .105            | -3.60000        | 1.62138               | -8.50630                                  | 1.30630  |
| c20                      | Equal variances assumed     | .049                                    | .836 | -.055                        | 4     | .959            | -.10000         | 1.81628               | -5.14281                                  | 4.94281  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.055                        | 3.976 | .959            | -.10000         | 1.81628               | -5.15488                                  | 4.95488  |
| c22                      | Equal variances assumed     | 8.116                                   | .046 | -2.806                       | 4     | .049            | -2.80000        | .99778                | -5.57027                                  | -.02973  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.806                       | 2.201 | .096            | -2.80000        | .99778                | -6.73823                                  | 1.13823  |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 7.672                                   | .050 | -1.365                       | 4     | .244            | -4.83333        | 3.53962               | -14.66089                                 | 4.99422  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.365                       | 2.241 | .293            | -4.83333        | 3.53962               | -18.59634                                 | 8.92967  |
| C161                     | Equal variances assumed     | 5.382                                   | .081 | 1.902                        | 4     | .130            | 5.76667         | 3.03168               | -2.65064                                  | 14.18397 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.902                        | 2.464 | .173            | 5.76667         | 3.03168               | -5.18366                                  | 16.71700 |
| C181                     | Equal variances assumed     | 12.667                                  | .024 | 1.302                        | 4     | .263            | 12.90000        | 9.90533               | -14.60160                                 | 40.40160 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.302                        | 2.023 | .321            | 12.90000        | 9.90533               | -29.25267                                 | 55.05267 |
| C201                     | Equal variances assumed     | 8.623                                   | .043 | 2.125                        | 4     | .101            | 13.40000        | 6.30599               | -4.10825                                  | 30.90825 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.125                        | 2.110 | .161            | 13.40000        | 6.30599               | -12.41794                                 | 39.21794 |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | .356                                    | .583 | 18.459                       | 4     | .000            | 8.76667         | .47493                | 7.44806                                   | 10.08528 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 18.459                       | 3.813 | .000            | 8.76667         | .47493                | 7.42211                                   | 10.11123 |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | 7.921                                   | .048 | 1.427                        | 4     | .227            | .56667          | .39721                | -.53617                                   | 1.66951  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.427                        | 2.086 | .285            | .56667          | .39721                | -1.07642                                  | 2.20975  |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 8.793                                   | .041 | 3.183                        | 4     | .033            | 4.46667         | 1.40317               | .57084                                    | 8.36249  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.183                        | 2.216 | .075            | 4.46667         | 1.40317               | -1.04058                                  | 9.97391  |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | 6.145                                   | .068 | 2.770                        | 4     | .050            | 1.80000         | .64979                | -.00410                                   | 3.60410  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.770                        | 2.353 | .091            | 1.80000         | .64979                | -.63033                                   | 4.23033  |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | 5.703                                   | .075 | -1.348                       | 4     | .249            | -.83333         | .61824                | -2.54985                                  | .88318   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.348                       | 2.475 | .288            | -.83333         | .61824                | -3.05927                                  | 1.39260  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | 1.778                                   | .253 | -1.267                       | 4     | .274            | -3.20000        | 2.52631               | -10.21415                                 | 3.81415  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.267                       | 2.948 | .296            | -3.20000        | 2.52631               | -11.32116                                 | 4.92116  |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | .134                                    | .733 | .092                         | 4     | .931            | .16667          | 1.81873               | -4.88294                                  | 5.21627  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .092                         | 3.934 | .931            | .16667          | 1.81873               | -4.91642                                  | 5.24975  |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | .193                                    | .683 | -.359                        | 4     | .738            | -.43333         | 1.20600               | -3.78174                                  | 2.91507  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.359                        | 3.865 | .738            | -.43333         | 1.20600               | -3.82851                                  | 2.96184  |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | 4.483                                   | .102 | -.641                        | 4     | .557            | -1.16667        | 1.82148               | -6.22390                                  | 3.89056  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.641                        | 2.603 | .574            | -1.16667        | 1.82148               | -7.49780                                  | 5.16447  |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | 13.912                                  | .020 | -.718                        | 4     | .513            | -1.66667        | 2.32283               | -8.11589                                  | 4.78255  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.718                        | 2.016 | .547            | -1.66667        | 2.32283               | -11.58673                                 | 8.25340  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | 12.580                                  | .024 | -.257                        | 4     | .810            | -.60000         | 2.33143               | -7.07308                                  | 5.87308  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.257                        | 2.035 | .821            | -.60000         | 2.33143               | -10.46566                                 | 9.26566  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | 7.136                                   | .056 | -.645                        | 4     | .554            | -1.96667        | 3.05141               | -10.43874                                 | 6.50541  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.645                        | 2.021 | .585            | -1.96667        | 3.05141               | -14.96821                                 | 11.03487 |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 4.908                                   | .091 | -2.253                       | 4     | .087            | -2.30000        | 1.02089               | -5.13445                                  | .53445   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.253                       | 2.030 | .151            | -2.30000        | 1.02089               | -6.63078                                  | 2.03078  |
| DHA EPA                  | Equal variances assumed     | 3.168                                   | .150 | -.225                        | 4     | .833            | -.16667         | .74087                | -2.22365                                  | 1.89032  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.225                        | 2.859 | .837            | -.16667         | .74087                | -2.59141                                  | 2.25807  |



ตารางภาคผนวกที่ 47 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการดูน (*H. picta*) ระยะชุกเยื้อะ 4 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| c14                      | Equal variances assumed     | 8.477                                   | .044 | 3.054                        | 4     | .038            | 1.31000         | .42894                | .11907                                    | 2.50093  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.054                        | 2.218 | .081            | 1.31000         | .42894                | -.37207                                   | 2.99207  |
| c16                      | Equal variances assumed     | 4.164                                   | .111 | 3.776                        | 4     | .019            | 3.50333         | .92773                | .92755                                    | 6.07912  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.776                        | 2.181 | .055            | 3.50333         | .92773                | -.18704                                   | 7.19370  |
| c18                      | Equal variances assumed     | 2.866                                   | .166 | 2.061                        | 4     | .108            | 1.38667         | .67295                | -.48173                                   | 3.25506  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.061                        | 2.106 | .169            | 1.38667         | .67295                | -1.37302                                  | 4.14635  |
| c20                      | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -10.277                      | 4     | .001            | -4.07667        | .39667                | -5.17799                                  | -2.97534 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -10.277                      | 2.000 | .009            | -4.07667        | .39667                | -5.78339                                  | -2.36995 |
| c22                      | Equal variances assumed     | 12.686                                  | .024 | -2.572                       | 4     | .062            | -4.57000        | 1.77661               | -9.50267                                  | .36267   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.572                       | 2.045 | .121            | -4.57000        | 1.77661               | -12.05464                                 | 2.91464  |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 3.831                                   | .122 | 2.663                        | 4     | .056            | 3.03000         | 1.13787               | -.12924                                   | 6.18924  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.663                        | 2.064 | .113            | 3.03000         | 1.13787               | -1.72380                                  | 7.78380  |
| C161                     | Equal variances assumed     | 5.685                                   | .076 | -1.561                       | 4     | .194            | -1.46000        | .93523                | -4.05662                                  | 1.13662  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.561                       | 2.364 | .240            | -1.46000        | .93523                | -4.94466                                  | 2.02466  |
| C181                     | Equal variances assumed     | 3.830                                   | .122 | -2.007                       | 4     | .115            | -1.80333        | .89845                | -4.29783                                  | .69116   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.007                       | 2.205 | .171            | -1.80333        | .89845                | -5.34440                                  | 1.73773  |
| C201                     | Equal variances assumed     | 2.213                                   | .211 | 2.271                        | 4     | .086            | 4.68333         | 2.06191               | -1.04145                                  | 10.40812 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.271                        | 2.939 | .110            | 4.68333         | 2.06191               | -1.95690                                  | 11.32357 |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | .403                                    | .560 | 2.022                        | 4     | .113            | 1.89333         | .93649                | -.70679                                   | 4.49346  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.022                        | 3.626 | .120            | 1.89333         | .93649                | -.81590                                   | 4.60256  |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | 1.710                                   | .261 | -1.193                       | 4     | .299            | -.90333         | .75727                | -3.00585                                  | 1.19918  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.193                       | 2.398 | .338            | -.90333         | .75727                | -3.69469                                  | 1.88802  |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 15.992                                  | .016 | -7.250                       | 4     | .002            | -5.60667        | .77335                | -7.75384                                  | -3.45949 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -7.250                       | 2.000 | .018            | -5.60667        | .77335                | -8.93414                                  | -2.27919 |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | .090                                    | .779 | -2.499                       | 4     | .067            | -2.24333        | .89769                | -4.73573                                  | .24907   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.499                       | 3.683 | .072            | -2.24333        | .89769                | -4.82262                                  | .33595   |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | 8.212                                   | .046 | -1.422                       | 4     | .228            | -4.25333        | 2.99068               | -12.55680                                 | 4.05013  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.422                       | 2.149 | .283            | -4.25333        | 2.99068               | -16.30478                                 | 7.79811  |
| C183n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -.96667         | .96667                | -3.65056                                  | 1.71723  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -.96667         | .96667                | -5.12590                                  | 3.19256  |
| C184n3                   | Equal variances assumed     | 15.380                                  | .017 | -4.368                       | 4     | .012            | -5.10000        | 1.16760               | -8.34179                                  | -1.85821 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.368                       | 2.000 | .049            | -5.10000        | 1.16760               | -10.12380                                 | -.07620  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | 7.810                                   | .049 | -1.837                       | 4     | .140            | -3.62000        | 1.97010               | -9.08988                                  | 1.84988  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.837                       | 2.299 | .191            | -3.62000        | 1.97010               | -11.12331                                 | 3.88331  |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | 15.032                                  | .018 | .099                         | 4     | .926            | .46667          | 4.73565               | -12.68161                                 | 13.61494 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .099                         | 2.004 | .930            | .46667          | 4.73565               | -19.87107                                 | 20.80440 |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | 7.570                                   | .051 | -1.838                       | 4     | .140            | -1.49667        | .81423                | -3.75734                                  | .76401   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.838                       | 2.314 | .190            | -1.49667        | .81423                | -4.58169                                  | 1.58836  |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | .422                                    | .551 | -.475                        | 4     | .660            | -.38333         | .80739                | -2.62501                                  | 1.85834  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.475                        | 3.551 | .663            | -.38333         | .80739                | -2.74142                                  | 1.97475  |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | 2.803                                   | .169 | -.698                        | 4     | .524            | -1.36667        | 1.95875               | -6.80504                                  | 4.07170  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.698                        | 3.025 | .535            | -1.36667        | 1.95875               | -7.57174                                  | 4.83841  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | 7.038                                   | .057 | -1.218                       | 4     | .290            | -2.37667        | 1.95068               | -7.79262                                  | 3.03929  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.218                       | 2.349 | .331            | -2.37667        | 1.95068               | -9.68151                                  | 4.92818  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | 9.280                                   | .038 | -2.897                       | 4     | .044            | -5.13667        | 1.77322               | -10.05992                                 | -.21342  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.897                       | 2.181 | .092            | -5.13667        | 1.77322               | -12.18990                                 | 1.91656  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 2.423                                   | .195 | 1.467                        | 4     | .216            | 1.39333         | .94957                | -1.24309                                  | 4.02975  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.467                        | 3.112 | .235            | 1.39333         | .94957                | -1.56804                                  | 4.35470  |
| DHA-EPA                  | Equal variances assumed     | 8.062                                   | .047 | 1.115                        | 4     | .327            | .86333          | .77426                | -1.28636                                  | 3.01302  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.115                        | 2.206 | .371            | .86333          | .77426                | -2.18662                                  | 3.91329  |

ตารางภาคผนวกที่ 48 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการคืน (*H. picta*) ระยะชู่เอื้อยะ 5 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                                           |                   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                                           |                   |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 | 95% Confidence Interval of the Difference |                   |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference                     | Lower Upper       |
| c14                      | Equal variances assumed     | 7.891                                   | .048 | 1.158                        | 4     | .311            | 2.70000         | 2.33095                                   | -3.77176 9.17176  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.158                        | 2.285 | .353            | 2.70000         | 2.33095                                   | -6.22035 11.62035 |
| c16                      | Equal variances assumed     | 4.193                                   | .110 | .297                         | 4     | .781            | .33333          | 1.12200                                   | -2.78184 3.44851  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .297                         | 2.680 | .788            | .33333          | 1.12200                                   | -3.49081 4.15748  |
| c18                      | Equal variances assumed     | 5.063                                   | .088 | -.350                        | 4     | .744            | -.30000         | .85829                                    | -2.68300 2.08300  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.350                        | 2.568 | .753            | -.30000         | .85829                                    | -3.31047 2.71047  |
| c20                      | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | 1.000                        | 4     | .374            | 1.40000         | 1.40000                                   | -2.48702 5.28702  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.000                        | 2.000 | .423            | 1.40000         | 1.40000                                   | -4.62371 7.42371  |
| c22                      | Equal variances assumed     | .002                                    | .969 | -.021                        | 4     | .984            | -.06667         | 3.13971                                   | -8.78390 8.65057  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.021                        | 3.999 | .984            | -.06667         | 3.13971                                   | -8.78439 8.65106  |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 4.114                                   | .112 | .531                         | 4     | .624            | .96667          | 1.82178                                   | -4.09141 6.02474  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .531                         | 2.173 | .645            | .96667          | 1.82178                                   | -6.30338 8.23672  |
| C161                     | Equal variances assumed     | .452                                    | .538 | .977                         | 4     | .384            | .76667          | .78457                                    | -1.41166 2.94499  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .977                         | 3.785 | .387            | .76667          | .78457                                    | -1.46131 2.99464  |
| C181                     | Equal variances assumed     | 9.393                                   | .037 | -2.339                       | 4     | .079            | -1.83333        | .78387                                    | -4.00969 .34302   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.339                       | 2.158 | .135            | -1.83333        | .78387                                    | -4.98055 1.31388  |
| C201                     | Equal variances assumed     | 4.610                                   | .098 | -1.754                       | 4     | .154            | -1.76667        | 1.00720                                   | -4.56309 1.02976  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.754                       | 2.576 | .193            | -1.76667        | 1.00720                                   | -5.29264 1.75931  |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | .032                                    | .866 | -2.537                       | 4     | .064            | -2.63333        | 1.03816                                   | -5.51573 .24906   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.537                       | 3.923 | .065            | -2.63333        | 1.03816                                   | -5.53821 .27155   |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | .040                                    | .851 | -2.390                       | 4     | .075            | -.66667         | .27889                                    | -1.44098 .10765   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.390                       | 3.948 | .076            | -.66667         | .27889                                    | -1.44499 .11165   |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | .040                                    | .851 | -2.390                       | 4     | .075            | -.66667         | .27889                                    | -1.44098 .10765   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.390                       | 3.948 | .076            | -.66667         | .27889                                    | -1.44499 .11165   |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | .002                                    | .963 | -1.083                       | 4     | .340            | -1.13333        | 1.04616                                   | -4.03793 1.77126  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.083                       | 3.991 | .340            | -1.13333        | 1.04616                                   | -4.04054 1.77387  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | 15.976                                  | .016 | -2.000                       | 4     | .116            | -4.43333        | 2.21685                                   | -10.58831 1.72164 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.000                       | 2.000 | .184            | -4.43333        | 2.21685                                   | -13.97169 5.10502 |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | 4.810                                   | .093 | -.933                        | 4     | .404            | -.66667         | .71492                                    | -2.65160 1.31827  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.933                        | 2.460 | .433            | -.66667         | .71492                                    | -3.25241 1.91907  |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | 12.668                                  | .024 | -3.298                       | 4     | .030            | -2.10000        | .63683                                    | -3.86813 -.33187  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.298                       | 2.044 | .079            | -2.10000        | .63683                                    | -4.78393 .58393   |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | .508                                    | .515 | -4.216                       | 4     | .014            | -2.86667        | .67987                                    | -4.75429 -.97905  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.216                       | 3.540 | .017            | -2.86667        | .67987                                    | -4.85513 -.87820  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | .006                                    | .944 | -4.881                       | 4     | .008            | -2.93333        | .60093                                    | -4.60177 -1.26490 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.881                       | 3.994 | .008            | -2.93333        | .60093                                    | -4.60282 -1.26384 |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | .508                                    | .515 | -4.216                       | 4     | .014            | -2.86667        | .67987                                    | -4.75429 -.97905  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.216                       | 3.540 | .017            | -2.86667        | .67987                                    | -4.85513 -.87820  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 5.184                                   | .085 | -1.584                       | 4     | .188            | -.73333         | .46308                                    | -2.01905 .55239   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.584                       | 2.481 | .230            | -.73333         | .46308                                    | -2.39770 .93103   |
| DHA-EPA                  | Equal variances assumed     | .065                                    | .811 | -.688                        | 4     | .530            | -.50000         | .72725                                    | -2.51916 1.51916  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.688                        | 3.969 | .530            | -.50000         | .72725                                    | -2.52538 1.52538  |



ตารางภาคผนวกที่ 49 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) ระยะชุกเื้อยะ 7 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| c14                      | Equal variances assumed     | .182                                    | .692 | 2.000                        | 4     | .116            | .53333          | .26667                | -.20705                                   | 1.27372  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.000                        | 3.817 | .119            | .53333          | .26667                | -.22124                                   | 1.28790  |
| c16                      | Equal variances assumed     | 3.184                                   | .149 | 1.583                        | 4     | .189            | 1.00000         | .63158                | -.75354                                   | 2.75354  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.583                        | 2.872 | .215            | 1.00000         | .63158                | -1.06164                                  | 3.06164  |
| c18                      | Equal variances assumed     | 7.550                                   | .051 | -1.378                       | 4     | .240            | -2.20000        | 1.59652               | -6.63266                                  | 2.23266  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.378                       | 2.055 | .299            | -2.20000        | 1.59652               | -8.89673                                  | 4.49673  |
| c20                      | Equal variances assumed     | 15.747                                  | .017 | -1.998                       | 4     | .116            | -2.73333        | 1.36789               | -6.53119                                  | 1.06453  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.998                       | 2.000 | .184            | -2.73333        | 1.36789               | -8.61887                                  | 3.15220  |
| c22                      | Equal variances assumed     | 1.910                                   | .239 | -1.833                       | 4     | .141            | -.56667         | .30912                | -1.42492                                  | .29159   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.833                       | 3.050 | .163            | -.56667         | .30912                | -1.54138                                  | .40805   |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 4.914                                   | .091 | -.603                        | 4     | .579            | -1.06667        | 1.76949               | -5.97957                                  | 3.84624  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.603                        | 2.226 | .602            | -1.06667        | 1.76949               | -7.98603                                  | 5.85269  |
| C161                     | Equal variances assumed     | .848                                    | .409 | 1.782                        | 4     | .149            | 1.30000         | .72954                | -.72552                                   | 3.32552  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.782                        | 3.117 | .169            | 1.30000         | .72954                | -.97329                                   | 3.57329  |
| C181                     | Equal variances assumed     | .695                                    | .451 | 2.481                        | 4     | .068            | 2.83333         | 1.14212               | -.33771                                   | 6.00437  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.481                        | 3.690 | .073            | 2.83333         | 1.14212               | -.44540                                   | 6.11207  |
| C201                     | Equal variances assumed     | .064                                    | .812 | 1.847                        | 4     | .139            | 4.30000         | 2.32857               | -2.16514                                  | 10.76514 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.847                        | 3.964 | .139            | 4.30000         | 2.32857               | -2.18805                                  | 10.78805 |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | .004                                    | .953 | 8.790                        | 4     | .001            | 6.03333         | .68638                | 4.12765                                   | 7.93902  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 8.790                        | 3.916 | .001            | 6.03333         | .68638                | 4.11147                                   | 7.95519  |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | 3.803                                   | .123 | 1.337                        | 4     | .252            | .63333          | .47376                | -.68202                                   | 1.94869  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.337                        | 2.458 | .292            | .63333          | .47376                | -1.08110                                  | 2.34777  |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -1.20000        | 1.20000               | -4.53173                                  | 2.13173  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -1.20000        | 1.20000               | -6.36318                                  | 3.96318  |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | 2.306                                   | .204 | .876                         | 4     | .430            | .43333          | .49441                | -.93938                                   | 1.80604  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .876                         | 2.824 | .449            | .43333          | .49441                | -1.19719                                  | 2.06386  |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | 1.103                                   | .353 | -.067                        | 4     | .950            | -.03333         | .49777                | -1.41537                                  | 1.34871  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.067                        | 2.629 | .951            | -.03333         | .49777                | -1.75158                                  | 1.68491  |
| C183n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -1.23333        | 1.23333               | -4.65762                                  | 2.19095  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -1.23333        | 1.23333               | -6.53994                                  | 4.07327  |
| C184n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -1.06667        | 1.06667               | -4.02821                                  | 1.89487  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -1.06667        | 1.06667               | -5.65616                                  | 3.52283  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | .021                                    | .892 | -.648                        | 4     | .552            | -1.73333        | 2.67436               | -9.15856                                  | 5.69189  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.648                        | 3.992 | .552            | -1.73333        | 2.67436               | -9.16455                                  | 5.69788  |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -1.26667        | 1.26667               | -4.78350                                  | 2.25016  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -1.26667        | 1.26667               | -6.71669                                  | 4.18336  |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | 8.475                                   | .044 | -1.471                       | 4     | .215            | -.83333         | .56667                | -2.40665                                  | .73999   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.471                       | 2.234 | .267            | -.83333         | .56667                | -3.04271                                  | 1.37604  |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | 3.920                                   | .119 | -1.118                       | 4     | .326            | -.83333         | .74536                | -2.90277                                  | 1.23611  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.118                       | 2.373 | .364            | -.83333         | .74536                | -3.60251                                  | 1.93584  |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | 8.281                                   | .045 | -2.019                       | 4     | .114            | -1.70000        | .84196                | -4.03764                                  | .63764   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.019                       | 2.123 | .174            | -1.70000        | .84196                | -5.12924                                  | 1.72924  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | 4.569                                   | .099 | -1.765                       | 4     | .152            | -1.30000        | .73636                | -3.34446                                  | .74446   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.765                       | 2.270 | .204            | -1.30000        | .73636                | -4.13311                                  | 1.53311  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | 9.128                                   | .039 | -1.703                       | 4     | .164            | -1.60000        | .93927                | -4.20782                                  | 1.00782  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.703                       | 2.098 | .225            | -1.60000        | .93927                | -5.46571                                  | 2.26571  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | .143                                    | .725 | -1.700                       | 4     | .164            | -1.13333        | .66667                | -2.98430                                  | .71763   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.700                       | 3.923 | .166            | -1.13333        | .66667                | -2.99869                                  | .73203   |
| DHAIPA                   | Equal variances assumed     | .604                                    | .481 | 1.050                        | 4     | .353            | .26667          | .25386                | -.43816                                   | .97149   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.050                        | 3.575 | .359            | .26667          | .25386                | -.47247                                   | 1.00581  |



ตารางภาคผนวกที่ 50 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ย  
ของกรดไขมันระหว่างกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ระยะซุเอียะ 8 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการ  
เพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |       |                              |       |                 |                 |                       |           |                                           |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |       | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |           | 95% Confidence Interval of the Difference |  |
|                          |                             |                                         |       |                              |       |                 |                 |                       |           |                                           |  |
|                          |                             | F                                       | Sig.  | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower     | Upper                                     |  |
| c14                      | Equal variances assumed     | 5.487                                   | .079  | 1.605                        | 4     | .184            | 3.10000         | 1.93103               | -2.26141  | 8.46141                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | 1.605                        | 2.424 | .228            | 3.10000         | 1.93103               | -3.96005  | 10.16005                                  |  |
| c16                      | Equal variances assumed     | .125                                    | .742  | -.085                        | 4     | .936            | -.16667         | 1.95505               | -5.59476  | 5.26142                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -.085                        | 3.721 | .936            | -.16667         | 1.95505               | -5.75911  | 5.42578                                   |  |
| c18                      | Equal variances assumed     | 2.647                                   | .179  | -1.287                       | 4     | .267            | -2.33333        | 1.81230               | -7.36509  | 2.69843                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -1.287                       | 2.101 | .321            | -2.33333        | 1.81230               | -9.78192  | 5.11525                                   |  |
| c20                      | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016  | 1.000                        | 4     | .374            | 1.16667         | 1.16667               | -2.07252  | 4.40585                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | 1.000                        | 2.000 | .423            | 1.16667         | 1.16667               | -3.85309  | 6.18643                                   |  |
| c22                      | Equal variances assumed     | .167                                    | .703  | .207                         | 4     | .846            | .56667          | 2.73415               | -7.02454  | 8.15787                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .207                         | 3.919 | .846            | .56667          | 2.73415               | -7.08666  | 8.21999                                   |  |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 3.802                                   | .123  | -.475                        | 4     | .660            | -1.03333        | 2.17537               | -7.07312  | 5.00645                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -.475                        | 2.672 | .671            | -1.03333        | 2.17537               | -8.46332  | 6.39666                                   |  |
| C161                     | Equal variances assumed     | 12.998                                  | .023  | .809                         | 4     | .464            | 2.96667         | 3.66758               | -7.21616  | 13.14949                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .809                         | 2.032 | .502            | 2.96667         | 3.66758               | -12.57567 | 18.50900                                  |  |
| C181                     | Equal variances assumed     | .365                                    | .578  | 1.314                        | 4     | .259            | 1.00000         | .76085                | -1.11245  | 3.11245                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | 1.314                        | 3.769 | .263            | 1.00000         | .76085                | -1.16452  | 3.16452                                   |  |
| C201                     | Equal variances assumed     | 3.027                                   | .157  | -.168                        | 4     | .875            | -.40000         | 2.38024               | -7.00861  | 6.20861                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -.168                        | 2.897 | .878            | -.40000         | 2.38024               | -8.13023  | 7.33023                                   |  |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | .543                                    | .502  | .478                         | 4     | .658            | 1.13333         | 2.37253               | -5.45386  | 7.72053                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .478                         | 3.492 | .661            | 1.13333         | 2.37253               | -5.84945  | 8.11612                                   |  |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | .114                                    | .752  | 2.460                        | 4     | .070            | .73333          | .29814                | -.09444   | 1.56111                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | 2.460                        | 3.978 | .070            | .73333          | .29814                | -.09628   | 1.56295                                   |  |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 1.382                                   | .305  | -1.135                       | 4     | .320            | -3.06667        | 2.70226               | -10.56935 | 4.43602                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -1.135                       | 3.422 | .330            | -3.06667        | 2.70226               | -11.09615 | 4.96282                                   |  |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | .910                                    | .394  | -.391                        | 4     | .716            | -.26667         | .68150                | -2.15882  | 1.62549                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -.391                        | 3.255 | .720            | -.26667         | .68150                | -2.34253  | 1.80920                                   |  |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | .019                                    | .896  | .500                         | 4     | .643            | .80000          | 1.59965               | -3.64135  | 5.24135                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .500                         | 3.981 | .643            | .80000          | 1.59965               | -3.64971  | 5.24971                                   |  |
| C184n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016  | 1.000                        | 4     | .374            | 1.13333         | 1.13333               | -2.01330  | 4.27997                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | 1.000                        | 2.000 | .423            | 1.13333         | 1.13333               | -3.74301  | 6.00967                                   |  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | 1.485                                   | .290  | .651                         | 4     | .550            | 1.80000         | 2.76325               | -5.87201  | 9.47201                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .651                         | 3.332 | .557            | 1.80000         | 2.76325               | -6.51887  | 10.11887                                  |  |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | .168                                    | .703  | -.552                        | 4     | .611            | -1.16667        | 2.11529               | -7.03965  | 4.70632                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -.552                        | 3.918 | .611            | -1.16667        | 2.11529               | -7.08818  | 4.75484                                   |  |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | 8.208                                   | .046  | .213                         | 4     | .842            | .36667          | 1.72498               | -4.42265  | 5.15598                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .213                         | 2.047 | .851            | .36667          | 1.72498               | -6.89492  | 7.62825                                   |  |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | 7.704                                   | .050  | -.045                        | 4     | .966            | -.13333         | 2.93504               | -8.28230  | 8.01564                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -.045                        | 2.121 | .968            | -.13333         | 2.93504               | -12.09548 | 11.82882                                  |  |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | 4.033                                   | .115  | .122                         | 4     | .909            | .40000          | 3.28211               | -8.71259  | 9.51259                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .122                         | 2.472 | .912            | .40000          | 3.28211               | -11.42864 | 12.22864                                  |  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | 2.090                                   | .222  | .024                         | 4     | .982            | .06667          | 2.76365               | -7.60646  | 7.73980                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .024                         | 2.797 | .982            | .06667          | 2.76365               | -9.10080  | 9.23413                                   |  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | 3.806                                   | .123  | .725                         | 4     | .509            | 2.03333         | 2.80614               | -5.75777  | 9.82444                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .725                         | 2.401 | .533            | 2.03333         | 2.80614               | -8.30148  | 12.36815                                  |  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 10.796                                  | .030  | .131                         | 4     | .902            | .23333          | 1.77514               | -4.69524  | 5.16190                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | .131                         | 2.082 | .907            | .23333          | 1.77514               | -7.18999  | 7.65666                                   |  |
| DHA EPA                  | Equal variances assumed     | .000                                    | 1.000 | -1.254                       | 4     | .278            | -.60000         | .47842                | -1.92832  | .72832                                    |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |       | -1.254                       | 3.986 | .278            | -.60000         | .47842                | -1.93010  | .73010                                    |  |

ตารางภาคผนวกที่ 51 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ระยะซุเอียะ 9 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |           |                                           |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |           |                                           |  |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |           | 95% Confidence Interval of the Difference |  |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower     | Upper                                     |  |
| c14                      | Equal variances assumed     | 9.680                                   | .036 | .452                         | 4     | .675            | .10000          | .22111                | -.51390   | .71390                                    |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .452                         | 2.093 | .694            | .10000          | .22111                | -.81198   | 1.01198                                   |  |
| c16                      | Equal variances assumed     | .046                                    | .841 | .437                         | 4     | .685            | .30000          | .68718                | -1.60793  | 2.20793                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .437                         | 3.976 | .685            | .30000          | .68718                | -1.61247  | 2.21247                                   |  |
| c18                      | Equal variances assumed     | .643                                    | .468 | .490                         | 4     | .650            | .16667          | .33993                | -.77714   | 1.11048                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .490                         | 3.298 | .655            | .16667          | .33993                | -.86197   | 1.19531                                   |  |
| c20                      | Equal variances assumed     | 7.323                                   | .054 | -.822                        | 4     | .457            | -1.26667        | 1.54092               | -5.54496  | 3.01162                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.822                        | 2.017 | .497            | -1.26667        | 1.54092               | -7.84372  | 5.31038                                   |  |
| c22                      | Equal variances assumed     | 4.000                                   | .116 | -7.015                       | 4     | .002            | -1.53333        | .21858                | -2.14021  | -.92645                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -7.015                       | 2.749 | .008            | -1.53333        | .21858                | -2.26623  | -.80044                                   |  |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 1.709                                   | .261 | -.042                        | 4     | .969            | -.03333         | .79931                | -2.25256  | 2.18589                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.042                        | 3.238 | .969            | -.03333         | .79931                | -2.47462  | 2.40795                                   |  |
| C161                     | Equal variances assumed     | 4.324                                   | .106 | 3.213                        | 4     | .033            | 1.56667         | .48762                | .21280    | 2.92053                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.213                        | 2.258 | .072            | 1.56667         | .48762                | -.31788   | 3.45121                                   |  |
| C181                     | Equal variances assumed     | 1.049                                   | .364 | 2.548                        | 4     | .063            | 2.06667         | .81104                | -.18513   | 4.31846                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.548                        | 3.560 | .071            | 2.06667         | .81104                | -.29911   | 4.43244                                   |  |
| C201                     | Equal variances assumed     | 1.551                                   | .281 | 1.535                        | 4     | .200            | 2.13333         | 1.38964               | -1.72494  | 5.99160                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.535                        | 2.559 | .237            | 2.13333         | 1.38964               | -2.75279  | 7.01945                                   |  |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | 1.131                                   | .348 | 4.492                        | 4     | .011            | 3.80000         | .84591                | 1.45139   | 6.14861                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 4.492                        | 2.688 | .026            | 3.80000         | .84591                | .92204    | 6.67796                                   |  |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | 1.385                                   | .305 | 2.261                        | 4     | .087            | .50000          | .22111                | -.11390   | 1.11390                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.261                        | 2.731 | .118            | .50000          | .22111                | -.24462   | 1.24462                                   |  |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 10.494                                  | .032 | -.672                        | 4     | .538            | -.93333         | 1.38884               | -4.78938  | 2.92272                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.672                        | 2.066 | .569            | -.93333         | 1.38884               | -6.73093  | 4.86427                                   |  |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | 3.226                                   | .147 | 1.000                        | 4     | .374            | .33333          | .33333                | -.59215   | 1.25882                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.000                        | 2.735 | .397            | .33333          | .33333                | -.78801   | 1.45467                                   |  |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | 2.154                                   | .216 | -6.616                       | 4     | .003            | -2.03333        | .30732                | -2.88659  | -1.18008                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -6.616                       | 3.185 | .006            | -2.03333        | .30732                | -2.98000  | -1.08666                                  |  |
| C183n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | 1.000                        | 4     | .374            | 1.36667         | 1.36667               | -2.42781  | 5.16114                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.000                        | 2.000 | .423            | 1.36667         | 1.36667               | -4.51363  | 7.24696                                   |  |
| C184n3                   | Equal variances assumed     | 2.996                                   | .159 | -.012                        | 4     | .991            | -.03333         | 2.80793               | -7.82938  | 7.76272                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.012                        | 2.979 | .991            | -.03333         | 2.80793               | -9.00500  | 8.93833                                   |  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | .603                                    | .481 | .716                         | 4     | .514            | .73333          | 1.02415               | -2.11017  | 3.57684                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .716                         | 3.722 | .516            | .73333          | 1.02415               | -2.19593  | 3.66259                                   |  |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | 12.174                                  | .025 | -.533                        | 4     | .622            | -.83333         | 1.56347               | -5.17423  | 3.50756                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.533                        | 2.035 | .647            | -.83333         | 1.56347               | -7.45122  | 5.78455                                   |  |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | 3.350                                   | .141 | -8.716                       | 4     | .001            | -4.20000        | .48189                | -5.53795  | -2.86205                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -8.716                       | 2.264 | .009            | -4.20000        | .48189                | -6.05803  | -2.34197                                  |  |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | 1.818                                   | .249 | -6.036                       | 4     | .004            | -5.63333        | .93333                | -8.22468  | -3.04198                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -6.036                       | 3.200 | .008            | -5.63333        | .93333                | -8.50131  | -2.76536                                  |  |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | 1.966                                   | .234 | -6.024                       | 4     | .004            | -6.40000        | 1.06249               | -9.34995  | -3.45005                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -6.024                       | 3.225 | .007            | -6.40000        | 1.06249               | -9.65163  | -3.14837                                  |  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | .846                                    | .410 | -7.077                       | 4     | .002            | -5.66667        | .80069                | -7.88975  | -3.44358                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -7.077                       | 3.627 | .003            | -5.66667        | .80069                | -7.98285  | -3.35049                                  |  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | 1.385                                   | .304 | -9.905                       | 4     | .001            | -9.76667        | .98601                | -12.50428 | -7.02905                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -9.905                       | 2.782 | .003            | -9.76667        | .98601                | -13.04847 | -6.48486                                  |  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 4.009                                   | .116 | -4.445                       | 4     | .011            | -3.00000        | .67495                | -4.87396  | -1.12604                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.445                       | 2.753 | .025            | -3.00000        | .67495                | -5.26143  | -.73857                                   |  |
| DHA:PA                   | Equal variances assumed     | 9.565                                   | .036 | 1.412                        | 4     | .231            | 1.03333         | .73182                | -.99852   | 3.06518                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.412                        | 2.111 | .287            | 1.03333         | .73182                | -1.96223  | 4.02889                                   |  |



ตารางภาคผนวกที่ 52 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการดูด (H. picta) ระยะชุกเียะ 10 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |           |                                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |           | 95% Confidence Interval of the Difference |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower     | Upper                                     |
| c14                      | Equal variances assumed     | 11.957                                  | .026 | -.039                        | 4     | .970            | -.11333         | 2.87345               | -8.09131  | 7.86464                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.039                        | 2.014 | .972            | -.11333         | 2.87345               | -12.39768 | 12.17101                                  |
| c16                      | Equal variances assumed     | 7.634                                   | .051 | -4.841                       | 4     | .008            | -5.32667        | 1.10040               | -8.38186  | -2.27147                                  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.841                       | 2.294 | .030            | -5.32667        | 1.10040               | -9.52479  | -1.12855                                  |
| c18                      | Equal variances assumed     | 8.899                                   | .041 | -4.328                       | 4     | .012            | -4.90333        | 1.13298               | -8.04899  | -1.75768                                  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.328                       | 2.096 | .045            | -4.90333        | 1.13298               | -9.57099  | -.23568                                   |
| c20                      | Equal variances assumed     | 8.411                                   | .044 | 1.907                        | 4     | .129            | 3.10000         | 1.62583               | -1.41404  | 7.61404                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.907                        | 2.000 | .197            | 3.10000         | 1.62583               | -3.89540  | 10.09540                                  |
| c22                      | Equal variances assumed     | 14.590                                  | .019 | 1.989                        | 4     | .118            | 3.90000         | 1.96044               | -1.54306  | 9.34306                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.989                        | 2.000 | .185            | 3.90000         | 1.96044               | -4.53510  | 12.33510                                  |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 10.641                                  | .031 | -3.418                       | 4     | .027            | -7.04667        | 2.06156               | -12.77046 | -1.32287                                  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.418                       | 2.090 | .071            | -7.04667        | 2.06156               | -15.56150 | 1.46817                                   |
| C161                     | Equal variances assumed     | 11.622                                  | .027 | 2.865                        | 4     | .046            | 7.01000         | 2.44683               | 2.1650    | 13.80350                                  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.865                        | 2.078 | .099            | 7.01000         | 2.44683               | -3.14844  | 17.16844                                  |
| C181                     | Equal variances assumed     | .101                                    | .766 | .857                         | 4     | .440            | .87000          | 1.01559               | -1.94973  | 3.68973                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .857                         | 3.932 | .441            | .87000          | 1.01559               | -1.96913  | 3.70913                                   |
| C201                     | Equal variances assumed     | .263                                    | .635 | .628                         | 4     | .564            | .79333          | 1.26241               | -2.71168  | 4.29834                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .628                         | 3.857 | .565            | .79333          | 1.26241               | -2.76358  | 4.35024                                   |
| TMJFA                    | Equal variances assumed     | 11.737                                  | .027 | 2.437                        | 4     | .071            | 2.65667         | 1.09011               | -.36997   | 5.68330                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.437                        | 2.072 | .131            | 2.65667         | 1.09011               | -1.88028  | 7.19362                                   |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | .205                                    | .674 | 2.729                        | 4     | .052            | 1.52333         | .55810                | -.02621   | 3.07287                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.729                        | 3.894 | .054            | 1.52333         | .55810                | -.04304   | 3.08971                                   |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | 131.000                      | 4     | .000            | 4.36667         | .03333                | 4.27412   | 4.45921                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 131.000                      | 2.000 | .000            | 4.36667         | .03333                | 4.22324   | 4.51009                                   |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | .466                                    | .532 | 4.258                        | 4     | .013            | 2.29000         | .53782                | .79676    | 3.78324                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 4.258                        | 3.756 | .015            | 2.29000         | .53782                | .75774    | 3.82226                                   |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | 13.568                                  | .021 | 1.258                        | 4     | .277            | 3.89667         | 3.09844               | -4.70599  | 12.49932                                  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.258                        | 2.013 | .335            | 3.89667         | 3.09844               | -9.35266  | 17.14599                                  |
| C183n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | 1.000                        | 4     | .374            | .93333          | .93333                | -1.65802  | 3.52468                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.000                        | 2.000 | .423            | .93333          | .93333                | -3.08248  | 4.94914                                   |
| C184n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | 1.000                        | 4     | .374            | 1.13333         | 1.13333               | -2.01330  | 4.27997                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.000                        | 2.000 | .423            | 1.13333         | 1.13333               | -3.74301  | 6.00967                                   |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | 6.563                                   | .063 | 34.429                       | 4     | .000            | 8.03333         | .23333                | 7.38550   | 8.68117                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 34.429                       | 2.000 | .001            | 8.03333         | .23333                | 7.02938   | 9.03729                                   |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | 77.000                       | 4     | .000            | 5.13333         | .06667                | 4.94824   | 5.31843                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 77.000                       | 2.000 | .000            | 5.13333         | .06667                | 4.84649   | 5.42018                                   |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | 1.683                                   | .264 | -1.946                       | 4     | .124            | -1.10667        | .56869                | -2.68561  | .47228                                    |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.946                       | 3.308 | .138            | -1.10667        | .56869                | -2.82468  | .61134                                    |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | 2.802                                   | .169 | .173                         | 4     | .871            | .33333          | 1.93071               | -5.02718  | 5.69385                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .173                         | 2.251 | .877            | .33333          | 1.93071               | -7.14575  | 7.81241                                   |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | 3.708                                   | .126 | 1.252                        | 4     | .279            | 2.33667         | 1.86700               | -2.84696  | 7.52029                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.252                        | 2.009 | .337            | 2.33667         | 1.86700               | -5.66221  | 10.33654                                  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | 3.484                                   | .135 | 1.725                        | 4     | .160            | 3.25333         | 1.88624               | -1.98372  | 8.49038                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.725                        | 2.061 | .223            | 3.25333         | 1.88624               | -4.63711  | 11.14378                                  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | 3.369                                   | .140 | 1.390                        | 4     | .237            | 2.60333         | 1.87294               | -2.59679  | 7.80345                                   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.390                        | 2.035 | .297            | 2.60333         | 1.87294               | -5.32573  | 10.53240                                  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 4.108                                   | .113 | -1.281                       | 4     | .270            | -.81000         | .63255                | -2.56625  | .94625                                    |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.281                       | 2.533 | .305            | -.81000         | .63255                | -3.05046  | 1.43046                                   |
| DHAIPA                   | Equal variances assumed     | .040                                    | .851 | 1.702                        | 4     | .164            | 1.83667         | 1.07885               | -1.15871  | 4.83204                                   |
|                          | Equal variances not         |                                         |      | 1.702                        | 3.991 | .164            | 1.83667         | 1.07885               | -1.16135  | 4.83468                                   |



ตารางภาคผนวกที่ 53 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกุ้งการ์ตูน (*H. picta*) ระยะซุเอียะ 11 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |          |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | 95% Confidence Interval of the Difference |          |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower                                     | Upper    |
| c14                      | Equal variances assumed     | 4.680                                   | .097 | -1.836                       | 4     | .140            | -.73333         | .39949                | -1.84248                                  | .37582   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.836                       | 2.394 | .187            | -.73333         | .39949                | -2.20755                                  | .74088   |
| c16                      | Equal variances assumed     | 11.477                                  | .028 | -1.958                       | 4     | .122            | -1.58667        | .81019                | -3.83612                                  | .66279   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.958                       | 2.083 | .184            | -1.58667        | .81019                | -4.94301                                  | 1.76967  |
| c18                      | Equal variances assumed     | 14.541                                  | .019 | -1.074                       | 4     | .343            | -1.28667        | 1.19828               | -4.61363                                  | 2.04030  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.074                       | 2.009 | .395            | -1.28667        | 1.19828               | -6.41964                                  | 3.84630  |
| c20                      | Equal variances assumed     | 13.707                                  | .021 | .520                         | 4     | .631            | .80667          | 1.55136               | -3.50059                                  | 5.11393  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .520                         | 2.022 | .654            | .80667          | 1.55136               | -5.79830                                  | 7.41163  |
| c22                      | Equal variances assumed     | 7.555                                   | .051 | -3.902                       | 4     | .018            | -.57333         | .14693                | -.98128                                   | -.16539  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.902                       | 2.216 | .051            | -.57333         | .14693                | -1.14991                                  | .00324   |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 12.501                                  | .024 | -1.477                       | 4     | .214            | -2.40333        | 1.62733               | -6.92153                                  | 2.11487  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.477                       | 2.020 | .277            | -2.40333        | 1.62733               | -9.33838                                  | 4.53172  |
| C161                     | Equal variances assumed     | 2.932                                   | .162 | .784                         | 4     | .477            | .36333          | .46369                | -.92408                                   | 1.65075  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .784                         | 2.949 | .491            | .36333          | .46369                | -1.12684                                  | 1.85350  |
| C181                     | Equal variances assumed     | 1.980                                   | .232 | .677                         | 4     | .535            | .60333          | .89074                | -1.86976                                  | 3.07643  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .677                         | 2.572 | .554            | .60333          | .89074                | -2.51789                                  | 3.72456  |
| C201                     | Equal variances assumed     | 8.727                                   | .042 | 1.351                        | 4     | .248            | 3.04333         | 2.25327               | -3.21276                                  | 9.29943  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.351                        | 2.105 | .304            | 3.04333         | 2.25327               | -6.20258                                  | 12.28925 |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | 8.522                                   | .043 | 1.163                        | 4     | .310            | 2.65000         | 2.27954               | -3.67903                                  | 8.97903  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.163                        | 2.027 | .364            | 2.65000         | 2.27954               | -7.03534                                  | 12.33534 |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | 5.459                                   | .080 | .749                         | 4     | .496            | .43333          | .57880                | -1.17368                                  | 2.04034  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .749                         | 2.268 | .524            | .43333          | .57880                | -1.79541                                  | 2.66207  |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 14.193                                  | .020 | 1.558                        | 4     | .194            | 2.35667         | 1.51257               | -1.84291                                  | 6.55624  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.558                        | 2.014 | .259            | 2.35667         | 1.51257               | -4.10933                                  | 8.82267  |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | 7.201                                   | .055 | 1.114                        | 4     | .328            | .80333          | .72123                | -1.19913                                  | 2.80580  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.114                        | 2.187 | .373            | .80333          | .72123                | -2.05849                                  | 3.66516  |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | 6.993                                   | .057 | .023                         | 4     | .983            | .01333          | .58116                | -1.60022                                  | 1.62689  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .023                         | 2.013 | .984            | .01333          | .58116                | -2.47154                                  | 2.49820  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | 6.502                                   | .063 | .101                         | 4     | .924            | .08000          | .78832                | -2.10874                                  | 2.26874  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .101                         | 2.007 | .928            | .08000          | .78832                | -3.30031                                  | 3.46031  |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | 15.334                                  | .017 | 1.708                        | 4     | .163            | 2.73333         | 1.60035               | -1.70994                                  | 7.17661  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.708                        | 2.002 | .230            | 2.73333         | 1.60035               | -4.14669                                  | 9.61335  |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | .004                                    | .950 | -7.919                       | 4     | .001            | -3.12000        | .39400                | -4.21391                                  | -2.02609 |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -7.919                       | 3.962 | .001            | -3.12000        | .39400                | -4.21808                                  | -2.02192 |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | 1.248                                   | .326 | -.014                        | 4     | .990            | -.00667         | .47963                | -1.33833                                  | 1.32500  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.014                        | 3.400 | .990            | -.00667         | .47963                | -1.43630                                  | 1.42297  |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | 1.095                                   | .354 | -2.010                       | 4     | .115            | -1.25333        | .62349                | -2.98443                                  | .47776   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.010                       | 3.502 | .125            | -1.25333        | .62349                | -3.08587                                  | .57920   |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | 4.150                                   | .111 | -.891                        | 4     | .423            | -.77000         | .86416                | -3.16928                                  | 1.62928  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.891                        | 2.626 | .447            | -.77000         | .86416                | -3.75538                                  | 2.21538  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | 1.664                                   | .267 | -1.494                       | 4     | .209            | -1.03667        | .69372                | -2.96274                                  | .88940   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.494                       | 2.994 | .232            | -1.03667        | .69372                | -3.24704                                  | 1.17370  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 4.753                                   | .095 | -2.347                       | 4     | .079            | -1.47000        | .62625                | -3.20875                                  | .26875   |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.347                       | 2.462 | .120            | -1.47000        | .62625                | -3.73350                                  | .79350   |
| DHAPEA                   | Equal variances assumed     | 4.676                                   | .097 | 6.880                        | 4     | .002            | 3.08333         | .44816                | 1.83905                                   | 4.32762  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 6.880                        | 2.431 | .012            | 3.08333         | .44816                | 1.44818                                   | 4.71849  |

ตารางภาคผนวกที่ 54 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ย  
ของกรดไขมันระหว่างกึ่งการตุ๋น (*H. picta*) ระยะชุกเฉื่อย 12 ที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการ  
เพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |                                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |                                           |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       | Lower Upper                               |
| c14                      | Equal variances assumed     | .335                                    | .594 | -2.055                       | 4     | .109            | -.29000         | .14115                | -.68188 .10188                            |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.055                       | 3.817 | .112            | -.29000         | .14115                | -.68942 .10942                            |
| c16                      | Equal variances assumed     | .915                                    | .393 | -.162                        | 4     | .879            | -.04333         | .26710                | -.78493 .69827                            |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.162                        | 3.133 | .881            | -.04333         | .26710                | -.87339 .78673                            |
| c18                      | Equal variances assumed     | 8.557                                   | .043 | .980                         | 4     | .383            | .45333          | .46276                | -.83149 1.73815                           |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .980                         | 2.212 | .422            | .45333          | .46276                | -1.36556 2.27222                          |
| c20                      | Equal variances assumed     | .040                                    | .852 | -.391                        | 4     | .715            | -.18000         | .45977                | -1.45653 1.09653                          |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.391                        | 3.973 | .716            | -.18000         | .45977                | -1.45999 1.09999                          |
| c22                      | Equal variances assumed     | 3.748                                   | .125 | -3.245                       | 4     | .032            | -1.03000        | .31744                | -1.91135 -.14865                          |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.245                       | 2.596 | .058            | -1.03000        | .31744                | -2.13523 .07523                           |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 8.384                                   | .044 | -.753                        | 4     | .493            | -.38000         | .50463                | -1.78109 1.02109                          |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.753                        | 2.003 | .530            | -.38000         | .50463                | -2.54782 1.78782                          |
| C161                     | Equal variances assumed     | .641                                    | .468 | -2.061                       | 4     | .108            | -.60000         | .29115                | -1.40835 .20835                           |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.061                       | 3.328 | .122            | -.60000         | .29115                | -1.47702 .27702                           |
| C181                     | Equal variances assumed     | .594                                    | .484 | 3.874                        | 4     | .018            | 1.07333         | .27703                | .30418 1.84249                            |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.874                        | 3.403 | .024            | 1.07333         | .27703                | .24793 1.89874                            |
| C201                     | Equal variances assumed     | 10.251                                  | .033 | 3.380                        | 4     | .028            | 3.09333         | .91517                | .55240 5.63427                            |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.380                        | 2.119 | .071            | 3.09333         | .91517                | -.63990 6.82656                           |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | 1.331                                   | .313 | 4.737                        | 4     | .009            | 2.93333         | .61918                | 1.21423 4.65244                           |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 4.737                        | 2.927 | .019            | 2.93333         | .61918                | .93459 4.93207                            |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | 7.410                                   | .053 | -.951                        | 4     | .395            | -.40333         | .42394                | -1.58037 .77370                           |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.951                        | 2.181 | .435            | -.40333         | .42394                | -2.09002 1.28335                          |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 13.072                                  | .022 | 1.004                        | 4     | .372            | 1.20667         | 1.20222               | -2.13124 4.54458                          |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.004                        | 2.028 | .420            | 1.20667         | 1.20222               | -3.89856 6.31190                          |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | 2.516                                   | .188 | -.529                        | 4     | .625            | -.20000         | .37824                | -1.25017 .85017                           |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.529                        | 2.407 | .642            | -.20000         | .37824                | -1.59029 1.19029                          |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | .178                                    | .695 | -2.009                       | 4     | .115            | -.41000         | .20410                | -.97666 .15666                            |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.009                       | 3.657 | .122            | -.41000         | .20410                | -.99829 .17829                            |
| C184n3                   | Equal variances assumed     | 16.000                                  | .016 | -1.000                       | 4     | .374            | -1.19667        | 1.19667               | -4.51915 2.12581                          |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.000                       | 2.000 | .423            | -1.19667        | 1.19667               | -6.34551 3.95217                          |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | 8.465                                   | .044 | 4.388                        | 4     | .012            | 1.22667         | .27954                | .45053 2.00280                            |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 4.388                        | 2.178 | .041            | 1.22667         | .27954                | .11329 2.34004                            |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | 14.572                                  | .019 | 1.437                        | 4     | .224            | 1.88333         | 1.31032               | -1.75470 5.52137                          |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.437                        | 2.008 | .287            | 1.88333         | 1.31032               | -3.73364 7.50031                          |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | .341                                    | .591 | -5.923                       | 4     | .004            | -3.31333        | .55939                | -4.86646 -1.76021                         |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -5.923                       | 3.813 | .005            | -3.31333        | .55939                | -4.89697 -1.72970                         |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | .060                                    | .819 | -5.409                       | 4     | .006            | -1.85333        | .34265                | -2.80469 -.90198                          |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -5.409                       | 3.975 | .006            | -1.85333        | .34265                | -2.80703 -.89964                          |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | .947                                    | .386 | -11.619                      | 4     | .000            | -2.66333        | .22923                | -3.29977 -2.02690                         |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -11.619                      | 3.033 | .001            | -2.66333        | .22923                | -3.38842 -1.93825                         |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | .154                                    | .715 | -11.572                      | 4     | .000            | -2.55667        | .22093                | -3.17007 -1.94326                         |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -11.572                      | 3.925 | .000            | -2.55667        | .22093                | -3.17472 -1.93861                         |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | .105                                    | .762 | -10.870                      | 4     | .000            | -2.48333        | .22845                | -3.11761 -1.84906                         |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -10.870                      | 3.857 | .000            | -2.48333        | .22845                | -3.12696 -1.83970                         |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 1.940                                   | .236 | -2.390                       | 4     | .075            | -.98333         | .41135                | -2.12543 .15877                           |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.390                       | 2.756 | .104            | -.98333         | .41135                | -2.36038 .39371                           |
| DHAEPFA                  | Equal variances assumed     | 5.094                                   | .087 | 3.813                        | 4     | .019            | 2.58000         | .67663                | .70139 4.45861                            |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.813                        | 2.519 | .043            | 2.58000         | .67663                | .17421 4.98579                            |



ตารางภาคผนวกที่ 55 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของกรดไขมันระหว่างกึ่งการดูด (H. picta) ระยะลงเกาะที่แข็งแรงและอ่อนแอจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี T-test

| Independent Samples Test |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |           |                                           |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--|
|                          |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |       |                 |                 |                       |           | 95% Confidence Interval of the Difference |  |
|                          |                             |                                         |      |                              |       |                 |                 |                       |           |                                           |  |
|                          |                             | F                                       | Sig. | t                            | df    | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower     | Upper                                     |  |
| c14                      | Equal variances assumed     | 1.923                                   | .238 | 1.958                        | 4     | .122            | .88667          | .45274                | -.37035   | 2.14369                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.958                        | 2.363 | .169            | .88667          | .45274                | -.80070   | 2.57403                                   |  |
| c16                      | Equal variances assumed     | 5.104                                   | .087 | 1.701                        | 4     | .164            | 1.75000         | 1.02896               | -1.10686  | 4.60686                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.701                        | 2.059 | .228            | 1.75000         | 1.02896               | -2.55760  | 6.05760                                   |  |
| c18                      | Equal variances assumed     | 7.491                                   | .052 | .680                         | 4     | .534            | .40000          | .58866                | -1.23439  | 2.03439                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .680                         | 2.271 | .559            | .40000          | .58866                | -1.86417  | 2.66417                                   |  |
| c20                      | Equal variances assumed     | 6.377                                   | .065 | .314                         | 4     | .769            | 1.37000         | 4.35819               | -10.73029 | 13.47029                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .314                         | 2.442 | .778            | 1.37000         | 4.35819               | -14.47921 | 17.21921                                  |  |
| c22                      | Equal variances assumed     | 1.074                                   | .359 | 1.114                        | 4     | .328            | .38333          | .34396                | -.57166   | 1.33833                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.114                        | 3.241 | .341            | .38333          | .34396                | -.66664   | 1.43331                                   |  |
| TSFA                     | Equal variances assumed     | 3.078                                   | .154 | 2.704                        | 4     | .054            | 2.64667         | .97871                | -.07067   | 5.36401                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.704                        | 2.190 | .103            | 2.64667         | .97871                | -1.23362  | 6.52695                                   |  |
| C161                     | Equal variances assumed     | 14.802                                  | .018 | -4.559                       | 4     | .010            | -1.21667        | .26685                | -1.95757  | -.47576                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -4.559                       | 2.006 | .045            | -1.21667        | .26685                | -2.36177  | -.07157                                   |  |
| C181                     | Equal variances assumed     | 6.827                                   | .059 | -3.515                       | 4     | .025            | -3.61333        | 1.02801               | -6.46756  | -.75911                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.515                       | 2.365 | .056            | -3.61333        | 1.02801               | -7.44276  | .21609                                    |  |
| C201                     | Equal variances assumed     | 2.563                                   | .185 | .679                         | 4     | .534            | 1.11333         | 1.63852               | -3.43593  | 5.66260                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .679                         | 2.366 | .557            | 1.11333         | 1.63852               | -4.98756  | 7.21422                                   |  |
| TMUFA                    | Equal variances assumed     | .022                                    | .889 | -3.042                       | 4     | .038            | -2.59000        | .85131                | -4.95360  | -.22640                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.042                       | 3.996 | .038            | -2.59000        | .85131                | -4.95464  | -.22536                                   |  |
| C182n6                   | Equal variances assumed     | 8.236                                   | .045 | -2.566                       | 4     | .062            | -.92667         | .36112                | -1.92931  | .07598                                    |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -2.566                       | 2.229 | .112            | -.92667         | .36112                | -2.33719  | .48385                                    |  |
| C204n6                   | Equal variances assumed     | 14.558                                  | .019 | -1.989                       | 4     | .118            | -2.69667        | 1.35573               | -6.46078  | 1.06745                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -1.989                       | 2.000 | .185            | -2.69667        | 1.35573               | -8.52991  | 3.13658                                   |  |
| Tn6PUFA                  | Equal variances assumed     | 1.018                                   | .370 | -3.296                       | 4     | .030            | -1.40667        | .42678                | -2.59161  | -.22172                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -3.296                       | 3.554 | .036            | -1.40667        | .42678                | -2.65262  | -.16072                                   |  |
| SUMn4                    | Equal variances assumed     | .153                                    | .716 | 2.624                        | 4     | .059            | .93667          | .35701                | -.05455   | 1.92788                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.624                        | 3.890 | .060            | .93667          | .35701                | -.06570   | 1.93904                                   |  |
| C184n3                   | Equal variances assumed     | 5.679                                   | .076 | .596                         | 4     | .583            | 2.77000         | 4.64942               | -10.13886 | 15.67886                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | .596                         | 2.525 | .600            | 2.77000         | 4.64942               | -13.73107 | 19.27107                                  |  |
| C203n3                   | Equal variances assumed     | .216                                    | .667 | -.240                        | 4     | .822            | -.73667         | 3.06649               | -9.25060  | 7.77727                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.240                        | 3.901 | .822            | -.73667         | 3.06649               | -9.33686  | 7.86352                                   |  |
| C204n3                   | Equal variances assumed     | 4.296                                   | .107 | -26.511                      | 4     | .000            | -4.28667        | .16169                | -4.73560  | -3.83774                                  |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -26.511                      | 2.000 | .001            | -4.28667        | .16169                | -4.98237  | -3.59096                                  |  |
| C205n3                   | Equal variances assumed     | .445                                    | .541 | -.011                        | 4     | .992            | -.01000         | .90085                | -2.51115  | 2.49115                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | -.011                        | 3.780 | .992            | -.01000         | .90085                | -2.56973  | 2.54973                                   |  |
| C226n3                   | Equal variances assumed     | .649                                    | .465 | 3.657                        | 4     | .022            | 2.97333         | .81311                | .71578    | 5.23088                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 3.657                        | 3.583 | .026            | 2.97333         | .81311                | .60832    | 5.33835                                   |  |
| Tn3PUFA                  | Equal variances assumed     | .795                                    | .423 | 1.619                        | 4     | .181            | 3.05000         | 1.88437               | -2.18185  | 8.28185                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.619                        | 3.373 | .194            | 3.05000         | 1.88437               | -2.58889  | 8.68889                                   |  |
| TPUFA                    | Equal variances assumed     | .998                                    | .374 | 1.359                        | 4     | .246            | 2.21667         | 1.63065               | -2.31075  | 6.74408                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.359                        | 3.206 | .262            | 2.21667         | 1.63065               | -2.78910  | 7.22243                                   |  |
| THUFA                    | Equal variances assumed     | .254                                    | .641 | 1.730                        | 4     | .159            | 1.83333         | 1.05947               | -1.10823  | 4.77490                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.730                        | 3.651 | .165            | 1.83333         | 1.05947               | -1.22243  | 4.88909                                   |  |
| n3n6                     | Equal variances assumed     | 2.028                                   | .228 | 2.165                        | 4     | .096            | 3.24667         | 1.49938               | -.91628   | 7.40962                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 2.165                        | 2.999 | .119            | 3.24667         | 1.49938               | -1.52561  | 8.01895                                   |  |
| DHAEPa                   | Equal variances assumed     | 1.430                                   | .298 | 1.990                        | 4     | .117            | 1.46000         | .73357                | -.57671   | 3.49671                                   |  |
|                          | Equal variances not assumed |                                         |      | 1.990                        | 3.324 | .132            | 1.46000         | .73357                | -.75078   | 3.67078                                   |  |