

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ (Descriptive Correlation Research) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชาย ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธ์ภาพระหว่างคู่สมรส กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุชายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สถานภาพสมรสคู่ และพำนักอยู่ด้วยกันกับคู่สมรส ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จังหวัดอ่างทอง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการวิจัยด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 126 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งผลการวิจัยนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยายแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุชาย ได้แก่ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ และโรคประจำตัว แสดงไว้ในตารางที่ 1

ส่วนที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของคะแนน และระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธ์ภาพระหว่างคู่สมรส รายชื่อและโดยรวม แสดงไว้ในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 6

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรร ได้แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธ์ภาพระหว่างคู่สมรสกับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ แสดงไว้ในตารางที่ 7

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรคือ พิจารณาระดับการวัดของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม กลุ่มตัวอย่างมีการสุ่มมาจากประชากร ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Relationship) ตรวจสอบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีลักษณะปกติ (Homoscedasticity) และตรวจสอบการกระจายของตัวแปร ทดสอบโดยการทำ Histogram, Stem and Leaf Plot, Box Plots, สถิติ Kolmogorov-smirnov และค่า Fisher's Skewness Coefficient & Fisher's Kurtosis Coefficient พบว่า คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 16 ราย มีคะแนนสูงหรือต่ำไปจากกลุ่มตัวอย่างโดยทั่วไป โดยกลุ่มตัวอย่าง 13 ราย มีคะแนน $< 3SD$ และกลุ่มตัวอย่าง 3 ราย มีคะแนน $> 3SD$ ซึ่งคะแนนที่สูงหรือต่ำมากมีผลทำให้ผลการทดสอบการกระจายของข้อมูลไม่เป็นไปตามปกติ มีข้อมูลที่เป็น Outliers ผู้วิจัยได้ทดลองตัดกลุ่มตัวอย่าง 16 รายนี้ออกจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า ผล Normal Distribution เป็นปกติ ไม่มีข้อมูลที่เป็น Outliers ผู้วิจัยจึงตัด

กลุ่มตัวอย่าง 16 รายนี้ออกจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 126 ราย เหลือ 110 ราย แล้วนำแบบสอบถามที่เหลือ 110 ชุด ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Science for Window Version 17.0) ได้ผลการวิเคราะห์ซึ่งสามารถอธิบายในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุชายได้แก่ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ โรคประจำตัว วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยการหาความถี่ ร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ($n = 110$)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
อายุ ($M = 67.59, SD = 4.88$)		
60-65 ปี	41	37.30
66-70 ปี	35	31.80
มากกว่า 70 ปี	34	30.90
รวม	110	100.00
ศาสนา		
พุทธ	110	100
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	2	1.80
ประถมศึกษา	97	88.20
มัธยมศึกษาตอนต้น	8	7.30
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา	3	2.70
รวม	110	100.00

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพ		
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	27	24.50
รับจ้างทั่วไป	31	28.20
เกษตรกร	50	45.50
ข้าราชการบำนาญ	2	1.80
รวม	110	100.00
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ($M = 4,112.43$, $SD = 3306.61$)		
น้อยกว่า 2,501 บาท		
2,501-5,000 บาท	50	45.50
มากกว่า 5,000 บาท	28	25.50
รวม	110	100.00
ความเพียงพอของรายได้		
เพียงพอ	70	63.60
ไม่เพียงพอ	40	36.40
รวม	110	100.00
โรคประจำตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
ความดันโลหิตสูง	32	29.10
เบาหวาน	19	17.30
ไขมันในเลือดสูง	9	8.20
ต่อมลูกหมากโต	2	1.80
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ	13	11.80
อื่น ๆ	55	50.00
รวม	130	100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60-65 ปี (ร้อยละ 37.30) อายุเฉลี่ย 67.59 ปี ($SD = 4.88$) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 88.20) มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 45.50) รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 28.20)

มีรายได้ระหว่าง 2,501-5,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 45.50) รายได้เฉลี่ย 4,112.43 บาทต่อเดือน ($SD = 3306.61$) มีรายได้เพียงพอ (ร้อยละ 63.60) มีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 29.10) เบาหวาน (ร้อยละ 17.30) และภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ร้อยละ 11.80)

ส่วนที่ 2 จำนวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของคะแนน และระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ทศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส รายชื่อและโดยรวม แสดงไว้ในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 6

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ทศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ($n = 110$)

ตัวแปร	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์	41.79	14.35	ปานกลาง
ทศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์	48.26	5.44	ปานกลาง
สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส	45.64	6.75	ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 41.79 ($SD = 14.35$) จากคะแนนรวม 75 คะแนน มีทศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 48.26 ($SD = 5.44$) จากคะแนนรวม 85 คะแนน และมีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 45.64 ($SD = 6.75$) จากคะแนนรวม 60 คะแนน

ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของการรับรู้ภาวะสุขภาพ ($n = 110$)

ระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ	จำนวน	ร้อยละ
ดีมาก	15	13.60
ดี	36	32.70
พอใช้	54	49.20
ไม่ดี	5	4.50
คะแนนเฉลี่ย 2.55	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78	

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 49.20) รองลงมาอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 32.70)

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์รายข้อ จากค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ($n = 110$)

ความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์	<i>M</i>	<i>SD</i>
1. ท่านพึงพอใจที่การมีกิจกรรมทางเพศทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	2.99	1.06
2. ท่านพึงพอใจที่การมีกิจกรรมทางเพศทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตคู่	2.98	1.13
3. ท่านพึงพอใจที่การมีกิจกรรมทางเพศทำให้เกิดความรักและความผูกพันระหว่างท่านกับคู่สมรส	2.95	1.07
4. ท่านพึงพอใจการมีกิจกรรมทางเพศอย่างปลอดภัยกับคู่สมรสเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	2.95	1.19
5. ท่านพึงพอใจและมีความสุขเมื่อจับมือหรือหอมแก้มคู่สมรส	2.93	1.03
6. ท่านพึงพอใจในสมรรถภาพทางเพศและสามารถให้ความสุขทางเพศกับสมรสได้	2.81	1.09
7. ท่านพึงพอใจเมื่อคู่สมรสยอมรับในการแสดงออกทางเพศของท่าน	2.79	1.11
8. ท่านพึงพอใจเมื่อได้แสดงความรักโดยการโอบกอดคู่สมรส	2.78	1.11
9. ท่านพึงพอใจและมีความสุขจากการมีกิจกรรมทางเพศกับคู่สมรส	2.78	1.19
10. ท่านพึงพอใจเมื่อคู่สมรสให้ความสำคัญในการมีกิจกรรมทางเพศกับท่าน	2.76	1.09
11. ท่านพึงพอใจเมื่อถึงจุดสุดยอดจากการมีกิจกรรมทางเพศกับคู่สมรส	2.75	1.24
12. ท่านพึงพอใจเมื่อคู่สมรสสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศของท่านได้	2.74	1.22
13. ท่านพึงพอใจเมื่อได้พูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผยกับคู่สมรส	2.59	1.15
14. ท่านพึงพอใจการเล่าโลมคู่สมรสก่อนการร่วมเพศ	2.55	1.13
15. ท่านพึงพอใจในการนึกคิดหรือสร้างภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์เพศ	2.43	1.10
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ (75 คะแนน)	41.79	14.35

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ พึงพอใจที่การมีกิจกรรมทางเพศทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ($M = 2.99$, $SD = 1.06$) รองลงมาคือ พึงพอใจที่การมีกิจกรรมทางเพศทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตคู่ ($M = 2.98$, $SD = 1.13$) และพึงพอใจที่การมีกิจกรรมทางเพศทำให้เกิดความรัก

และความผูกพันระหว่างท่านกับคู่สมรส ($M = 2.95, SD = 1.07$) ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับท้าย คือ พึงพอใจในการนึกคิดหรือสร้างภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์เพศ ($M = 2.43, SD = 1.10$) พึงพอใจการเล้าโลมคู่สมรสก่อนการร่วมเพศ ($M = 2.55, SD = 1.13$) และพึงพอใจเมื่อได้พูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผยกับคู่สมรส ($M = 2.59, SD = 1.15$) ตามลำดับ

ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์รายชื่อ จากค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ($n = 110$)

ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์	<i>M</i>	<i>SD</i>
1. หอยนางรม สุรา และ โสมต่าง ๆ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ	3.47	1.03
2. การเกิดความเจ็บปวดขณะมีกิจกรรมทางเพศเป็นอาการบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สูงอายุ	3.11	.97
3. การมีความสุขจากการสัมผัสเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับผู้สูงอายุ	3.01	1.00
4. การเกิดความเจ็บปวดขณะมีกิจกรรมทางเพศในผู้สูงอายุเป็นอาการบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องเพศ*	3.01	1.03
5. การที่ผู้สูงอายุปรึกษาเรื่องเพศกับบุคคลอื่นเป็นเรื่องน่าอาย	3.01	1.16
6. เมื่อมีการหลั่งน้ำอสุจิลดลงในผู้สูงอายุแสดงว่าความสามารถในกิจกรรมทางเพศลดลง*	2.99	.97
7. ความสนใจเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ผิดปกติสำหรับผู้สูงอายุ	2.96	1.01
8. องคชาติแข็งตัวไม่ดีพอเป็นอาการบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สูงอายุ	2.94	1.03
9. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวควรหยุดการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศ	2.93	1.23
10. การพูดถึงเรื่องเพศในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ควรปกปิดไม่ควรพูดถึงอย่างเปิดเผย	2.87	1.17
11. การแต่งงานใหม่หลังจากสูญเสียคู่สมรสเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สูงอายุ*	2.86	1.10
12. ผู้สูงอายุชายที่มีคู่นอนอายุน้อยกว่าจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ	2.85	.99
13. ผู้สูงอายุชายเมื่อถึงจุดสุดยอดจะมีความสุขไม่เต็มที่เหมือนวัยหนุ่ม	2.84	.91
14. ผู้สูงอายุควรสนใจเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น	2.51	1.17
15. ผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์ 2-3 ครั้งต่อเดือน*	2.48	.95
16. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องธรรมดาในผู้สูงอายุ *	2.25	.99
17. การมีบุตรในวัยสูงอายุเป็นเรื่องธรรมดา *	2.17	1.16
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนนทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ (85 คะแนน)	48.26	5.44

*ข้อความทางบวก

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หอยนางรม สุรา และ โสมต่าง ๆ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ($M = 3.47$, $SD = 1.03$) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าหอยนางรม สุรา และ โสมต่าง ๆ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รองลงมาคือ การเกิดความเจ็บปวดขณะมีกิจกรรมทางเพศเป็นอาการบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สูงอายุ ($M = 3.11$, $SD = .97$) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าการเกิดความเจ็บปวดขณะมีกิจกรรมทางเพศเป็นอาการบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สูงอายุ และการมีความสุขจากการสัมผัสเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับผู้สูงอายุ ($M = 3.01$, $SD = 1.00$) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าการมีความสุขจากการสัมผัสเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับผู้สูงอายุ ตามลำดับ ส่วนทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับท้าย คือ การมีบุตรในวัยสูงอายุเป็นเรื่องธรรมดา ($M = 2.17$, $SD = 1.16$) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าการมีบุตรในวัยสูงอายุเป็นเรื่องธรรมดา การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องธรรมชาติในผู้สูงอายุ ($M = 2.25$, $SD = .99$) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องธรรมชาติในผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์ 2-3 ครั้งต่อเดือน ($M = 2.48$, $SD = .95$) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์ 2-3 ครั้งต่อเดือน ตามลำดับ

ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสรายข้อ จากค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ($n = 110$)

สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส	<i>M</i>	<i>SD</i>
1. ท่านและคู่สมรสมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในครอบครัว*	3.40	.71
2. ท่านและคู่สมรสมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน*	3.28	.81
3. ท่านและคู่สมรสให้ความรักความห่วงใยต่อกัน*	3.28	.83
4. คู่สมรสสนใจเอาใจใส่ในความทุกข์ร้อนของท่าน*	3.27	.80
5. ท่านและคู่สมรสให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันได้ในทุก ๆ เรื่อง*	3.22	.70
6. คู่สมรสสามารถเข้ากันได้กับญาติของท่าน*	3.20	.79
7. ท่านและคู่สมรสมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตสอดคล้องกัน*	3.15	.71
8. ท่านคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสเป็นการทำตามหน้าที่เท่านั้น	3.15	.87
9. ท่านและคู่สมรสมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตร่วมกัน*	3.08	.81

ตารางที่ 6 (ต่อ)

สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส	<i>M</i>	<i>SD</i>
10. ท่านมีความพึงพอใจอุปนิสัยของคู่สมรส*	3.05	.77
11. ท่านและคู่สมรสมีความคิดเห็นตรงกัน*	3.00	.69
12. ท่านและคู่สมรสมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน*	2.95	.77
13. ท่านและคู่สมรสมีความขัดแย้งในเรื่องเพศสัมพันธ์	2.95	.77
14. ท่านรู้สึกหงุดหงิดเมื่อคู่สมรสซักถามปัญหาของท่าน	2.76	.80
15. ท่านไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างของคู่สมรส	2.69	.67
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนนสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส (60 คะแนน)	45.64	6.75

*ข้อความทางบวก

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ท่านและคู่สมรสมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในครอบครัว ($M = 3.40, SD = .71$) รองลงมาคือ ท่านและคู่สมรสมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ($M = 3.28, SD = .81$) และท่านและคู่สมรสให้ความรักความห่วงใยต่อกัน ($M = 3.28, SD = .83$) ตามลำดับ ส่วนสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับท้าย คือ ท่านไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างของคู่สมรส ($M = 2.69, SD = .67$) ท่านรู้สึกหงุดหงิดเมื่อคู่สมรสซักถามปัญหาของท่าน ($M = 2.76, SD = .80$) และท่านและคู่สมรสมีความขัดแย้งในเรื่องเพศสัมพันธ์ ($M = 2.95, SD = .77$) ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรร ได้แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ทักษะคิดเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสกับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ แสดงไว้ในตารางที่ 7

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชายในงานวิจัยนี้มี 3 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ทักษะคิดเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ซึ่งปัจจัยด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพที่มีระดับการวัดเป็นมาตราอันดับ (Ordinal Scale) วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์ (Spearman's Rank Order Correlation Coefficients) ส่วนปัจจัยด้านทักษะคิดเรื่องเพศสัมพันธ์ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficients)

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ ทศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ และ สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสกับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชาย ($n = 110$)

ตัวแปร	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	
	r	r_s
การรับรู้ภาวะสุขภาพ		.336**
ทศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์	.290**	
สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส	-.197*	

** $p < .01$ (2-tailed)

* $p < .05$ (2-tailed)

r ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ตารางที่ 7 พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ($r = .336$) และทศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ($r = .290$) ส่วนสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = -.197$)