
ผลของความเค็มและไนไตรท์ต่อค่าออสโมลาลิตีของเลือด และการดูดซึมไนไตรท์เข้าสู่กระแสเลือด
ของกุ้งขาวแวนนาไม

Effects of Salinity and Nitrite on Hemolymph Osmolality and Nitrite Uptake of
Hemolymph of White- Leg Shrimp, *Litopenaeus vannamei* Boone, 1931

นนนุช ตั้งเกริกโอฬาร* และ กฤษดา ทองเทียม

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Nongnud Tangkrock-olan* and Kridsada Thongtiam

Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University

บทคัดย่อ

ทำการศึกษาผลของความเค็มและไนไตรท์ต่อค่าออสโมลาลิตีของเลือดและการดูดซึมไนไตรท์เข้าสู่กระแสเลือดของกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ใช้ทดลองมีน้ำหนักเฉลี่ย 12.42 ± 1.69 กรัม และความยาวเฉลี่ย 11.25 ± 0.78 เซนติเมตร ทำการทดลองโดยเลี้ยงกุ้งขาวในน้ำที่มีความเค็ม 4 ระดับคือ 5, 10, 20 และ 30 ppt และมีความเข้มข้นไนไตรท์ในน้ำเท่ากับ 40 ppm ทำการวัดค่าออสโมลาลิตี และปริมาณไนไตรท์ในเลือดที่เวลา 24, 48 และ 96 ชั่วโมง พบว่าค่า ออสโมลาลิตี มีค่าเพิ่มขึ้นตามความเค็มของน้ำที่เพิ่มมากขึ้น ที่ความเค็ม 5 ppt ค่าออสโมลาลิตีของกลุ่มควบคุมมีค่าสูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($P < 0.05$) โดยมีค่าออสโมลาลิตี เท่ากับ 579 ± 7 และ 515 ± 22 mOsm/kg ที่เวลา 48 ชั่วโมง และเท่ากับ 580 ± 4 และ 509 ± 22 mOsm/kg ตามลำดับ ที่เวลา 96 ชั่วโมง ส่วนการสะสมไนไตรท์ในเลือดพบว่าไนไตรท์มีการสะสมมากที่สุดที่ความเค็ม 5 ppt และเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลามากขึ้นปริมาณการสะสมไนไตรท์จะลดลงเมื่อความเค็มน้ำสูงขึ้น ปริมาณไนไตรท์ในเลือดที่เวลา 96 ชั่วโมง เท่ากับ 20.74 ± 2.226 , 13.50 ± 1.86 , 4.57 ± 1.54 และ 2.98 ± 1.08 ppm ที่ความเค็ม 5, 10, 20 และ 30 ppt ตามลำดับ ซึ่งที่ความเค็ม 5 และ 10 ppt มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) แต่ที่ความเค็ม 20 และ 30 ppt ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) จากการศึกษาเป็นไปได้อย่างไรการเลี้ยงกุ้งที่ความเค็มต่ำจะมีโอกาสประสบปัญหาความเป็นพิษจากไนไตรท์มากกว่าการเลี้ยงกุ้งที่ระดับความเค็มสูง

คำสำคัญ : ความเค็ม ไนไตรท์ ออสโมลาลิตีของเลือด กุ้งขาวแวนนาไม

Corresponding author. Email: nongnud@buu.ac.th

Abstract

Hemolymph osmolality and nitrite uptake to hemolymph of white-leg shrimp (*Litopenaeus vannamei*) were studied. The average body weight and length of shrimps used in this experiment were 12.42 ± 1.69 g and 11.25 ± 0.78 cm, respectively. The white-leg shrimps were reared in four different salinities (5, 10, 20 and 30 ppt) with the concentration of nitrite at 40 ppm in each salinity. Osmolalities of hemolymph and nitrite uptake to hemolymph were measured at 24, 48 and 96 hour. The result showed that osmolality of hemolymph increased with salinities. At 5 ppt, the osmolality at 48 hour and 96 hour of the control group (579 ± 7 and 580 ± 4 mOsm/kg, respectively) were significantly higher than that of the experimental groups (515 ± 22 and 509 ± 22 mOsm/kg respectively) ($P < 0.05$). The result on nitrite uptake to hemolymph showed that the highest concentration of nitrite in hemolymph was at 5 ppt. The hemolymph nitrite increased with times but decreased with increasing salinities. At 96 hour, the hemolymph nitrite levels were 20.74 ± 2.26 , 13.50 ± 1.86 , 4.57 ± 1.54 and 2.98 ± 1.08 ppm at salinities of 5, 10, 20 and 30 ppt, respectively. Hemolymph nitrite levels at 5 ppt and 10 ppt were significantly different ($P < 0.05$); however, at 20 ppt and 30 ppt the hemolymph nitrite levels were not significantly different ($P > 0.05$). It is possible that culturing of white-leg shrimp at low salinity may encounter more toxicity from nitrite than those of culturing at high salinity.

Keywords : salinity, nitrite, hemolymph, osmolality, white-leg shrimp, *Litopenaeus vannamei*

กุ้งขาวแวนนาไม (*Litopenaeus vannamei*) เป็นสายพันธุ์ กุ้งทะเลในกลุ่มกุ้งขาวแปซิฟิก มีการแพร่กระจายตามชายฝั่ง ทะเลของประเทศเม็กซิโก จนถึงชายฝั่งทะเลของประเทศเปรู ลูกกุ้งวัยอ่อนจะอาศัยอยู่บริเวณน้ำตื้นชายฝั่งใกล้ปากแม่น้ำ หรือป่าชายเลน เมื่อโตเต็มที่จะกลับทะเลเพื่อสืบพันธุ์ กุ้งขาวแวนนาไมมีความแข็งแรง เจริญเติบโตรวดเร็ว มีความต้านทานโรคสูง และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ได้ในช่วงกว้าง ซึ่งทำให้มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายใน หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก คอสตาริกา เปรู โคลัมเบีย (Tseng, 1988) สำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ใน เอเชียเริ่มเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2539 โดยไต้หวันเป็นประเทศแรก ที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวชนิดนี้ (Briggs *et al.*, 2004) สำหรับ ในประเทศไทย เริ่มมีการนำกุ้งขาวชนิดนี้มาเลี้ยงในปี 2541 (Senanan *et al.*, 2007) แต่เนื่องจากการจัดหาพันธุ์กุ้งขณะนั้น มีความยากลำบากและมีราคาแพง ทำให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจ เท่าที่ควร แต่ต่อมากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำตกต่ำและประสบปัญหา การเลี้ยงไม่โต กุ้งขาวแวนนาไมจึงได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง และปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย

ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนามีการปล่อยกุ้งที่ระดับ ความหนาแน่นสูงและเลี้ยงในความเค็มที่ต่ำ มีการให้อาหาร ในปริมาณมาก ทำให้ในบ่อเลี้ยงกุ้งมีปริมาณเศษอาหารที่เหลือ และของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของกุ้งเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะสารประกอบไนโตรเจนที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการสะสม แอมโมเนียในปริมาณที่ค่อนข้างสูง ซึ่งแอมโมเนียเป็นสารที่ไม่คงตัว สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนไตรท์ และไนเตรทได้ตามกระบวนการ ไนตริฟิเคชัน (nitrification) ไนไตรท์ซึ่งเป็นผลผลิตขั้นกลาง (intermediate product) จะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำอย่างมาก (สิริ ทุกชวีนาศ, 2528 และอุษา ลีประเสริฐ, 2530) โดยจะเข้าไปจับ กับเม็ดเลือดของสัตว์น้ำซึ่งทำให้เม็ดเลือดอยู่ในรูปที่ไม่สามารถ รับออกซิเจนส่งไปให้เซลล์ต่างๆ ของร่างกายได้ ทำให้ออกซิเจน ออกซิเจนและตายในที่สุด (Armstrong *et al.*, 1976) นอกจากนี้ การเลี้ยงกุ้งในน้ำที่มีความเค็มต่ำยังส่งผลต่อระบบควบคุม สมดุลน้ำและออสโมลิตี (osmolality) ของเลือดเปลี่ยนแปลงไป (Gardiner, 1972) กุ้งต้องมีการปรับสรีรวิทยาให้สามารถดำรงชีวิต

อยู่ได้ในน้ำที่มีความเค็มที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการปรับตัวดังกล่าว ทำให้กุ้งต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตมากกว่าปกติ ดังนั้นอาจ ส่งกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง (อรุณี พดุงขวัญ, 2544) โดยเฉพาะกุ้งที่เลี้ยงในบ่อที่มีความหนาแน่นสูง (Appelbaum *et al.*, 2002)

ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงผลของความเค็มและ ไนไตรท์ต่อการเปลี่ยนแปลงค่าออสโมลิตีและไนไตรท์ของเลือด ของกุ้งขาวแวนนาไม ข้อมูลที่ได้มาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของกุ้งขาวชนิดนี้ เพื่อเป็นประโยชน์และข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาคุณสมบัติ ของน้ำและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง

สัตว์ทดลอง

สัตว์ที่ใช้ในการทดลอง คือ กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด โตเต็มวัยจำนวน 240 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 12.42 ± 1.69 กรัม และความยาวเฉลี่ย 11.25 ± 0.78 เซนติเมตร โดยนำกุ้งมาจาก ฟาร์มเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี มาพักไว้ในถังไฟเบอร์กลาส บริเวณโรงเพาะฟัก ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กุ้งที่นำมาถูกเลี้ยงอยู่ในน้ำที่มีความเค็มประมาณ 18 ppt (ความเค็มน้ำที่ฟาร์ม) จากนั้นค่อย ๆ ปรับกุ้งให้อยู่ในความเค็ม 5, 10, 20, และ 30 ppt กุ้งจะถูกปล่อยให้ปรับสภาพ (acclimation) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในแต่ละความเค็ม ก่อนนำมาทำการทดลอง การเตรียมน้ำที่ใช้ในการทดลอง

นำน้ำทะเลจากบ่อเก็บน้ำเค็มของภาควิชาวาริชศาสตร์ ซึ่งมีความเค็มประมาณ 30 ppt มาทำการเจือจาง ให้ได้ความเค็ม 5, 10, 20 และ 30 ppt ตามลำดับ น้ำที่ระดับความเค็ม 5, 10, 20 และ 30 ppt ที่เตรียมได้นั้นจะถูกนำมาวัดค่าความเค็มโดย ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย ชนิดไอระเหย (Vapour pressure osmometer) ซึ่งค่าความเค็ม ของน้ำทะเลที่ได้จะมีหน่วยเป็นมิลลิออสโมลต่อกิโลกรัม (mOsm/kg) น้ำทะเลที่มีระดับความเค็มต่างๆ ที่เตรียมได้นี้ ส่วนหนึ่งจะถูก ใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อปรับสภาพ และอีกส่วนหนึ่งจะถูก นำมาเตรียมน้ำที่มีความเข้มข้นของไนไตรท์เท่ากับ 40 ppm สำหรับเลี้ยงกุ้งขาวในการทดลองเกี่ยวกับผลของความเค็ม และไนไตรท์ต่อออสโมลิตีและการดูดซึมไนไตรท์เข้าสู่ กระแสเลือดของกุ้งขาวต่อไป

การเลี้ยงกุ้งขาวในน้ำที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่มีความเข้มข้น ของไนไตรท์ 40 ppm

นำน้ำระดับความเค็มต่างๆ ที่เตรียมไว้มาเติมสารละลายไนโตรเจนในระดับความเข้มข้นที่กำหนด เพื่อให้ได้น้ำที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่มีความเข้มข้นของไนโตรเจน 40 ppm จากนั้นนำน้ำที่เตรียมได้ใส่ในขวดโหลแก้วขนาด 15 ลิตร ใส่ปุ๋ยในปริมาณ 5 ลิตร และใส่กุ้งขาว 3 ตัวต่อขวดโหล ทำการทดลองที่ความเค็ม 5, 10, 20 และ 30 ppt โดยทดลองความเค็มละ 10 ชั่วโมง พร้อมกับมีกลุ่มควบคุม (ไม่ใส่สารละลายไนโตรเจน) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ การทดลองนี้ใช้วิธีชีววิเคราะห์แบบกึ่งน้ำนิ่ง (semi-static bioassay) โดยเปลี่ยนน้ำทุก 24 ชั่วโมง ในปริมาณ 3 ใน 4 ส่วนของน้ำทั้งหมดแล้วเติมสารละลายไนโตรเจนที่ระดับความเข้มข้นที่กำหนดไว้เพื่อให้ น้ำที่ใช้ทดลองมีความเข้มข้นของไนโตรเจน 40 ppm ตลอดการทดลอง

การวัดค่าออสโมลาลิตีของเลือดของกุ้งขาว

นำกุ้งขาวที่เลี้ยงในน้ำที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่มีความเข้มข้นของไนโตรเจน 40 ppm และกลุ่มควบคุมมาทำการเจาะเลือดที่เวลา 24, 48 และ 96 ชั่วโมงตามลำดับ โดยทำการเจาะเลือดกุ้งที่บริเวณโคนขาเดินคู่ที่ 3 เมื่อได้เลือดแล้วใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง แล้วใช้ปิเปตต์โนมิตี ขนาด 10 ไมโครลิตร ดูดเลือดจากหลอดเก็บตัวอย่าง หยดลงในเครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลายชนิดไอระเหย อ่านค่าที่ได้จากเครื่อง ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าความเข้มข้นหรือค่าออสโมลาลิตีของเลือด จากนั้นนำน้ำทะเลที่ใช้เลี้ยงกุ้งขาวในแต่ละความเค็มมาวัดค่าความเข้มข้นเช่นเดียวกัน

การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ในเลือดของกุ้งขาว

นำเลือดกุ้งส่วนที่เหลือจากการวัดค่าออสโมลาลิตีมา 50 μ l ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่างหลอดใหม่ ทำการตกตะกอนโปรตีนในน้ำเลือดโดยการเติม 0.5 M TCA ในอัตราส่วน 1:3 (น้ำเลือด:TCA) หรือในปริมาณ 150 μ l นำไปปั่นแยกที่ความเร็ว 12,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสมา 50 μ l เจือจางด้วยน้ำกลั่น 100 เท่า หรือใส่น้ำกลั่นในปริมาตร 4.8 ml แล้วทำการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนเช่นเดียวกับการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในน้ำตามวิธีของ Strickland and parsons (1972) วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร นำผลที่ได้มาคำนวณหาปริมาณไนโตรเจนในเลือด

การวิเคราะห์ทางสถิติ

นำค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งที่วัดได้ที่ความเค็ม 5, 10, 20 และ 30 ppt ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใส่สารไนโตรเจนที่เวลา 96 ชั่วโมงมาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าออสโมลาลิตี

ของน้ำที่ใช้เลี้ยงและค่าออสโมลาลิตีของเลือด นำข้อมูลของค่าออสโมลาลิตีของกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใส่สารละลายไนโตรเจนในแต่ละความเค็มที่เวลา 24, 48 และ 96 ชั่วโมง มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนระหว่างกลุ่มด้วย ONE-WAY ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย Duncan's new Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรม SPSS for window

นำข้อมูลปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในเลือดของกุ้งขาว ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 20 และ 30 ppt. และที่เวลา 24, 48 และ 96 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบ จากนั้นหาความแตกต่างของไนโตรเจนในเลือดกุ้งที่ความเค็มต่างๆ เวลา 24, 48 และ 96 ชั่วโมง โดย ONE-WAY ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย Duncan's new Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรม SPSS for window


ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการศึกษาพบว่าระดับความเค็มของน้ำมีผลต่อความสามารถในการควบคุมสมดุลของเลือดของกุ้งขาวและส่งผลต่อการดูดซึมไนโตรเจนเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งสามารถเห็นได้จากค่าออสโมลาลิตีของเลือดและปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในเลือดของกุ้งที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นแตกต่างกัน โดยพบว่า ค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งในกลุ่มไนโตรเจนที่นั้นจะมีค่าลดลงมากกว่าค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งในกลุ่มควบคุมเมื่อระดับความเค็มน้ำมีค่าต่ำ ส่วนปริมาณไนโตรเจนในเลือดจะสะสมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นและการสะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อความเค็มลดลง

ค่าออสโมลาลิตีของเลือดของกุ้งขาว ที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่เวลา 24, 48 และ 96 ชั่วโมง

พบว่าค่าออสโมลาลิตีของเลือดของกุ้งขาวทั้งของกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใส่สารละลายไนโตรเจนของระดับความเค็มน้ำมีค่าออสโมลาลิตีที่ลดลงเมื่อความเค็มลดลง ซึ่งค่าออสโมลาลิตีของทุกกลุ่มทดลองมีแนวโน้มคงที่ตั้งแต่เวลาที่ 24 ชั่วโมง ดังนั้นค่าออสโมลาลิตีที่ 24, 48 และ 96 ชั่วโมง ของทุกกลุ่มทดลองจึงมีค่าไม่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามพบว่าค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งขาวในกลุ่มที่เลี้ยงในน้ำที่มีสารละลายไนโตรเจน ทุกระดับความเค็มมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งขาวในกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1

จากตารางจะเห็นว่าค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งขาวระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มไนโตรเจนที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 580 ± 14 และ 525 ± 43 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 5 ppt มีค่าเท่ากับ 638 ± 2 และ 618 ± 24 mOsm/kg ตามลำดับ



ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออสโมลาลิตีของน้ำที่ใช้ในการทดลองกับค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งขาวแวนนาไมที่เวลา 96 ชั่วโมง (● = กลุ่มควบคุม; ◆ = กลุ่มไนโตรท์)

ตารางที่ 1 ค่าออสโมลาลิตี (mOsm/kg) ของเลือดกุ้งขาวแวนนาไมที่ระดับความเค็มและเวลาต่างๆ กัน ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เลี้ยงในน้ำที่ใส่ไนโตรท์ความเข้มข้น 40 ppm

ออสโมลาลิตีของน้ำ (mOsm/kg)	เวลา (ชั่วโมง)	ออสโมลาลิตีของเลือดกุ้ง (mOsm/kg)	
		กลุ่มควบคุม	กลุ่มไนโตรท์
178 (5 ppt)	24	580±14	525±43
	48	579±7	515±22*
	96	581±4	509±22*
297 (10 ppt)	24	638±2	618±24
	48	604±5	600±12
	96	605±5	600±13
573 (20 ppt)	24	657±27	651±24
	48	665±31	660±11
	96	665±8	660±9
837 (30 ppt)	24	717±28	692±10
	48	716±38	693±28
	96	713±24	687±27

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * แสดงว่ามีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

ที่ระดับความเค็ม 10 ppt และมีค่าเท่ากับ 657 ± 27 , 651 ± 24 mOsm/kg ที่ระดับความเค็ม 20 ppt ตามลำดับ และมีค่าเท่ากับ 717 ± 28 และ 692 ± 10 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 30 ppt ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มไนโตรเจนในแต่ละความเค็ม

ที่เวลา 48 ชั่วโมง ค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งขาวระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มไนโตรเจนที่มีค่าเท่ากับ 579 ± 7 และ 515 ± 22 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 5 ppt มีค่าเท่ากับ 604 ± 5 และ 600 ± 12 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 10 ppt และมีค่าเท่ากับ 665 ± 31 , 660 ± 11 mOsm/kg ที่ระดับความเค็ม 20 ppt ตามลำดับ มีค่าเท่ากับ 716 ± 38 และ 693 ± 28 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 30 ppt ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ที่ 5 ppt กลุ่มควบคุมกับกลุ่มไนโตรเจนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ส่วนความเค็มอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน

ที่เวลา 96 ชั่วโมง ค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งขาวระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 581 ± 4 และ 509 ± 22 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 5 ppt มีค่าเท่ากับ 605 ± 5 และ 600 ± 13 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 10 ppt มีค่าเท่ากับ 665 ± 8 และ 660 ± 9 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 20 ppt และมีค่าเท่ากับ 713 ± 24 และ 687 ± 27 mOsm/kg ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 30 ppt ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ที่ 5 ppt กลุ่มควบคุมกับกลุ่มไนโตรเจนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ส่วนความเค็มอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน

Chen และ Lin (1994) ได้ทำการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวจีน *Penaeus chinensis* โดยปรับสภาพที่ 30 ppt เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการทดลองเลี้ยงในระดับความเค็มที่ 10, 20, 30, และ 40 ppt แล้วนำมาเจาะเลือดหาค่าออสโมลาลิตี ที่เวลา 1, 2, 5 และ 10 วัน พบว่าระดับความเค็มน้ำที่ใช้เลี้ยง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าออสโมลาลิตีในเลือดของกุ้ง *Penaeus chinensis* โดยที่ 25 ppt เป็นจุดสมดุลของความเข้มข้น (isoosmotic) ระหว่างเลือดของกุ้งและน้ำที่ใช้ในการเลี้ยง และกุ้ง *P. chinensis* จะปรับตัวเป็น hyper-osmotic regulation ที่ความเค็มต่ำกว่าจุด isoosmotic และจะปรับตัวเป็น hypo-osmotic regulation ที่ความเค็มสูงกว่าจุด isoosmotic ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในกุ้งขาวที่ได้ในครั้งนี้อยู่ โดยพบว่าระดับความเค็มน้ำที่ใช้เลี้ยงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า

ออสโมลาลิตีในเลือดของกุ้งขาว *Litopenaeus vannamei* เช่นเดียวกันโดยมีจุดสมดุลของความเข้มข้น (isoosmotic) ระหว่างเลือดของกุ้งและน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 650 mOsm/kg หรือประมาณ 23 ppt และกุ้งขาว *Litopenaeus vannamei* จะปรับตัวเป็น hyper-osmotic regulation ที่ความเค็มต่ำกว่าจุด isoosmotic และจะปรับตัวเป็น hypo-osmotic regulation ที่ความเค็มสูงกว่าจุด isoosmotic เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 1) สำหรับผลการศึกษาที่เกี่ยวกับความเป็นพิษของไนโตรเจนที่มีต่อความสามารถในการควบคุมสมดุลของของเหลวในกุ้งขาวพบว่า ที่ระดับความเค็มต่ำมากๆ ซึ่งจากการทดลองคือที่ระดับ 5 ppt นั้น กุ้งที่เลี้ยงในน้ำที่มีสารละลายไนโตรเจน 40 ppm จะมีความสามารถในการควบคุมความเข้มข้นของเลือดลดลงมากกว่ากุ้งที่เลี้ยงในน้ำที่ไม่มีสารละลายไนโตรเจน ดังเห็นได้จากความแตกต่างทางสถิติของค่าออสโมลาลิตีของเลือดกุ้งขาวระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใส่สารละลายไนโตรเจนที่ระดับความเค็ม 5 ppt ส่วนที่ระดับความเค็มอื่นๆ ที่สูงขึ้น นั้นไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเค็มที่ลดลงต่ำมากๆ เช่น ที่ระดับความเค็ม 5 ppt นั้น อาจเป็นความเค็มที่ต่ำเกินไป ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของกุ้งขาว ทำให้ร่างกายของกุ้งอ่อนแอลง และเมื่อมีไนโตรเจนละลายอยู่ในน้ำ อาจทำให้ไนโตรเจนแสดงความเป็นพิษต่อกุ้งขาวสูงกว่าปกติ ส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าปกติ

ปริมาณไนโตรเจนในเลือดกุ้งขาวที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่เวลา 24, 48 และ 96 ชั่วโมง


พบว่าระดับความเค็มน้ำที่ใช้ในการทดลอง แต่ละระดับมีผลต่อการดูดซึมไนโตรเจนไว้ในกระแสเลือดของกุ้งขาว ที่ความเค็มต่ำพบว่า มีการสะสมไนโตรเจนไว้ในกระแสเลือดมากกว่าที่ความเค็มสูงและจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยที่ระดับความเค็ม 5 ppt ที่ 96 ชั่วโมง มีการสะสมไนโตรเจนในเลือดมากที่สุด และที่ความเค็ม 30 ppt ที่ 24 ชั่วโมงมีการสะสมน้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 ภาพที่ 2

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าปริมาณไนโตรเจนในเลือดกุ้งขาวในกลุ่มควบคุมที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.38 ± 0.02 , 0.39 ± 0.38 , 0.46 ± 0.15 และ 0.37 ± 0.08 ppm ที่ความเค็ม 5, 10, 20 และ 30 ppt ตามลำดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน และจากการทดสอบทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P > 0.05$) ส่วนในกลุ่มที่เลี้ยงในน้ำที่มีไนโตรเจน 40 ppm มีค่าเท่ากับ 7.15 ± 1.91 , 5.45 ± 0.37 , 1.31 ± 0.24 และ 0.87 ± 0.20 ppm

ตารางที่ 2 ปริมาณไนไตรท์ (ppm) ในเลือดกุ้งขาวแวนนาไม ที่ระดับความเค็มและเวลาต่างๆ กันของกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เลี้ยงในน้ำที่ใส่ไนไตรท์ความเข้มข้น 40 ppm

ความเค็ม (ppt)	24 (ชม)		48 (hr)		96 (hr)	
	กลุ่มควบคุม	กลุ่มไนไตรท์	กลุ่มควบคุม	กลุ่มไนไตรท์	กลุ่มควบคุม	กลุ่มไนไตรท์
5	0.38±0.02 ^a	7.15±1.91 ^a	0.41±0.08 ^{ab}	13.28±2.52 ^a	0.42±0.01 ^{abc}	20.74±2.26 ^a
10	0.39±0.38 ^a	5.45±0.37 ^b	0.40±0.17 ^{ab}	6.19±0.48 ^b	0.39±0.03 ^{abc}	13.50±1.86 ^b
20	0.46±0.15 ^a	1.31±0.24 ^{cd}	0.32±0.04 ^{cd}	2.47±0.73 ^{cd}	0.36±0.04 ^{abcd}	4.57±1.54 ^{cd}
30	0.37±0.08 ^a	0.87±0.20 ^{cd}	0.31±0.03 ^{cd}	2.14±1.06 ^{cd}	0.30±0.06 ^d	2.98±1.08 ^{cd}

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถว แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)



ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนไตรท์ในเลือดของกุ้งขาวแวนนาไมกลุ่มที่เลี้ยงในน้ำที่มีไนไตรท์ความเข้มข้น 40 ppm ที่ระดับความเค็มและเวลาต่างๆ กัน

และจากการทดสอบทางสถิติ พบว่าที่ 20 ppt กับ 30 ppt ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) แต่ที่ 5 ppt กับ 10 ppt มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) (ตารางที่ 2) และที่ความเค็มทั้งสองก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มที่เลี้ยงที่ความเค็ม 20 ppt และ 30 ppt ที่ 48 ชั่วโมง ที่ระดับความเค็มน้ำ 5, 10, 20 และ 30 ppt ในกลุ่มควบคุมมีค่าปริมาณไนไตรท์ในเลือดเท่ากับ 0.41±0.01, 0.40±0.17, 0.32±0.04 และ 0.31±1.06 ppm ตามลำดับ ซึ่งที่ 20 ppt กับ 30 ppt ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ($P > 0.05$) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) กับกลุ่มที่เลี้ยงที่ความเค็ม 5 ppt และ 10 ppt และที่ 5 ppt กับ 10 ppt ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) (ดังแสดงในตารางที่ 2) ส่วนในกลุ่มเลี้ยงในน้ำที่มีไนไตรท์ 40 ppm มีค่าเท่ากับ 13.28±2.52, 6.19±0.48, 2.47±0.73 และ 2.14±1.06 ppm ตามลำดับ ซึ่งที่ 20 ppt กับ 30 ppt ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) แต่แตกต่างกับที่ 5 ppt กับ 10 ppt อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) (ตารางที่ 2)

ที่ 96 ชั่วโมง ที่ระดับความเค็มน้ำ 5, 10, 20 และ 30 ppt ในกลุ่มควบคุมมีค่าปริมาณไนโตรเจนในเลือดเท่ากับ 0.42 ± 0.01 , 0.39 ± 0.03 , 0.36 ± 0.04 และ 0.30 ± 0.06 ppm ตามลำดับ ซึ่งที่ 5, 10 และ 20 ppt ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) แต่ที่ 5 และ 10 ppt มีค่าสูงกว่าที่ 30 ppt อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ส่วนที่ 20 ppt กับ 30 ppt ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) ส่วนในกลุ่มเลี้ยงในน้ำที่มีไนโตรเจน 40 ppm มีค่าปริมาณไนโตรเจนในเลือดเท่ากับ 20.74 ± 2.26 , 13.50 ± 1.86 , 4.57 ± 1.54 และ 2.98 ± 1.08 ppm ตามลำดับ ซึ่งที่ 20 ppt กับ 30 ppt ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > 0.05$) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) กับ 5 ppt และ 10 ppt (ตารางที่ 2)

Cheng และ Chen (2001) ทำการศึกษาโดยเลี้ยงกุ้งก้ามกราม *Macrobrachium rosenbergii* ที่อยู่ในระยะวัยรุ่น (juvenile) ในน้ำที่ระดับความเค็ม 25 ppt ที่มีความเข้มข้นของไนโตรเจน 4 ระดับคือ 0, 2, 5 และ 10 ppm พบว่า ปริมาณไนโตรเจนในเลือดมีค่าสัมพันธ์กับปริมาณไนโตรเจนที่มากขึ้น หลังจากนั้น 24 ชั่วโมงจึงใส่คลอไรด์ลงไปเพื่อให้มีความเข้มข้นของคลอไรด์เท่ากับ 15, 33 และ 50 ppm จากนั้นทำการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนในเลือด พบว่าปริมาณไนโตรเจนในเลือดมีค่าน้อยเมื่อปริมาณคลอไรด์ในน้ำมาก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า โดยปกติกุ้งจะมีการควบคุมสมดุลของของเหลวในร่างกาย (osmoregulation) โดยพยายามดึงคลอไรด์เข้าสู่เซลล์เมื่อความเข้มข้นของคลอไรด์ในน้ำลดลง เช่น ในกรณีที่อยู่ในน้ำที่ความเค็มต่ำ มันจะพยายามรักษาคลอไรด์ไว้ รวมทั้งรักษาไอออนอื่นๆ ไว้ให้มากที่สุด โดยมีการขับถ่ายไอออนออกจากร่างกายน้อยลง เป็นสาเหตุให้มีการสะสมไนโตรเจนไว้ในร่างกายพร้อมๆ กันไปด้วย ซึ่งตรงข้ามกับสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์มากคือ ความเค็มสูง ซึ่งถ้ามากเกินไปมันจะขับถ่ายคลอไรด์ส่วนเกินออกจากร่างกาย ไนโตรเจนจึงถูกขับออกจากร่างกายไปด้วย (Cheng and Chen, 2001)

สรุปผลการทดลอง

1. ความเค็มน้ำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าออสโมลาลิตีในเลือดกุ้งขาว ลิโทพีเนียส แวนนาไม โดยระดับความเค็มน้ำต่ำสุดที่ 5 ppt ค่าออสโมลาลิตีจะมีค่าต่ำสุด เมื่อระดับความเค็มน้ำสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าออสโมลาลิตีสูงขึ้นตามไปด้วย และสูงสุดที่ 30 ppt
2. ไนโตรเจนที่ความเข้มข้น 40 ppm มีผลต่อค่าความเข้มข้นของเลือดกุ้งขาวที่เลี้ยงในน้ำที่ระดับความเค็ม 5 ppt ที่เวลา

48 และ 96 ชั่วโมง โดยทำให้ค่าความเข้มข้นของเลือดมีค่าลดลงมากกว่าปกติ

3. ความเค็มน้ำมีผลต่อการดูดซึมไนโตรเจนเข้าสู่กระแสเลือดของกุ้งขาว ลิโทพีเนียส แวนนาไม โดยระดับความเค็มน้ำต่ำสุดที่ 5 ppt จะมีการสะสมของปริมาณไนโตรเจนในเลือดมากที่สุด แต่การสะสมจะลดลงเมื่อความเค็มของน้ำสูงขึ้น และการสะสมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลามากขึ้น

4. ที่ความเค็ม 20 ppt กุ้งจะเริ่มขับถ่ายไนโตรเจนออกนอกร่างกายได้ดีเพราะจากการทดลอง ที่ 20 ppt ปริมาณไนโตรเจนในเลือดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับที่ 30 ppt ซึ่งเป็นความเค็มที่ใกล้เคียงกับน้ำทะเลปกติ

5. การเลี้ยงกุ้งที่ความเค็มต่ำจะมีโอกาสประสบปัญหาความเป็นพิษจากไนโตรเจนมากกว่าการเลี้ยงกุ้งที่ระดับความเค็มสูง

เอกสารอ้างอิง

- สิริ ทุกชีวินาศ (2528). พิษเฉียบพลันของไนโตรเจนและแอมโมเนียต่อลูกสัตว์น้ำชายฝั่งวัยอ่อนบางชนิด. *รายงานการสัมมนาวิชาการประจำปี 2528*. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา, กรมประมง.
- อรุณี ผดุงขวัญ (2544) อิทธิพลของความเค็มระดับต่ำที่มีต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และสรีรวิทยาการหายใจของลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อน (*Penaeus monodon Fabricius*). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 72 หน้า.
- อุษา ลีประเสริฐ (2530). พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียและไนโตรเจนต่ออาร์ทีเมียที่ระดับความเค็มต่างกัน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
- Appelbaum, S., Garada, J., & Mishra, J.K. (2002) Growth and survival of the white leg shrimp (*Litopenaeus vannamei*) reared intensively in the brackish water of the Israeli Negev Desert. *The Israeli Journal of Aquaculture- Bamidgah*, 54(1), 41-48.
- Armstrong, D.A., Stephenson, M.J., & Knight, A.W. (1976). Acute Toxicity of Nitrite to Larvae of the Malaysia Prawn, *Macrobrachium rosenbergii*. *Aquaculture*, 9, 39-46.

- Briggs, M., Funge-Smith, S., Subasinghe, R., & Phillips, M. (2004). Introductions and movement of *Penaeus vannamei* and *Penaeus stylirostris* in Asia and the Pacific. FAO Regional Office for Asia and the Pacific. RAP Publication 2004/10:1-12.
- Cheng, S.Y., & Chen, J.C. (2001) Joint action of elevated ambiente and nitrie on hemolymph nitrogenous compounds and nitrogen excretion of tiger shrimp *Penaeus monodon*, *Comparative Biochemistry and Physiology*, Part C, 131:303-314.
- Chen, J.C., & Lin, J.L. (1994). Osmolality and chloride concentration in the hemolymph of subadult *Penaeus chinensis* subjected to different salinity levels. *Aquaculture* 125: 167-174.
- Gardiner, M.S. (1972) Excretion : Ionic and Osmotic Regulation. In : The Biology of Invertebrates. McGraw-Hill, New York. 499-595 pp.
- Senanan, W., Tangkrock-olan, N., Panutrakul, S., Barnette, P., Wongwivatanawute, C., Niphonkit, N., & Anderson, D.J. (2007). The presence of the Pacific Whiteleg Shrimp (*Litopenaeus vannamei*, Boone, 1931) in the Wild in Thailand. *Journal of Shellfish Research*, 26(4), 1187-1192.
- Strickland, J.D.H., & Parsons, T.R. (1972). A practical handbook of seawater analysis. *Fisheries Research Board of Canada Bulletin*, Ottawa, 310.
- Tseng, W.Y. (1988). *Shrimp Mariculture A Practical Manual (2nd ed.)*. W.S. Aquaculture, Cannan International Pty. Ltd., Brisbane, Australia. 282 pp.